


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4112/A









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4112/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4112/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4112/A


4112 A

C. 70

~~lage~~  
168


J. v. Mas













71510

(33)

Ma

or

NCE

mafo

d

P

DE JO

ingram

mafo

d

16

Ex



Alexandri Massariae

Medic. Doct.

ET

IN CELEBERRIMO GY-

mnasio, quod est Patauij Ante-

oris Professoris clarissimi,

PRAELECTIONES

DE MORBIS MULIERVM,

conceptus & partus:

EDITÆ.

In gratiam studiosorum Medic. vt quasi prodro-

gum haberent omnium totius corporis humani mor-

borum *δεσπείας* suo tempore edendæ.



LIPSIÆ,

Ex Typographæo Abrahami Lambergi.





CLARISS. ATQVE EX-  
CELLENTISS. VIRO  
*Philosopho & Medico eximio:*

DOMINO

IOHAN. BAPTISTÆ  
Gemmæ Veneto, Serenissi-  
mi Regis Poloniae, ac Suetiae  
Medico Physico.

AVREOLVM HVNC  
LIBELLVM gratæ obser-  
vantiae causa,


HENRICVS OSTHAUSIUS  
*Sil. Bibliopola Lipsensis*  
*L. M. Q.*

D. D. D.





## LECT. S.

 *Um incidisset in  
manus meas ex-  
emplar manuscri-  
ptum, continens  
Prælectiones aliquot de morbis  
Mulierum, ab Alexandro  
Massaria Vicentino, Medi-  
co atq; Philosopho præstantissi-  
mo, linguarum & scientiarum  
cognitione verè illustri, in cele-  
berrima schola Patauina Me-  
dicinæ practicæ Doctore pri-  
mario, ante aliquot annos habi-*

(:)

2

tas:



tas: Illudq<sup>3</sup> nonnullis in arte me-  
dica peritis viris ostendissem: au-  
thores mihi & hortatores esse  
cœperunt, prelo has ut subijce-  
rem & publici iuris facerem.

Quod consilium & iudici-  
um ipsorum, ego qui communi  
utilitati consulere, & hone-  
stum & laudabile esse semper  
censui, minimè improbandum  
duxi. Persuasum namq<sup>3</sup> habeo,  
lucubrationes hasce omnibus  
Medicinæ studiosis ætatis cui-  
usvis & conditionis, non utiles  
modò, sed gratas insuper acce-  
ptasq<sup>3</sup> fore, ob singularem eru-  
ditionem, peracre iudicium au-  
tho-



thoris, quod ut plurimum erra-  
re nescire, Medicus ac philoso-  
phus quidam eximius scriptum  
reliquit. Quem præter generis  
nobilitatem & ingenij præcel-  
lentiam, non solum Itali sui, sed  
omnes gentes & Nationes ad-  
mirati sunt & coluerunt. In  
Medicina siquidẽ tũm facien-  
da, tũm docenda, cœteris adeo  
omnibus, multorum sententia,  
mirificè antecelluit, ut nemo  
propius ad veterem illam & ve-  
nerandam Hippocratis &  
Galenimaiestatem videatur  
accedere. Harum virtutum  
splendore, bisq; ingenij dotibus

(:) 3

accen-



accensus Illustriss. Senatus Ve-  
netus, publico conductum sti-  
pendio Massariam, ut ex  
prima professionis Medicæ ca-  
thedra artem hanc nobilissimam  
profutendo doceret, non sine  
magno studiosorum applausu  
sa, nec minore fructu dele-  
git, &c.

Ad libellum quidem ipsum  
quod attinet, & argumentum  
quod tractat, omnium medicorum  
rationalium constans est  
sententia, magni Hipp. authori-  
tate stabilita, inter omnes qui  
humanū corpus affligant mor-  
bos, haud ullos magis esse fre-  
quentes



quentes, exitu pertimescendos,  
Symptomatum sæuitia horren-  
dos, curatu difficiles, ac eos qui  
peculiariter muliebrem sexum  
inuadunt ac excruciant. In quo-  
rum numero sunt varia in ute-  
ris tumorum & ulcerum gene-  
ra, scyrrhi, phlegmones, can-  
cri, & quæ in his præterea gi-  
gni consueuerunt molæ, ichores,  
humiditates albæ, tum & ven-  
tus atq; aquæ sæpenumero, ut  
monstrosos partus reticeam.  
Esse autem mulieres affectus  
periculosos admodum, & plæ-  
rumq; acutos & graues, & qui  
non adeò facile à medicis agnos-

(:) 4

scan-



scantur, quantumq<sup>3</sup> muliebres  
morbi & viriles curatione dis-  
crepent, & huius generis plu-  
ra, cum apud Hipp. in libris  
proprijs legendo cognoscere  
ampliss. Asclepiad. familiae  
addicti possint ac debeant: ex  
positioni horum immorari diu-  
tius precium operæ visum non  
fuit: quin potius Candidum  
Lectorem oro, ut studium, ope-  
ramq<sup>3</sup> meam Libelli huius ed-  
itioni navatam boni consula-  
eoq<sup>3</sup> in rem suam utatur. V.

Henricus Osthausen Si  
Bibliopola Lipsensis.

INDE





INDEX AVTHORVM,  
tūm veterum, tūm recentiorum  
Philosophorum, Medicorum  
& Historicorum,  
quorum testimonium  
allegatur, vel sententia  
improbatur.

Actuarius pag. 363.

Aetius 35. 39. 57. 59. 105. 131. 144.  
149. 161. 223. 231. 239. 250. 264.  
265. 276. 300. 305. 308. 309. 359.  
408. & alibi.

Albertus 26. 338. 339.

Altomarus 59. 109. 135. 159. 160. 293.  
350.

Alex. Aphrodis. 267.

Archigenes 131.

Areteus 310.

(:) 5

Ari-



# INDEX

Aristoteles passim  
 Athenæus 194. 198. 203. 219. 387.  
 Auenzoar 338.  
 Auerroës 120. 161. 195. 198. 213. 276.  
 282. 283. 354.  
 Auicenna passim.  
 Beniuënius 224.  
 Bottonus 7.  
 C. Celsus 264. 351.  
 Cleopatra 277.  
 Conciliator 271. 397.  
 Maur. Cordæus 309.  
 Diocles 2. 237.  
 Diodorus Siculus 219.  
 Dioscorides 270. 271.  
 Empedocles 20. 198. 274.  
 Erasistrati, Erasistratus 385.  
 Eucharis Rhodio 370.  
 Fernellius 228. 282.  
 Fuchsius 111. 114.  
 Galenus passim  
 Gaudauus 110.  
 Gaza 385.  
 D. Gregorius 235.

H



AUTORVM.

Hali abbas 208.  
 Hermolaus Barbarus 271.  
 Herodotus 219.  
 Herophilus 180. 251.  
 D. Hieronymus 235.  
 Hippocrates passim.  
 Iacchinus 159.  
 L. Laurentius 411.  
 Lemosius 3.  
 Leonicens 330.  
 Lucretius 206.  
 Macrobius 233.  
 Mercatus 61. 293. 380. 411.  
 414.  
 Mercurialis 3. 7. 27. 36. 134. 142. 159.  
 333. 380.  
 Montagnana senior 365.  
 Montanus 204. 272.  
 Moschios 223. 277. 387.  
 Numidianus 332.  
 Oribasius 265.  
 Ambr. Paræus 224.  
 Parmenides 20.  
 Paternus 111.  
 Paulus Aeginet. 7. 58. 70. 105. 131.  
 144.



# I N D E X

144. 231. 265. 269. 271. 276.  
 300. 305.  
 Pausanias 219.  
 Philoponus 242. 276.  
 Plato 11. 178. 173. 219. 228. 234. 237.  
 240. 241.  
 Plinius 235. 262. 270.  
 Plutarchus 217. 219. 234. 237. 238.  
 241. 266. 274.  
 Quintus 332.  
 Rabi 338.  
 Rhases 81. 246. 338.  
 Fr. Rouffetus 231.  
 Sauanarola 235.  
 Stoici 238.  
 Strato 275.  
 Sueffanus 27.  
 Suidas 224.  
 Theophrastus 233.  
 D. Thomas 240.  
 Tiresias 208.  
 Trincauella,  
 Valerius Maximus 235.  
 Fr. Valleriola 411. 415.  
 Fr. Vallesius 61. 161. 205. 404.


Val-



AUTHORVM


271. 276. Alefcus de Taranta 235.  
arignana 365.  
234. 237. efalius 308. 388.

*Finis authorum.*




ALE-



















ALEXANDRI

MASSARIÆ, MED. D.

ET PROFESSORIS IN

GYMNASIO PATAVINO

Athenoris.

PRAELECTIONES,

De morbis mulierum,

habita Anno 1591.



*Un ego maxime cupi-*  
*am hoc anno absolvere omnes*  
*morbos, qui continentur in ab-*  
*domine, cui longissimæ tractationi ordina-*  
*riæ lectiones non sufficiunt: mihi propositum*  
*est agere de morbis mulierum, qui quidem*  
*morbi propriam quandam & peculiarem*  
*tractationem & curandi rationem requi-*  
*runt, ut docet Hip. 1. De morbis mulierum, Necessitas*  
*circa medium in codice Basiliensi latino: operis.*  
*331. ad finem, quod ratio quoque facile potest*  
*A confir-*



confirmare. Cum enim mulieres utero potissimum ab hominibus masculis differant, a propterea proprijs quibusdam morbis laborant, quibus nullo modo mares homines possunt laborare, cur non liceat huiusmodi morbos muliebres appellare, ac propterea d illis propriam tractationem instituere & curationem? Quod quidem hoc loco primò notandum fuerat propter celebres quosdam viros, qui contendunt huiusmodi tractationem superuacaneam esse, cum morbi, tam in mulieribus, quàm in viris, una excepta sex indicatione eadem planè methodo atq; iisdem praesidijs debeant curari, quod profectò sicuti in plerisq; morbis utrisq; communibus verum est, ita in reliquis, qui solis mulieribus, minimè maribus contingunt, perspicuè falsum apparet. Vnde M. quoq; Hip. propria commentaria de morbis mulierum scribere non est veritus. Et apud Gal. legimus VI. Epid. sectio: II. Commento 43. Dioctem pariter scripsisse volumen de morbis mulierum. De Commentarijs autem Hip. etsi negare nolo, ea aut fortasse ab illo non fuisse



fuisse castigata, aut temporum iniuria quibusdam locis fuisse vitiata: veruntamen si consideremus copiam sententiarum, sermonis gravitatem & obscuritatem, ac doctrinae excellentiam, equidem censeo illa tanquam legitima & digna Hip. recipienda esse. Quanquam non ignoro doctissimos quosdam viros, qui de operibus Hip. iudicium fecerunt & ediderunt, aliter sentire. Alter est Mercurialis, qui in censura operum Hip. huiusmodi morbos mulierum reponit in tertia classe, in qua illo auctore, sunt reponendi omnes libri, quicunque ab Hip. neque editi neque conscripti sunt: Sed vel à filiis vel discipulis compositi fuerunt. Alter est Ludovicus Lemosius Hispanus qui in iudicio operum M. Hip. absolute pronunciat hos libros M. Hip. non esse: & rationem reddit: propterea quod illi nusquam à Galeno citati reperiantur, quod quidem ego miror à viro celeberrimo nominis tam temere affirmari, cum Galen. apertissime huiusmodi librorum mentionem faciat IV. aph. Comment. 36. & 45. Itaque nos

A 2                      testi-



testimonio & autoritate huius libri tanquam legitimi & diuino Hip. digni sapius utamur.

**Difficultas.** Huiusmodi tractatio de morbis mulierum est adeo difficilis, ut fortassis in tota arte medica nulla difficilior possit reperiri. Causae autem difficultatis plures enumerantur ab Hip. in lib. de morbis mulierum pag. 331. quarum prima illa est, quod mulieres plerumque ignorant se agrotare, unde ignorae longius morbos ferunt, donec tempore & necessitate edoctae, & expertae morborum insultus discunt tandem suo magno malo se agrotare. Ex quo huiusmodi morbi frequenter non solum curatu difficiles, sed etiam insanabiles fiunt. Secunda causa est apud Hip. quod mulieres etiam si sciant se agrotare, praepudore & verecundia non audent sua mala medicis communicare. Cum enim inter cetera sermones & informationes aegroti maxime faciant ad cognoscendos & curandos morbos, ut colligitur ex Hip. & Galeno 1. prognost. nec non 3. Epid. utrobique initio. Iam medicus eiusmodi mulierum silentio, hoc adiumento destituitur, unde longe difficilius

MOR-



DE MORBIS MULIERVM. 5

morborum cognitionem & curationem po-  
 teſt aſſequi. Tertiã cauſam adfert Hip.  
 quod ipſi quoq; medici timidè vel etiam ve-  
 recundè cum mulieribus agant, neq; aude-  
 ant vel ipſas diligentius interrogare, vel  
 abſconditos locos attingere & tractare, ſicuti  
 alioqui perutile & per neceſſarium foret. De  
 qua quidem negligentia Medici omnes ab  
 Hip. grauiter arguuntur & reprehendun-  
 tur, quicunq; minus ſedulò & accuratè ſtu-  
 dent morborum cauſas mulierum veras in-  
 telligere, ſine qua intelligentia certum eſt  
 illas non niſi temerè ac improbè curari poſ-  
 ſe. Sed ijs cauſis ab Hip. poſitis, licet aliam  
 non parui momenti adiungere, quod nimi-  
 rum, vel propter obſetricum ignorantiam,  
 vel propter internas & reconditas partes,  
 vel propter alias cauſas & remedia ſiue in-  
 tra ſiue extra adhibita non niſi difficilè ad  
 locos laborantes poſſint penetrare. Ex qui-  
 bus omnibus nulli dubium eſſe debet, quin  
 tota hæc materia & cognitione & curatione  
 multas contineat difficultates. Verum diffi-  
 cultas pari incunditate & utilitate com-  
 penſatur.

A 8

pen-

Incunditas  
& utilitas



pensatur. Nihil enim homini iucundius contingere, quàm intelligere tot arcana & mysteria naturæ, nec quicquam utilius medico esse potest, quàm nouisse rationem curandi morbos muliebres. Etenim cum illi sint plurimi, acutissimi, grauissimi, ac frequentissimè miseras mulieres malè afficiant, adeò ut continuas ferè illarum de vtero querelas liceat audire, certum est medicos ex huiusmodi curationibus non solum magnam laudem & existimationem, sed etiam ingentes opes posse acquirere. Ad quem modum Gal. L. de præcognitione ad Posthumam C. 8. scribit, propter vnā curationem vxoris Boëthi vteri profluuiū laborantis ab illius viro quadringentos aureos semel donatos fuisse. Caterum quia huiusmodi tractatio foret nimis longa, cui annuum tempus non sufficeret, si vellemus persequi omnes morbos, quicunq; ad mulieres pertinent: idcirco mihi propositum est in præsentia de ijs tantum agere, qui ad conceptum & partum hominis possunt referri, quos quidem certum est ceteris omnibus esse difficiliore,

fro.



# DE MORBIS MULIERVM. 7

requentiores, vtiliores, & maiori dignos-  
oratione. De hoc argumento sicuti di-  
mus habentur commentaria Hip. sed dif-  
cilia valde & obscura. Galen<sup>us</sup> nihil ex pro-  
posito de huiusmodi morbis tractauit, sed ex  
uis libris potissimum de morbis & sympto-  
natibus, de locis affectis, nec non Com-  
nētarijs in libro Aphorismorū & Epidemio-  
um, De sanguinis missione multa colligi pos-  
sent praecepta ac remedia. Paulus quoq;  
ib. suo tertio habet multa. Sed isti auto-  
res qui ferè omnia ex alijs transcribunt, non  
sine iudicio & delectu legendi sunt. Apud A-  
uicē. habetis Fen. 20. 21. tertij Canonis,  
quæ vobis aliquam lucem possunt adferre.  
Sed præter hos sunt alij quoq; autores partim  
veteres partim recentiores, qui in huiusmo-  
di argumento non sine fructu & laude ver-  
sati sunt. Et inter ceteros proximo superio-  
re tempore duo præclarissimi huius schola  
professores, Mercurialis & Bottonus, id  
diligentissimè præstiterunt, qui omnes scri-  
ptores in vnum volumen congesserunt hoc

Autor  
alij.

A 4

titulo



## 8 PRAELECTIONES

titulo: Gyneciorum siue de morbis mulierū  
Commentaria in tres tomos digesta. Quos  
quidem libros vos hortor, ut studeatis & in-  
telligaris.

Distinctio  
sexus.

Quoniam omnium primo mihi propo-  
situm est agere de conceptu hominis, ante  
omnia notanda est distinctio maris & foeminae,  
sine quibus conceptus fieri non potest. Quod  
quidem ut probè à vobis intelligatur, mihi  
liceat hanc rem paulò altius ordiri. Itaq;  
sciendum est, ut docet Philosophus 2. de  
gen. & corrup. 59. & 60. Secundo de anima  
35. secundo de gen. animal. ca. 1. nec non  
Gal. 16. de usu part. c. 1. & 2. sciendum in-  
quam est, omnia quaecunq; sunt, vel ut lo-  
quuntur Philosophi duplicia omnia esse En-  
tia, alia ingenerabilia, incorruptibilia, eter-  
na ut intelligentia, cælum: Alia generabi-  
lia, corruptibilia, caduca, ut sunt hæc infe-  
riora elementa & quæ ex elementis constant.  
Etenim quamuis elementa secundum totū  
sint ingenerabilia, incorruptibilia: secundum  
tamen partes generantur & corrumpuntur,  
& in continua transmutatione versantur.

Causa.



DE MORBIS MULIERVM. 9

Causa autem propter quam elementa isthac inferiora generabilia sint & corruptibilia non alia est, quàm materia, quæ semper appetit nouas formas, vt Philosophus docet diffusè in lib. Physico: Verùm cæteris omnibus rebus prætermisiss de vno homine dicendum est, quem quidem, vt scribit Gal. 14. de vsu partium cap. 11. Si fieri potuisset, natura maxime optasset immortalem facere, sed cum id per materiam non liceat, sicuti idem Gal. declarat 1. de tuenda valetud. c. 1. Nam quod ex arterijs, venis, nervis, ossibus, carne est compositum, incorruptibile esse non potest: Natura alia ratione, quàm potuit, homini ad immortalitatem viam fabricata est: quemadmodum facere solent sapientes urbium conditores, qui non solum id agunt, vt suæ vrbes hoc præsertim tēpore multo populo abundant, Sed etiam diligenter prouident, quomodo illæ in omne temp<sup>9</sup>, aut saltē diutissime conseruentur. Itaq; ipsa natura mirabilem quandam artem inuenit, quomodo in locis mortui hominis, alius nouus homo succede-

A S ret.



ret, quæ ratione illi semper incolumes maneat & immortales. Illa verò non est, quàm continua hominis generatio, alia. Vnde scribit Gal. 5. de usu part. ca. 7. 14. de usu part. initio. Naturam in constituendis partibus Animalis 3. Scopos sibi proposuisse. Primò, vt aliqua partes forent ad vitam necessariae, qualia sunt cerebrum, cor, epar, Nonnullæ ad commodiorem vitam, vt oculi, nares, aures: Quædam ad speciei instaurationem, vt pudenda, testes, uteri. Ex quibus puto satis constare distinctionem sexus, & vtriusq; maris & fœminæ generationē necessariam fuisse, vt non satis mirari possim, quomodo nonnulli Philosophi audeant affirmare fœminas præter naturæ propositum ac veluti monstra quædam in lucem proferri: Siquidem tam certum est, quàm quod certissimum, neq; hominem neq; reliqua perfectæ animalia sine vtroq; sexu vllò modo posse generari. Ad quem modum inquit Aristoteles 1. de gen. animal. cap. 2. in reb<sup>9</sup> vniversis veteres terrā quasi fœminam matremq; constituerunt, Cælum autem



utem & solem, & reliqua id genus nomi-  
 ne genitoris & patris appellârunt. Ex qui-  
 bus est Plato, qui in Timæo circa princi-  
 pium ex duobus elementis IGNE tanquam  
 VIRO, & TERRA, tanquam fœmina  
 ambobus parentibus, affirmat totum mun-  
 dum constare. Quomodo autem Homo  
 vir & homofœmina inter se differant, et si  
 uterq; de toto animali dicatur præclarè ex-  
 plicat Philosophus loco citato proximè 1.  
 de gen. animal. ca. 8. Illos inter se differre  
 dupliciter: Facultate & nonnullis parti-  
 bus. Mas quidem & fœmina differunt  
 facultate, quoniam vtriusq; facultas diuer-  
 sa est, siquidem vir facultatem habet ge-  
 nerandi in altero: fœmina habet faculta-  
 tem generandi in se ipsa. Differunt autem  
 nonnullis partibus. Cum enim ad omnem  
 officij functionem instrumento opus sit, atq;  
 instrumenta ad facultates debeant accom-  
 modari, hinc factum est, ut nonnullæ di-  
 versæ partes necessariò fuerint à natura in-  
 stitutæ, quæ ad huiusmodi facultatem ad-  
 coitum & procreationem pertinentes, forent  
 accom-



accommodata. Hæc autem apud Aristot. sunt in fœmina pudendum & uterus, in viro testes & membrum virile. Ceterum Gal. huiusmodi vasorum & instrumentorum differentiam non omni ex parte videtur recipere qui scribit 1. 4. de Usu part. ca. 5. 2. de Sem ca. V. omnes partes, quæ sunt in viris, in mulieribus quoq; reperiri: atq; eo tantum differre inter se, quod illæ in mulieribus sint intra absconditæ, in viris autem extra appareant. In qua quidem re explicanda eleganter & diffusè ab ipso Gal. exposita nolo tempus perdere, quoniam cuiq; liceat intelligere apud eundem autorem. Itaq; nulli dubium esse potest vel debet id, neq; solum virum, neq; solam fœminam pro generatione hominis satis esse, sed utrumq; & utriusq; coniunctionem fore necessariam. Quoniam verò non satis fuerit marem & fœminam fecisse atq; instrumenta utriq; ad coniunctionem accommodata fabricasse, siquidem propter multas causas tam mas, quàm fœmina, potuissent huiusmodi coniunctionem abhorrere, Unde ge-  
neratio



generatio & species humana potuisset deficere:  
 Idcirco natura sagax voluit vtrumq; & ma-  
 rem & fœminam decipere. Quamobrem  
 tantam propensionem ad coitum & tantam  
 voluptatem in coitu vtriq; inseruit, vt nul-  
 lum sit periculum, cum & mares & fœmina,  
 & libentissimè & frequentissimè coeant.  
 Cuiusquidem naturalis propensionis ad coi-  
 tum & voluptatis, & naturales, & elegan-  
 tes causæ plurimæ redduntur à Gal. 14. de  
 usu part. Neq; verò solum hominibus, sed  
 etiam cæteris animalibus natura tantam  
 propensionem, tantā voluptatem inseruit,  
 vt hac ratione, quod aliter facere non po-  
 tuit, & hominibus & cæteris animalibus  
 immortalitatem & æternitatem procura-  
 ret. De communi desiderio ac voluptate rei  
 venereæ, imò verò de rabie omni ferè ani-  
 malium tempore coitus videatis Philosoph.  
 6. de historia animal. ca. 18. qui multa præ-  
 clare de hac re scribit. Sed hoc loco licet quæ-  
 rere quidnam vir & fœmina, vel separatim  
 vel coniunctim præstent in hac coniunctione:  
 Vtrum semen viri tanquam efficiens solum,

an



an tanquam efficiens & materia ad conceptum conferat: An mulier solum menstruum sanguinem, an praeterea quoque semen exhibeat in generatione, & alia id genus de quibus inter Aristotelem & Galenum sunt maximae & celebres controuersiae. Verum tota haec disputatio ad commodiorem locum nempe ad tractationem de conceptu mihi videtur pertinere. Itaque ad alia progrediamur, & primo omnium de muliebribus mensuris tractationem aggrediamur, siquidem conuenit inter omnes menstrua ad conceptum & efficiendum, & nutriendum potissimum pertinere, ac pro varia eorum naturali vel non naturali constitutione mulieres reddi magis, vel minus sanas, magis vel minus robustas, speciatim vero magis vel minus ad conceptum atque illius gestationem & partum disponi: De quibus Auicenna scribit ad hunc modum lib. 3. Fen. 21. Tract. 3. ca. 1. Menstrua temperata in quantitate & qualitate sua, & in tempore suo, currente secundum consuetudinem naturalem in omni periodo sunt causa sanitatis mulieris & mundi-

difi-



dificationis corporis eius ab omni nocumēto: & quæ sequuntur.

## CAPVT I.

## DE MENSTRVIS.

**Q**uid sint Menstrua, tradi. Quid sit  
tum est ab Aristotele 1. de gen. ani-  
mal. ca. 19. qui scribit, Menstrua excre-  
mentum esse, & proportionē sicut masculis  
semen, ita fœminis menstrua venire. Id  
quod ijs, quæ utriq; similia contingunt, co-  
natur probare. Namq; vnâ atq; eadem  
etate maribus semen fieri incipit & secerni,  
fœminis menstrua erumpunt. Utriq; hoc tē-  
pore vox mutatur. Præterea desinente etate  
masculis aboletur generandi facultas,  
fœminis menstrua deficiunt. Sic Aristoteles  
probat menstrua excrementa esse, quod  
mulieres neq; hæmorrhoidibus, neq; fluxione  
anguinis è naribus neq; varicibus (venæ  
slatæ in crure) neq; aliquo symptomate ma-  
gna ex parte laborant, quam diu illæ con-  
gruas



Excremen-  
tum mu-  
lierum.

gruas habent menstruas purgationes: & alijs argumentis, de quibus longius agendum non est. Sed nos ad Galenum accedamus, qui rationibus petitis ex rei natura longè accuratius hanc rem explicat. Itaq; sciendum est, ut ille docet 1. de facultatibus naturalibus ca. 10. 1. de val. tuenda, ca. 3. in omni concoctione necessariò fieri aliqua excrementa. Cum enim cuiq; homini propter insitum calorem certa quedam substantiae portio quotidie effluat & dissolvatur, quæ alia ratione non potest reparari, quam alimentis & potionibus. hinc necessarium fuit excrementorum proveniunt originem habere: siquidem quæ eduntur & bibuntur longè differunt à natura illius substantiae, quæ effluit, unde necessariò indigent varia ac multiplici alteratione, concoctione & transmutatione, ut tandem corpori nutriendo & substantiae reparandæ possint assimilari. In quo quidem opere nonnulla remaneant necesse est, quæ concoctionem & assimilationem nequeunt recipere: quæ propterea excrementa vocantur:



ur : quæ quum varia sint, non solum in prima, sed etiam in secunda & tertia confectionibus: Hinc factum est, vt non solum necessaria instrumenta natura instituerit, quibus huiusmodi excrementa tanquam superflua & inutilia possint expurgari, sed illis etiã facultates quasdã inseruerit, vnde à nonnullis partibus ad se traherentur, ab alijs ad alias transmitterentur, & postremo à quibusdam expellerentur. Ita ergo generaliter de excrementorum necessario ortu habendum est: Sub qua communi ratione certum est, ipsa quoq; menstrua fore comprehendenda. Quod si quis quærat, cur **Cur non** mulieres tantum, cæteri homines minimè **vir.** eiusmodi redundant excremento? Huic respondet Gal. 14. de vsu part. cap. 4. Id factum esse, quod mulier sit viro frigidior, propter quam causam alimenta non ita probè concoqui & discuti possunt. Ex quo necessarium fuit, tale & tantum excrementum colligi, quod deinceps ad partes genitales, quæ, vt scribit Galenus 2. de Sem. c. 1. omnium imbecillimæ sunt, solet transmitti.

B

Sed



Sed tamen hæc mulieris frigiditas & imperfectio, ut idem Gal. 14. de usu part. cap. 6. maximam utilitatem toti humano generi præstitit. Cum enim, ut supra dictum est, necesse omnino fuerit fœminam esse: credendum non est, summum omnium rerum opificem partem totius nostri generis dimidiam, ita imperfectam ac veluti mancā futurum fuisse, nisi huiusmodi imperfectiōnem, magna quædam utilitas fuisset secutura. Causa verò est huiusmodi. Namq; ipse fœtus materiam postulat copiosam, non modò ad primam sui constitutionem, sed etiam deinceps ad omne illius incrementum, quod quidem nutrimentum si mulier fuisset calidior, omnino defecisset, quoniam tunc & meliorem concoctionem alimenti fecisset, & maiorem geniti excrementi dissipationem molita fuisset. Itaq; hæc præcipua est ratio generationis, hic præcipuus est usus menstruorum in muliere. Quærent nonnulli hoc loco, quam obrem solæ mulieres inter cætera animalia habeant menstruas purgationes? quod tamen problema non conceditur

Quare solius mulieris non aliorum animalium;



ditur ab Aristotele, qui scribit 3. de gen. animal. cap: 1. In quibus quidem & piscibus nulla menstrua fieri, sicuti in cæteris animalibus sanguine præditis & viuiparis contingit, in quibus omnibus, ille inquit, alijs magis, alijs minus menstrua fieri solent. Vnde 6, de historia animal. 18. scribit: Mulierem maximè omnium animalium habere menstruas purgationes, deinde vaccam, asinam, equam, quod quidem an verum sit, alij viderint, qui Aristotelem ubiq; conantur defendere: tametsi idem Aristoteles hoc ipso loco illud addat, non deesse Philosophos, qui negent in ijs animalibus menses fieri, inter quos ego quoq; non inuitus patior numerari, cum planè experientia demonstrat, hanc illius sententiam falsam esse, ac nulla animalia præter mulieres menstruas habere purgationes. Sed utcumq; sit, siue mulier sola, siue maximè omnium animalium menstruis copiosius abundet, huius rei causæ requiruntur ab Aristotele 7. de histor. animalium cap. 2. quæ duæ potissimum colligi possunt. Prima, quod hæc materia

B 2

excre-



excrementitia nonnullis animalibus in corporis alimentum, alijs in corticem, alijs in squamam, alijs in frequentiam venarum & pilorum, & alias huiusmodi partes conuertatur. Secunda causa est: Quod reliqua animalia sint multò sicciora, maioribus laboribus & exercitationibus dedita, & non simplice victu vtantur. Contra autem mulieres sint longè humidiores, ferè otiosæ, ac pleniore victu vti soleant. Ex quibus iure licet colligere, cætera animalia nullas, mulieres autem copiosas menstruas purgationes habere. Cæterum quoniam diximus & quasi manifestum accepimus, mulierem esse mare frigidiorē, nonnulli hanc determinationem non recipiunt, qui altera ex parte mulierem mare esse calidiorē censent: de qua controuersia Aristoteles quoq; mentionem facit secundo de partibus animal. cap. 2. qui scribit, Parmenidem voluisse mulieres esse viris calidiores. Quod idem quibusdam alijs quoq; placuit argumento copie sanguinis, qua menstrua fiunt. Empedoclem verò contrà censuisse mulieres esse



esse maribus frigidiores. Sed breuiter aduersarias rationes vnā & alteram audiamus, & quidem ex potiorib⁹. Quod mulieres sint viris calidiores, Primò est auctoritas Hip. cuius hæc sunt propria verba L. de morbis mulierum circa principium: Habet enim mulier sanguinem calidiorē, & propterea calidior est quā vir. Deinde neminem puto esse negaturum, quin aliqua mulier manifestè sit aliquo viro calidior. Finge (quod est Galen. exemplū 3. de causis pulsuū, de pulsu virorum & mulierū) Hominē temperamēto pituitoso, frigido & humido: finge mulierem temperamento bilioso calido & sicco: Sed præterea finge hominem viuere in vmbra & otio delitioso: Fæminā contrā incolere Ægyptum, ruri agere, multis vti laboribus, atq; demum parco victu vti: Cui dubium esse potest hanc mulierem calidiorē esse viro? Altera ex parte iam statutum est, ac reddita est ratio, quamobrem necesse fuerit mulierem esse viro frigidiorē: id quod res ipsa potest manifestè confirmare.

An mulieres frigidiores viris.

B 3

Siqui-



Siquidem certum est marem planè robustiores habere omnes operationes, animales naturales, vitales, quod robur non aliunde quàm ex calore potest provenire. Quid igitur dicendum est? Prætermisissis aliorum responsionibus, quæ de hac ardua difficultate solèt à multis proferri, ego sentio dupliciter posse responderi. Primò, fieri quidem posse, ut aliqua mulier, si respiciamus temperamentum uniuersi corporis, sit aliquo viro calidior, quod positum exemplum demonstrat: Sed si paria paribus conferantur, vir pituitosus mulieri pituitosæ, vir biliosus mulieri bilosæ, eâdem regione, eâdem victus ratione & simili, tunc perpetuo marem muliere calidiorum esse. Secundò: Vicumq; concedatur aliquam mulierem aliquo viro generaliter calidiorum esse: tamen quatenus pertinet ad partes genitales, illâ uecessariò fuisse frigidiorum. Namq; ut supra diximus cum Galeno: Vir à muliere differt non natura, sed sola membrorum genitalium formatione, quæ in viro extra propelluntur & apparent, in  
fœmina



ſœmina intra detinētur & latent, quod qui-  
 dem nulla alia ratione, niſi ex virorum ca-  
 liditate & mulierū frigiditate fieri poteſt.  
 Verum quid ad Hipp. reſpondendum eſt?  
 Plarīq; omnes, hanc partem tanquam  
 Hipp. non legitimam recipiunt, qui exiſti-  
 mant eam temerè fuiſſe ab aliquo inſertam,  
 cum manifeſtum videatur continere men-  
 dacium: addo cum huiusmodi ſententia  
 ipſi Hip. manifeſtè repugnet, qui 6. Epid.  
 ſect. 2. circa finem clarè docet, maſculos  
 eſſe ſœminis calidiores, cuius rei argu-  
 mento eſt, quod illi ſunt nigriores, ha-  
 bent venas magis extra apparentes, longè  
 bilioſiores exiſtunt, atq; in dextris uteri  
 partibus generantur: quæ quidem omnia  
 non niſi à caliditate fieri poſſent. Et Ga-  
 lenus commentarijs eorum locorum & alijs  
 diffuſè demonſtrat. Ac proſectò aliter mea  
 ſententia reſponderi non poteſt: Siquidem  
 nullus eſt liber Hip. tametiſi germaniſim⁹  
 habeatur, in quo temporum iniuria ſpuria  
 quædam & falſa non irrepſerint, ſicut ipſis  
 quoq; aphoriſmis contigit: in quibus etſi li-



ber est omnium consensu germanissimus Hipp. tamen nonnulli aphorismi tanquam spurij reijciuntur à Gal. Veruntamen si quis velit veterē Hipp. scripturam tueri, illud vnum mihi occurrit, quod dici possit, sanguinem in mulieribus calidiorem esse non proprio aut naturali calore, sed ea caliditate, quæ omnibus ferè excrementis solet perpetuo copulari. Cum enim menstrua sine vlla dubitatione inter excrementa re-enseantur, certum cuiq; esse potest, illa nescio quam caliditatem præter naturam concipere, & hac ratione sanguinem mulieris sanguine virorum calidiorem esse. Sed hac de re satis, & ad menstrua reuertamur.

Quando e-  
rumpant  
menses  
primum.

Scribit Aristoteles 7. de historia animal. cap. 1. menses mulieribus magna ex parte incipere, circiter annum 14. quando mares quoq; incipiunt semen emittere. Quo quidem tempore vterq; & mas & foemina magnis mutationibus, & partium genitalium & vocis & aliarum rerum subiiciuntur. Desinunt autem menses, vt idem scribit Philosophus 7. de historia animal. cap. 5.

Quando  
desinunt.

vt



et plurimum circiter annum 40. vsq; ad  
60. ac sanè ipsa res hanc Philosophi senten-  
tiam de principio ac fine mensium videtur  
confirmare. Etenim si contingat, vt  
menses incipiant ante annum 14. vt anno  
2. 10. 11. quod nonnulli affirmant: Pa-  
riter si fiat, vt menses vsq; ad 50. & plures  
annos perseuerent, omninò rarius est.

De tempore mensium non conuenit inter  
omnes, namq; alij vnicam diem, alij 2. alij  
3. 4. & plures huic purgationi tribuunt,  
quod experientia confirmat esse verum, ac  
ratio confirmat, summa cū ratione fieri pro  
varia mulierum atate, habitu corporis,  
temperamento, vitæ instituto, regione, & ca-  
eteris, vt modò maiora, modò minora, modò  
longiora & breuiora menstrua fiant.

Hip. 1. de morbis mulierum pag. 313.  
ita statuit: In muliere sana moderatos men-  
ses fluere ad 2. aut 3. dies, longius autem  
tempus aut breuius morbosum & sterile  
esse. De quo tempore mensium notanda  
est sententia Philosophi 7. de historia ani-  
mal. cap. 2. qui scribit: Facilius agi cum

Quando &  
quot dies.

B s illis



illis mulieribus, quibus breui tempore, id est, biduo aut triduo menses profluunt, difficilius autem cum ijs, quibus longius protrahitur, siquidem mulieres hoc tempore laborant. Sed hoc loco occurrit insignis difficultas, apud Aristotelem, qui scribit 7. de histor. animal. 2. paucis mulieribus singulis mensibus, plurimis autem intermisso vno mense, id est, tertio quoque mense menstrua moueri. Quæ quidem sententia non solum repugnat Gal. 14. de usu part. cap. 18, & auctoribus: sed etiam sensu & experientia perspicue falsa esseprehenditur: cum certum sit ex mille fœminis fortè vnā aut alteram purgari tertio mense, quod ego quidem nunquam audiui. Ceteras omnes suas purgationes singulis mensibus habere. Interpretes pro Aristotele multum laborant. Albertus Magnus in suis de animalibus L. 9. cap. 2. totam Aristotelis sententiam peruertit, qui scribit: Plurimas mulieres singulo mense, paucas tertio quoque mense purgari. Sed hac ratione facile esset omnes auctorum errores tueri, præ-



præterquam quod neq<sup>3</sup> id verum est, ut  
proximus paucas mulieres tertio mense pur-  
gari, cum multæ potius hoc tempore non  
nisi singulis mensibus soleant expurgari.

Suessanus Commentario huius loci in-  
quit, illud fortasse in regionibus Aristotelis  
verum fuisse. Nonnulli asserunt lib. de a-  
nimat. ab Aristotele fuisse scriptos potius ex  
aliorum relatione, quàm ex propria sen-  
tencia. Et idcirco illos multos errores, &  
quidem manifestos continere: Inter quos a-  
pertè fatentur hunc numerandum esse.

Demum Mercurialis L. 5. variarum  
lectionum cap. 2. nec non 4. de morbis mu-  
lierum cap. 1. confutatis aliorum responsioni-  
bus aliam rationem excogitavit, qua ille pu-  
tat Aristotelem posse defendi. Ea verò est  
ut in textu latino restituatur vox græca  
συνηχῶς prætermissa ab interprete, quæ  
ipsi idem significat, quod coaceruatim &  
copiosè, adeò ut restituta hac voce sensus  
sententiæ Aristotelis sit huiusmodi: paucas  
mulieres singulis mensibus acervatim, copio-  
sè purgari, plurimas autem tertio mense

ACER-



aceruatim & copiosiores menses habere.

In proposita difficultate, in propositis verbis neq; defensio Mercurialis mihi videtur satis esse. Nam primò significatio illius verbi videtur voluntaria, cum apud nullum probatum autorem, quem sciam, accipiatur in ea sententia. Nam verè & propriè hæc vox συνεχὼς omnium auctorum consensu idem significat, quod continenter sine intermissione, assidue, continuatim vel quid simile. In qua significatione, puto eam quoq; ab Aristotele hoc loco usurpatam fuisse, ut sensus sit huiusmodi: paucis mulieribus singulis mensibus συνεχὼς, id est, sine intermissione & continuatim, pluribus intermissione vnius mensis tertio duntaxat quoquo mense menstruas purgationes moueri. Deinde mea sententia tam falsum est, paucas mulieres singulis mensibus aceruatim: plurimas tertio mense copiosius purgari, quam falsum est paucas singulis mensibus, plurimas tertio tantum mense suas purgationes habere, cum

res



es ipsa confirmet, omnibus mulieribus, non  
magis tertio, quàm cæteris & singulis men-  
bus vnâ ferè atq; eâdem mensura menstru-  
s purgationes moueri. Vnde etiam puto  
uiusmodi euacuationē menstrua appellari,  
quod singulis mensibus eueniant.

Quomodo Aristoteles à tam manifesto  
errore possit defendi, si modò ille defendi po-  
est, ego quoq; dicam quid mihi in men-  
tem venerit, qui videor posse duplicē respon-  
sionem adferre. Et prima est: Senten-  
tiam Aristotelis veritatem suo tempore  
continuisse, quo certum est, mulieres mo-  
derata victus ratione uti, & admodum so-  
briè viuere consueuisse. Ad quem modum  
Hipp. quoq; scriptum reliquit 6. aphoris.  
39. Mulierem podagra non laborare, nisi  
menstrua deficiant. Quam sententiam Ga-  
lenus inquit, tempore Hipp. veriss. fuisse,  
propter singularem mulierum sobrietatem:  
posteriore autem tempore eiusmodi senten-  
tiam falsam esse redaitam, quod mulieres  
deinceps propter victus incontinentiam ac  
plurimos errores, fluentibus quoq; mensibus  
podagra



podagra solita fuerint laborare, sicut hodie quoque contingit. Secunda responsio est Sententiam Aristotelis veram esse hoc sensu, ut ille loquatur non de menstruis generaliter, sed de prima mensium eruptine, quae videtur non ita continenter singulo quoque mense euenire, adeo ut multis iuueniculis, quo tempore menses incipiunt erumpere, haec vacuatio soleat interiecto vno mense succedere, quae quidem sententia, si non perpetuo, saltem vera esse deprehenditur, cum raro eueniat, ut cum menstrua virgini erumpunt, ad vnguem singulorum mensium seriem conseruent, Sed liceat videre nonnullas tertio solum mense quoquo purgari, per aliquod tempus, donec natura iam assuefacta vijs apertis sanguinis copia aucta, corporis augmento desinente, iam singulo quoquo mense ovverōs possent purgari. Fortè autem neutra ex ijs meis responsionibus videbitur ad hanc difficultatem satis esse: Sed tamen qualescunque illae sint, mihi libuit illas proferre, quae satis esse poterunt, donec mihi aut alijs liceat meliorem responsionem

exco-



ccogitare. Hactenus de menſtruis mu-  
 erum naturalibus nescio quomodo de illis  
 ongius diximus, quàm mea voluntas fue-  
 it. Quare tempus eſt, vt menſtrua præ-  
 er naturam aggrediamur.

## CAPVT II.

DE MENſIVM SVP-  
PREFſIONE.

CVm mulieres naturæ instituto <sup>Effentia.</sup>  
 & prouidentia ſingulis menſibus habe-  
 nt purgationem eorum excrementorum,  
 ua & propter temperiẽ, & propter victus  
 ationẽ huiusmodi ſex<sup>o</sup>, & propter alias cau-  
 as, de quibus ſupra dixim<sup>o</sup>, copioſe coacer-  
 antur, ſi hæc ſupprimatur, tunc neceſſe eſt,  
 vt mulier in multa & grauiffima pericula  
 incurrat: ſicut altera ex parte, ſi hæc vacua-  
 tio ſecundum naturæ legẽ procedat, mulieres  
 & ſolent ſana conſeruari, & multis morbis  
 præſeruari, vt ſupra diximus cum Auicen.  
 Ex quo Gal. ſcriptum reliquit 3. de Sympt.  
 cauſis ca. 4. de Sympt. diff. cap. 7. cæteras  
 omnes



omnes sanguinis excretiones, quaecumq; illae fuerint, hac una excepta, quae mulieribus per uterum fit, esse praeter naturam, & quidem toto genere. Itaque suppressio mensium inter ea symptomata à Gal. numeratur, quae immoderate excreta aut retenta dicuntur: Siquidem ea retinentur in corpore, quae naturam purgaridebuisse. Cum autem & haec & omnia symptomata sequantur morbos vel statim & proximè, vel alterius symptomatis interuentu, ut Galenus docet locis proximè citatis: Ita habendum est, huiusmodi symptomata suppressionem mensium primò pendere ex alio symptomate nimirum actione laesa ipsius uteri. Haec porro actio uteri, sicut ceteris omnibus actionibus contingit, tripliciter laedi potest, vel ablatè, vel imminutè, vel depravatè. Itaque menses aut ex toto supprimuntur, aut parcius fluunt, quàm conveniunt, aut depravatè expelluntur. Quoniam verò menses vel supprimuntur ex toto vel imminuuntur ex parte propter unas & easdem causas, quae non aliter quàm ratione magni-

Causae



magnitudinis inter se differunt: Idcirco simul de vtriusq; sermonem habebimus: Plæricq; omnes & vet. & recentiores tractantes causas suppressionis mensium admodum confuse & perplexè mihi videtur illas explicare. Quare cæteris omnibus prætermiſſis experiamur nos more nostro, an cum Gal. huiusmodi causæ ad certa quedam capita certamq; methodum possint referri.

De causis suppressionis mensium tractat Galen<sup>9</sup> ex proposito duobus potissimū locis. Primò 3. de sympto: causis cap. 4. altero, S. aphoris. commento: 57. ex quibus ni fallor, summa huius disciplinæ præclare atq; ordinatim colligi potest. Itaq; ex Galeno ita habendum est menstrua in mulieribus retineri ex toto, aut minui ex parte propter 4. Causas: quarum prima est vitium vteri & vasorum quæ ad illum pertinent. Secunda est vitium sanguinis. Tertia est vitium vniuersi corporis. Quarta & vltima, vitium facultatis & virium. Ad quas quidem quatuor causas non difficile

C

cile



cile est cuiq; ceteras omnes referre, quaecun-  
 que & quocunq; ab alijs solent proponi.  
 1. Primum igitur supprimuntur menstrua  
 aut minuuntur ratione vteri, quod contin-  
 git dupliciter. Primo modo vitio ipsius  
 corporis: altero vitio vasorum, quæ ad vte-  
 rum pertinent, & per quæ menses debent  
 purgari. Corpus vteri est in causa, ut  
 menstrua supprimantur, si illud laboret a-  
 liquo genere morbi, inter quæ occur-  
 runt primo morbi in mala compositione, qui  
 possunt esse multiplices, ut si substantia vte-  
 ri fiat durior & densior, quàm naturæ illi-  
 us conueniat: qui primus morbus proponi-  
 tur à Galeno 3. de sympt. causis cap. 4. 5.  
 aphoris. 28. & 57. quod quidem vteri vi-  
 tium cum fieri possit, aut natura & primo  
 ortu, aut deinceps tractu temporis, Gale-  
 nus docet propter huiusmodi vitium vteri,  
 si id naturale fuerit, perpetuam menstru-  
 rum suppressionem oriri, nisi quis accom-  
 modatis medicamentis longoq; tempore il-  
 lum ad meliorem habitum transferat. Huic  
 effectui proportionem respondet compressio  
 vteri



uteri, quæ ex vasis illi circumiacentibus  
 contingit, cum videl. corpus immoderatè  
 crassum euadit: Quæcunq; præter naturam  
 crassæ non concipiunt utero, ijs omentum  
 uteri os comprimit & priusquam extenu-  
 entur non concipiunt s. aphoris. 45. Sic: Si  
 uteri os distortum aut peruersum fuerit, si  
 aliquo callo, carne, pinguedine obductum  
 fuerit, si uterus non fuerit peruius & aper-  
 tus, quod ijs mulieribus contingit, quæ im-  
 perforatæ dicuntur, de quibus Aetius quo-  
 que mentionem facit lib. 16. cap. 98. Ita  
 ergo propter hos aut similes morbos ratione  
 uteri menstrua supprimuntur. Diximus  
 de morbis in mala compositione.

Secundò occurrunt morbi in intem-  
 perie, qui, vt puto vos non ignorare, varij  
 sunt: Et simplices & compositi: Et cum ma-  
 teria & sine materia, quibus omnibus po-  
 test uterus laborare, partim natura & pri-  
 mo ortu, partim præter naturam & tem-  
 poris progressionem, sicut de duritie & densi-  
 tate diximus. Et si quis quærat quales nam  
 uteri intemperies sint in causa suppressionis

C 2

men.



mensium: Huic solus respondet Auicen. tractat. 3. cap. 25. Intemperies simplices frigidam aut siccam, compositas calidam & siccam, frigidam & siccam principem locum obtinere. Et cum de intemperie frigida & sicca, vel simplici vel composita manifesta sit ratio quamobrem menses supprimantur: Dubium videtur, quomodo intemperies calida hoc ipsum possit efficere, siquidem fatentur omnes, calorem posse omnes meatus rarefacere, aperire, Sanguinem fluxibiliorem reddere, & ita potius menses prouocare, quam suppressere. Plerique omnes hac in re multum laborant, & inter ceteros Mercurialis L. 4. cap. 1. de morbis mulierum 3. causas proponit, propter quas intemperies calida valeat menses prouocare, quas ille inquit ab Auicen: propositas fuisse. Sed cum ego attentè non semel Auicen. legerim, nullam apud ipsum causam potui reperire: imo verò, nisi prorsus fallor, neq; id ab Auice: traditum est intemperie vteri calidæ menstrua suppressere, id quod nec fore asse vlla ratione fieri potest.



potest. Quin Auic. scribit simplices duntaxat  
 intemperies frigidam & siccam, compositas  
 calidam & siccam, frigidam & siccam sup-  
 pressionis mensium causas esse, adeò ut cer-  
 tum cuiq; esse possit, apud Auicem. minimè  
 intemperiem calidam simpliciter, sed cali-  
 dam simul & siccam posse menstrua retine-  
 re. Quod quidem rationi maximè conue-  
 nit, neq; ullam difficultatem continet: si-  
 quidem huiusmodi intemperies, non qui-  
 dem simpliciter calida, sed calida simul &  
 sicca facile potest utrum densiorem & du-  
 riorem reddere, totum sanguinem absume-  
 re, & hac ratione menstruam purgationem  
 impedire.

Deinde sunt morbi, in intemperie cum  
 materia, qui pariter summa cum ratione  
 possunt menses suppressere, quos quidem  
 morbos ego interpretor inflammationem  
 scirrhum, cancerum & alios tumores præ-  
 ter naturam. Etsi non ignoro omnes prope-  
 modum medicos nostrorum temporum de  
 morbis ex intemperie cum materia aliter

C 3

sen,



sentire, de quibus alias commodiore loco tractabimus.

Postremo sunt morbi in soluta unitate: quales sunt ulcera, abscessus, fistulae, & similes, quibus si uterus laboret, facile est intelligere, quomodo menstrua possint impediri & retineri. Atque hactenus de suppressione mensium propter vitium uteri, Verum placet Galeno, huiusmodi suppressionem mensium, non solum propter vitium uteri, sed etiam propter vitium vasorum, quae ad uterum pertinent, posse provenire, idque potissimum fieri solet, quotiescunque haec vasa angustiora sunt reddita, quam ut per ea sanguis possit penetrare, quod quidem vitium potest contingere, aut in prima generatione & natura, aut progressionem temporis, vel inducta aliqua intemperie, praecipue vero frigida & sicca, vel facta aliqua obstructione, sicut de superioribus quoque morbis diximus.

Secunda causa suppressionis mensium posita fuerat à Gal. vitium materiae & sanguinis: quando nimirum, id quod vacua-

tur



tar, vel crassum vel glutinosum fuerit, ut propterea ad fluxionem ineptum reddatur, quod contingit frequentissimè. Quæ quidem humorum crassities & visciditas, & propter alimenta, & propter alias multas causas potest contingere, de quibus sæpè diximus in publicis lectionibus.

Tertia causa propter quam mulier interdum nihil purgabitur, est culpa totius corporis, quod congruam sanguinis copiam ad uterum non transmittit. Id quod tripliciter fieri potest: vel propter multas exercitationes, vel ob tenuem victum, vel propter inclinationem humorum ad alias partes, ad quem modum mulieres multis laboribus & exercitationibus deditæ, quales apud Aetium lib. 16. cap. 51. sunt cantatrices, saltatrices, rusticæ, & quæcunq; calidius & siccus temperamentum habent, ut proximè ad virilem naturam accedant, vel parum, vel nihil purgari consueverunt, siquidem in huiusmodi mulieribus calor naturalis robustus est, ut probè concoquat alimenta, nec non digerat ac dissipet, quæcunq;



cunq; excrementa in concoctionibus relin-  
quuntur, vt propemodum sanis & robustis  
viribus contingere solet. Sic mulieres quæ  
tenui victu vtuntur, siue volentes, vt reli-  
giose & diuino cultui deditæ, quæ frequen-  
tibus ieiunijs & inedia præter modum se  
macerant & extenuant: siue nolentes, vt  
quæ graui alimentorum & rerum omnium  
inopia laborant, omnes autem nullos aut  
modicos rarosq; menses habere, quod hac  
ratione paucus sanguis & pauca excrementa  
generentur, quibus deficientibus, vt men-  
strua quoq; deficient, necesse est. De qua  
re videatis locum notabilem apud Galenū  
de sectio. venæ aduersus Erasistrateos cap. 3.  
qui disputans aduersus medicos illius sectæ,  
qui volentes prouocare menstrua præter-  
missa sectione venæ mulieres exquisita in-  
edia macerabant, illos acriter reprehendit  
propterea, quod etiam purgationes, quæ in-  
culpate fluebant, ex toto supprimant, si-  
quidem, ille inquit, sanguis alimentorum in-  
edia arefcit, & densior se ipso redditur,  
eamq; ob rem ad fluendum ineptus euadit.

Ad



Ad tenuitatem victus puto referri posse vigilias, profundas cogitationes, mærores omnesq; vehementes animi perturbationes, Ex quibus certum est spiritus sanguinemq; absumi, ac ferè idem fieri, quod ex tenuiore victus ratione fieri diximus. Ad quem modum videmus frequentissimè mulieres religiosissimas, viduas & cæteras, quæ molestis cogitationibus, vigilijs, tristitia, laboribus, doloribus assidue torquentur & conficiuntur, suppressione mensium laborare. Si tertio quoq; humores ferantur ad alias partes, minimè ad vterum, mulieribus menstrua supprimuntur exēp. gra. Si sanguis per nares, per hæmorrhoidas profluat, Si quæ mulier labore frequenti vomitu, fluxione alui, nimio sudore, aut alia simili vacuationis ratione. Ad quem modum collegit Hip. 5. Aph. 39. Mulieri, quæ in mammis lac habeat, nec sit grauida, vel puerpera, menstrua defecisse, quod sanguis hoc tempore per vasa communia mammis & vtero, ad mammas transmittatur atq; in lac transmutetur. Ad quem modum mulieres propè

C 5

omnes



omnes tempore lactationis planè menstruis sunt destituta. Sic elegantur & diffusè demonstrat Gal. 14. de v'surp. cap. 8. Quo loco vasorum vtriusq; partis, vteri & mammarum mirabilem societate & consociationem declarat, quin Gal. docet vtrasq; huiusmodi partes vteri & mammarum ad vnum perficiendum opus, nempe ad gignendum & nutriendum foetum fuisse à natura institutas, ac propterea vasa vtriusq; ita fuisse comparata & disposita, ut vtriq; muneri possint satisfacere, adeò, ut quo tempore in utero foetus conformaretur & augeretur, illi soli venae communes ex vtrisq; alimenta affunderent, quando autem foetus natus fuerit, rursum mammis totum alimentum affluat. Ex quo factum est, ut eodem tempore menstrua procedere nequeant, & foemina lactare, siquidem altera pars dum sanguis ad alteram transfertur, sicca semper relinquatur. Ad inclinationem humorum ad alias partes, nonnullae quoq; excretiones, siue natura, siue arte comparata mihi videntur posse referri. e.g.

Si



quæ mulier laborat magna & difficili  
 abie, vlceribus totum corpus occupanti-  
 bus, si plures habeat fonticulos, si frequenter  
 sanguis mittatur ex venis potissimū su-  
 perioribus: Ex quibus si mittatur sanguis  
 eciatim docet Galenus de sanguinis miss. c.  
 2. & 18. 2. ad Glauconem c. 7. 5. Meth.  
 3. menstruas purgationes impediri, si  
 mulier demum aliquo purgante medica-  
 mento familiariter vtatur, vt multæ face-  
 re solent. Etenim hæc omnia & alia, si quæ  
 sunt id genus, summa cum ratione possunt  
 sanguinem ab utero reuellere aut deriuare,  
 ut ad alias partes transmittere.

Quarta causa suppressionis men-  
 struum apud Galenum est ratione virium,  
 ametsi huiusmodi causam ab omnibus præ-  
 termitti video. Nam præter cæteras causas  
 nodo positas fieri potest, vt vires sint de-  
 biliores, quàm vt possint sanguinem ad v-  
 terum deducere & transmittere, sicuti eue-  
 nit conualescentibus & debilibus mulieri-  
 bus, quibus tam diu detinentur menses,  
 quàm diu illæ vires acquirunt ac fiunt ro-  
 bustio-

4.



bustiores, pariter potest contingere, ut propter robustas vires facto impetu sanguis a alias partes irruat & ita purgationes per verum impediuntur. Itaque tot & tanta sunt causa ad mentem Galeni suppressae vel imminuta purgationis menstruae, ad quas, ut supra diximus facile omnes mihi videntur posse referri, siue internae siue externae, quae cunctae ab alijs possent excogitari.

Tractabamus de suppressione mensium & absolute sunt omnes causa. Itaque id restat, ut ad signa progrediamur. Cum autem nullis signis opus sit, ac sola aegroti relatione intelligamus, menstrua suppressa aut diminuta esse: statim ad signa deveniendum est, quae singulas differentias & causas demonstrant. Quoniam vero differentiae & causa suppressionis mensium quaecumque accidunt, aut culpa totius corporis, aut propter robur vel debilitatem virium, de quibus postremo loco diximus, facile possunt intelligi ex proba vel improba corporis & partium constitutione, ex praecedentibus morbis & symptomatis, ex vitae instituto,



tuto, & alijs id genus communibus quidam locis: de quibus foret longiss. fortè iam superuacaneum longius agere. Idcirco mihi libet de illis tantum signis agere, & duas priores causas nempe vitium vterus & vasorum nec non sanguinis possent demonstrare. Siquidem huiusmodi cause & differentie, sicut accidunt frequentissimè, & etiam sunt reliquis maioris momenti unde etiam mihi propositum esse de ijs tantam curationem tradere.

Itaque si menstrua supprimantur vicio vteri, quem dixim<sup>9</sup> posse laborare omni genere morborum, i.e. Si morbus fuerit in mala dispositione, ut si os vteri distortum sit aut ruersum fuerit, si propter aliquod impedimentum illud sit clausum aut imperforatum, cuiusmodi ferè morbi solent esse naturales: sed utcumq; sit, tunc mulieres perpetuo menstruorum suppressione laborant, ac omnè steriles redduntur. Atq; ij quidem morbi tactu potissimum obstetricis videntur posse deprehendi, ut colligitur ex Gal. la. ad finem. Et si nec fortè defuturae  
sint



sint quaedam coniecturae, quae huiusmodi morborum aliquam significationem facere possint. e. g. Si mulier in coitu nullam delectationem accipiat: imò etiam dolore & molestia afficiatur, si os uteri à partibus circumiacentibus comprimatur, uniuersum corpus & plenius & crassius apparebit. Deinde verò si uterus laboret intemperie, aut primùm frigida, & quod contingit frequentissime in hoc casu, mulier minimè erigens appetens coitus, nullamq; in eo voluptatem percipit, aut nunquam, aut rarissimè, & non nisi tardissimè semen emittet, corpus uniuersum minimè benè coloratum, sed albidius. Præterea verò torpidum & frigidum euadet, pulsusq; erunt rariores, somni longi & profundi, omnia excrementa, loti egestionem & cætera frigiditatem solent attestari. Huiusmodi mulieres iuuantur à rebus calidis, læduntur à frigidis. Si uterique intemperies fuerit sicca, ferè totum corpus erit emaciatum & siccum, omnes ueniunt quodam modo inanes & vacuæ apparebunt. Excrementa omnium partium erunt pauciora.



a & sicciora, præcessere vigiliæ, labores,  
ignes euacuationes & similia, quæ va-  
totum corpus & partes exiccare, hui-  
modi mulieres à rebus humidis bene ha-  
t, à siccis offenduntur.

Modò restant duæ intemperies com-  
ita calida & sicca, frigida & sicca, quæ  
signis simplicium intemperierum facile  
unt colligi, ut pluribus non sit opus. Quod  
emum fiant intemperies cum materia, hæc  
erali velutiquadam gravitate & pondere  
erit cognosci, sicuti altera ex parte in-  
peries sine materia omnis gravitatis &  
uderis solent esse immunes. Speciatim ve-  
i uterus laboret vel Erysipelate, vel  
icro, vel alio tumore præternaturam, ex  
oprijs signis, cuiusq; morbi licebit in co-  
m cognitionem deuenire, quod item de  
rbis in soluta vnitæte statuendum est.  
d ad alteram rationem laborantis v-  
i accedamus: Si vasa quæ pertingunt  
uterum reddantur angustiora, quàm ut  
ea menstrua transire possint, siquidem id  
t propterea, quod illa sint obstructa, cum  
obstru-



obstructiones, Gal. autore, fiant vel nimia copia, vel mala qualitate humorum, licet huiusmodi obstructionis signa colligere quae vel copiam, vel vitium humorum significant, vel plenitudinem, vel cacochymiam, ex habitu corporis & ex temperamento, ex praecedente victus ratione, & ceteris id genus, de quibus saepe diximus. Vt cumq; autem huiusmodi vasa uteri copia vel vitio humorum obstructa fuerint mulieres circa regionem uteri, & partes proximas in solitam quandam gravitatem solent percipere, quam retenti humores si multi, siue vitiosi tanquam superfluum pondus inire solent excitare. Sin autem si obstructione vasa reddita sint angustiora aut natura & primo ortu aut deinceps temporis, quod potissimum diximus fieri inducta aliqua intemperie ac potissimum frigida & sicca, quae signa iam diximus eiusmodi intemperies in utero significare eadem quoq; ad vasa & adhuc locum referenda sunt.

Restat



Restant igitur signa quæ demonstrant vitium esse in sanguine, vel materia fluente ad uterum, cuius occasione menstrua supprimuntur. Cum autem Galenus doceat, id non aliter fieri, quàm si id, quod vacuatur vel crassum, vel glutinosum fuerit: Ex ijs omnibus licebit huiusmodi sanguinis vitium colligere, quæcunq; ex temperamento, ætate, habitu corporis, ex præcedente victus ratione, ex excrementis vel aliter frigidioris & crassioris sanguinis copiam possunt significare, præterquam quod ex gravitate uteri, & partium proximarum fortè etiam vniuersi corporis, & alijs id genus symptomatibus licebit id ipsum confirmare. Atq; tatenus de signis. Itaq; nihil aliud restat, quàm vt curationem aggrediamur.

Cum plurimi sint affectus præternaturam, & illi quidem grauissimi, qui sequuntur suppressionem menstruorum, quorum nonnulli ad ipsum uterum, nonnulli ad cerebrum, cor, ventriculum, & cæteras principes corporis partes propè omnes, nonnulli demum ad corpus vniuersum pertinent,

D quibus



quibus partibus & vniuerso corpori certum  
 est, vterum mirabiliter & frequentissimè  
 consentire, de quibus affectibus sequentibus  
 suppressionem menstruorum Auicenna pe-  
 culiare caput instituit lib. 3. Fen. 21. tract.  
 3. cap. 26. Gallenus item lib. 6. de I.  
 Affectis. 5. Aph. comment. 57. 3. Prorrh-  
 ticorum comment. 31. de sectione venæ ad-  
 uersus Erasistrat. ca. 1. & 3. Hip. de morbi-  
 mulierum diffusè, propterea in curatione  
 huiusmodi morbi, necesse est medicos sum-  
 mum studium & diligentiam adhibere. Et  
 si verò, ut diximus, variae sint differentiae  
 pro varijs causis suppressionis mensium, qui-  
 bus diuersa quoque curandi ratio videtur con-  
 uenire: Verùm tamen ad totam huiusmodi  
 curationem duo communes scopi mihi vi-  
 dentur posse referri, quorum alter vni-  
 cuiusque causae rationem habeat: Alter in e-  
 versetur, ut sanguis reddatur fluxilis, &  
 menstrua prouocentur. Sed antequam cu-  
 rationem & particularia remedia aggre-  
 diamur, videndum est, Num liceat propo-  
 sitis scopis satisfacere, nec ne, facile an di-  
 ficile

Indicatio-  
 nes seu sco-  
 pi commu-  
 nes curati-  
 ni.

Prognosti-  
 con.



icile, breui an tardè: vno verbo, quid me-  
 dicus sibi vel alijs de suppressione mensum  
 possit promittere. Fuit sententia Hip. 1.  
 de morbis mulierum, (pag. 311. codice Ba-  
 filieusi latino circa principium pagina) Si  
 menstrua supprimantur sex menses illa non  
 amplius prouocari, & malum fieri incur-  
 abile. Altera autem ex parte apud eundem  
 Hip. 4. Epidem. 92. legimus historiam  
 cuiusdam ancillæ, cui 7. annos retenta fue-  
 rint menstrua, quæ demum redierunt. Vn-  
 de illa pristinum habitum bonum & sanita-  
 tem recuperavit. Sic habemus alteram hi-  
 storiam s. Epidem. circa principium vxor-  
 is Gorgie in Larissa, cui menses fuerunt  
 suppressi per 4. annos, qui deinceps redierunt,  
 & illa pristinae sanitati fuerit restituta. Sic  
 habetis historiam apud Gal. 6. Epidem.  
 section. 3. 29. illius mulieris emaciata, cui  
 menses octo menstrua defecerant, cui sangui-  
 nem misit copiosissimè, Et vt finiam, experi-  
 entia confirmat quotidie, nonnullas mulie-  
 res quibus vltra sex menses menstrua reten-  
 ta sunt, sanari. Ego verò cenſeo nullum



certum iudicium de hac re fieri posse, sed pro varietate mulierum, ætatis, habitus corporis, studiorum vitæ, sed ante omnia pro varietate causarum, propter quas menstrua supprimuntur, nonnullas mulieres facile, quasdam difficile, alias nulla ratione sanari posse. Atq; ut vos quoq; æquiore animo feratis, si mulieres se aliquando vobis offerant, quibus nullis remedijs & rationibus possitis menstrua prouocare, sciatis neq; diuinum Hip. semper præstare potuisse, qui scribit in fine libro 6. Epidem. fuisse duas mulieres alteram Phaetusa Pythæ coniugem, alteram Namysiam Gorgippi uxorem, quibus cum menstrua multo tempore defecissent, atq; ille simul cum alijs medicis omnia fecisset, quæcunq; fieri potuerunt pro eorum prouocatione, tamen illa nunquã rediisse, & utramq; non multo post mortuam fuisse. Sed ad institutam curationem redeamus.

Curatio-  
His præst.  
112.

Diximus duos esse communes scopos, quibus vniuersa ratio curandi suppressa  
men.



menstrua, videtur contineri. Ac primus  
 erat, vt singularum causarum habeatur  
 providentia, propter quas contingit suppres-  
 sionem menſtruorum fieri. Secundus ve-  
 ro vt ſanguis præparetur, & ad fluxionem  
 idoneus reddatur. Quoniam verò quod ad  
 primum ſcopum pertinet, ſi velimus ſingu-  
 las cauſas perſequi, hæc vna tractatio tam  
 foret prolixa, vt cæteris tractandis mulie-  
 rum affectibus tempus non vacaret, idcirco  
 vt ſæpè diximus, mihi ſtatutum eſt de il-  
 lis tantummodò cauſis agere, quæ cæteris  
 ſunt frequentiores & maioris adiuuenti. Il-  
 læ verò ſunt cum menſtrua ſupprimuntur,  
 Vel per vitium vteri, vel ſanguinis viti-  
 um. Et cum vterus multis quoq; morbis  
 poteſt laborare, vt ſuprà diximus, par-  
 tim natura & primo ortu contractis, par-  
 tim tractu temporis acquiſitis, de quibus  
 pariter foret longiſſimum verba facere.  
 Cæteris omnibus prætermiſſis cum potiſſi-  
 mum quàm plurimi nullam curationem re-  
 cipiant, mihi libet de ea ſuppreſſione men-  
 ſium, atq; illius curatione verba facere,

D 3

que



quæ vel propter vteri intemperiem, & vasorum ad eum pertinentium, vel propter vitium sanguinis solet oriri, itaq; rem aggreddior.

Intemperies, quæ potissimum sunt in causa suppressionis mensium, statuta sunt cum Auiic. duæ simplices: altera frigida, altera sicca: Duæ compositæ, altera calida & sicca: altera frigida & sicca. Incipiamus nos à simplici materia frigida, & quoniam illi ferè semper coniungitur vitium sanguinis, qui in huiusmodi intemperie facilè crassior & glutinosior redditur, quàm ut fluere possit, non alienum fuerit has duas causas coniungere, ac de vtraq; simul pertractare, cum pariter ambæ à suo ortu ferè proueniant, adeò ut intemperies vitium sanguinis, & vitium sanguinis intemperiem maximè soleat iuuare & augere. Indicationes curandi ferè sunt manifestæ. Vterus nec non vasa ad uterum pertinentia laborant intemperie frigida, Ergo illa calefacienda sunt. Sanguis in utero & vasis contentus crassior est, glutinosior & ad fluxionem ineptus. Ergo



Ergo oportet illum attenuare, incidere, & ad fluxionem idoneum reddere. Sed quoniam ex communi methodo nunquam licet ad hæc particularia deuenire, nisi primum habeatur ratio vniuersi corporis: idcirco ante omnia de corporis vacuatione communi cogitandum est. Si quis enim statim principio nulla præcedente generali purgatione velit ijs vti præsidijs, quæ possint in temperiem auferre, humores præparare & mensēs prouocare, is prorsus nihil proficiet, non verò & morbum & causam morbi deperirem efficiet, & totam curationem reddet difficiliorem. Verum ad particularia præsidia veniamus. Cum suppressio menses non sit morbus acutus, sed det inducibilis, non modò licet, sed etiam maxime opportunum est & vtile primo loco aluum lenire, quod quidem fieri potest dupliciter: Et Clysteribus, & medicamentis.

Ergo sint Clysteria moderata, id est, quæ valeant moderatè calefacere & flatus dissoluere, Et sit exemplum, Re. flor. Chamomeli, arthemis. ana M. sem. anisi

D 4

fœnic.

Seml anis.  
fol. in cal.  
drach. iij.  
vel ad sum.  
vne. j suf-  
ficiat.



Non drach  
iij sed vnc.  
iij vt in o-  
mnib. prec.  
apparet, le-  
gendum.

fœnic. ana. ℥j. fiat decoctio. Rec. Præ-  
dicta Decoct. lib. j. ol. Chamomel. suchar.  
rubri ana ℥iij. M. pro clystere. Sequitur  
medicamenta longè maiorem & vtiliorem  
operam præstant, inter quæ testimonio Gal.  
l. de sang. miss. & consensu omnium, hiera  
principem locum obtinet, quod illa possit  
non solum purgare excrementa, quæ in ven-  
triculo, & primis vijs continentur, sed et-  
iam crassos humores attenuare, incidere, ac  
reliquas partes tum maximè vterum cale-  
facere & iuuare: & quomodo hiera sola &  
simul cum alijs medicamentis potest  
administrari, habetis exempla: Exemplum  
hieræ solæ. Re. spec. hier. simpl. ℥ iij.  
cum melle rosato qu. suf. mis. fiat bolus.  
Re. spec. hier. simpl. ℥ ij & sem. cum  
Syrupo de betonic. q. s. misc. fiat bolus.  
Item, Re. Mellis Rosati solutiui ℥ ii  
decoctionis seminum citri parum mis. fiat  
potio, quæ statim post hieram accipienda  
est. Re. spec. hier. simpl. ℥ iij elect. leni-  
tiui vel flor. cassiæ nouiter extract. ℥ vj.  
mis. cum sucharo, fiat bolus. Nonnulli in  
mulie-



mulieribus abhorrent vsum cassiæ, sed si ea  
 ermisceatur cum hiera vel aliter corri-  
 atur, tutò, mea sententia, potest adhiberi,  
 & ego vtrumq; medicamentum, hieram in  
 uam & cassiam simul mistum, familiariter  
 oleo administrare.

Lenita aluo statim occurrit consultatio  
 de sanguinis missione, quæ multas continet  
 difficultates. Ac Primò est Aëtius qui l. 16.  
 ca. 51. scribit, mulieres quæ non purgantur  
 ob plenitudinem, venæ sectione curari, qua-  
 si verò cæteris quæ carent plenitudine hoc  
 remedium non conueniat: cui opinioni fa-  
 uent quàm plurimi, qui generaliter do-  
 cent, nunquam sine plenitudine sanguinem  
 mittendum esse. Deinde sunt alij, qui  
 hoc remedium non probant, quotiescunq;  
 mulieres ex causis frigidis mensium suppres-  
 sione laborant, de quibus agemus in præ-  
 sentia. Cui pariter opinioni fauent quàm  
 plurimi, qui in morbis tantū calidiorib; &  
 in copia calidorum humorū sanguinis mis-  
 sionem solent probare. Aduersus vtramq;  
 opinionem quam existimamus falsam & a

Sanguinis  
 missio.

D. S. Gal.



Gal. mente alienam esse, nolumus hoc tempore longius agere, qui id fecimus ex professo & acuratissimè in disputationibus editis. Quamobrem mea quidem sententia ita agendum est, in qua libet suppressione mensium quaecunq; illius fuerit causa, & quaecunq; fuerit humorum copia & conditio, sectionem venæ non modò utilem, sed etiam necessariam esse, dùm modò per vires & ætatem liceat huiusmodi remedium administrare. Etenim sectio venæ tot & tantas utilitates potest afferre, quæ alioqui satis cuiq; possunt constare, ut pro comperto habendum sit, ad prouocationem mensium nullum magis accommodatum & efficax remedium posse inueniri. Ex quo factum est, ut Auic. Paulus & omnes probati autores & veteres & recentiores, sed præ cæteris Galenus lib. de sang. miss. generaliter in suppressione mensium sectionem venæ non modò probent, sed etiam cæteris omnibus remedijs anteponant.

Est celebris & diu agitata difficultas de loco, vnde liceat sanguinem mittere in  
sup-



suppressione mensium. Namq; ex vna par-  
 te Aët. l. 15. ca. 57. iubet mulieris, quæ ob  
 plenitudinem non purgantur, venas cubiti  
 & cruris secandas esse. Ex altera autem  
 parte Galenus de sanguinis missione ca. 18.  
 tradens rationē generalem mittendi san-  
 guinis, secundum varias corporis partes ita  
 statuit, partes infra thoracem positas qua-  
 les nominatim recenset vesicam & uterū,  
 sectione venarum in poplite, malleolis iu-  
 uari: sed magis ad rem manifestè & ex-  
 pressè ca. 11. & 19. docet mulieribus, in  
 quibus suppressa sunt menstrua venas in  
 cruribus secandas esse, minimè in cubito, si-  
 quidem sectis venis in hac parte superiore  
 sanguis ab utero retrahitur & menstrua  
 purgationes retinentur. Plurimq; multum  
 laborant, vt has duas repugnantes opinio-  
 nes Aëtij & Galeni inter se concilient. Al-  
 comarus ca. proprio 107. inquit, Aëtium  
 magnam supposuisse plenitudinem. Cum  
 autem magna plenitudo copiosa vacuatione  
 indigeret, neq; eam vires aut reliqua  
 possent perferre, propterea de illius senten-  
 tia,



sentia, Primò venas cubiti, deinde venas  
cruris secandas esse, ut ex utrisq; tanta si-  
mul possit copia sanguinis vacuari, quan-  
tam vnica sectione plenitudo requirebat.  
Galenum verò ex vna parte non adeò ma-  
gnam plenitudinem inspexisse, ex altera  
parte vires robustas in mulieribus plenu-  
dine laborantibus supposuisse, & hac ratio-  
ne sectionem venarum inferiorum pro-  
bare, qui demum inquit sententiam Ga-  
leni, sectas venas in cubito mulierum pur-  
gationes renellere veram esse & recipien-  
dam, vbi post eas venæ inferiores non in-  
cidantur. Trincauell. longissimam de hac  
re disputationem facit, quàm vobis licet  
apud ipsum videre lib. 10. de morbis c. 4.  
l. 3. Consiliorum consilio 70. Summa autem  
est huiusmodi: Facile hanc litem posse di-  
rimi, si consideremus morbum varia ratio-  
ne curari, si ille solus fuerit, vel si ille con-  
iungatur cum altero morbo, qui tanquam  
causa priorem morbum fouet, vel maius  
periculum possit afferre. Vnde si quis con-  
sideret solum menstruorum suppressionem,

tunc



nunc certum est, sanguinem ad vterum  
 conuertendum, minimè ad alias partes re-  
 pellendum esse, ac propterea venas inferio-  
 res, minimè superiores fore incidendas. At  
 verò, si quis consideret non solum menstru-  
 um suppressionem, sed eam quoq; à totius  
 corporis plenitudine foueri, tunc rationi con-  
 uentaneum esse, vt sanguis potius ab vtero  
 auertatur, quàm ad illum conuertatur, ac  
 propterea potius sectionem venarum supe-  
 riorum, quàm inferiorum conuenire. Itaq;  
 Trincauell: concludit Gal. priorem curan-  
 di simplicis affectionis rationem, Aëtium po-  
 steriorem secutum fuisse, Et vtrumq; benè  
 sentire, nec alterũ alteri contradicere. Trin-  
 cauellio atq; huic opinioni ferè conuenit  
 Franciscus Valesius l. 2. Meth. med. c. 14.  
 Ludouicus Mercatus celeberrimi nominis  
 vir, Hispanus, qui de affectibus mulier. 4.  
 lib. conscripsit, ita statuit l. 1. c. 9. redun-  
 dante sanguine in toto corpore adeò vt ob-  
 stractionem in vtero aut vicinis partibus  
 efficiat, à distantissimis partibus, ab ea, quæ  
 affecta aut obstructa est, repellendum esse  
 cum



cum Aëtio, & ita superiores venas secandas esse: At verò sanguine redundante in ipso vtero aut in toto corpore, propter obstructionem vteri ipsius ex venis inferioribus sanguinem mittendum esse cum Galeno. Alij fortè aliter sentiunt.

Cæterum vt liberè dicam Altomar. Trinca. Mercatus, & quicunq; illis consentiunt hac in parte huius rei mihi videntur malè sentire, atq; vt id prætermittam, quod illi temerè & frustra conantur Galenum & Aëtium conciliare, qui ad nullam concordiam possunt adduci, ni equidem fallor, omnes eorum cogitationes sunt inanes, & multos errores continent. Ac primum voluntaria sunt quaecunq; Altomarus commiscitur de maiori ac minori plenitudine, de robore vel debilitate virium, de repetita sanguinis missione, quæ plenitudini respondeat, siquidem tam certum est, quàm quod certissimum, neq; Galenum neq; Aëtium de ijs ne verbum quidem fecisse, aut quicquam cogitasse. Sic interpretatio sententiæ Galeni Altomari inepta est, quasi verò non Galenus



nus absolutè & simpliciter varijs in locis  
 doceat, sectionem venarum superiorum  
 menstrua suppressere, neq; aliquando volu-  
 se eam limitationem adiungere, quæ pla-  
 et Altomaro, id nempè verum esse, nisi  
 posterius venæ inferiores incidantur. Dein-  
 e verò quantum opiniones quoq; Trinca-  
 elli & Mercati sint absurdæ, & à Galeni  
 mente alienæ, facile constabit, si primum  
 Galeni rationes & doctrinam intelligamus.  
 itaq; Galenus cum proximo superiore loco  
 locuisset, quid nam medico faciendum sit, si  
 x retentis mensibus & hæmorrhoidibus  
 sanguis in corpore fuerit coaceruatus ca. I I  
 locet, quid nam agendum sit in mulieribus  
 quibus menstrua purgatio suppressa est.  
 Huius doctrinæ summa est huiusmodi. In  
 his vacuationem minimè prorogandam  
 esse, quanquam venam incidere non est ne-  
 cesse, cum scarificationes malleolorum ad  
 vacuandum quod superuacaneum est suf-  
 ficere aliquando possint. Quæ quidem sca-  
 rificationes aliud quoq; habent commodum,  
 nempe quod mensium motum concitent,  
 quem-



quemadmodum etiam in malleolis & popli-  
tibus sectæ venæ faciunt, quippe, inquit  
Galenus, plenitudines à retentis mensibus  
ortas, ex cruribus omninò vacuabis siue in-  
cidere venam, siue scarificare oporteat.  
Etenim sanguinis missio ex cubito purgatio-  
nes muliebres reuellere consuevit: Hæc Ga-  
lenus c. 11. sic posteriore ca. 19. tradens ra-  
tionem varias venas secandi pro varia-  
te partium laborantium de retentis hæmor-  
rhoidibus ac menstruis ita statuit, si propter  
retentas hæmorrhoidas velimus sanguinem  
mittere, siquidem eas velimus cohibere, ve-  
nas quæ sunt in manibus: Sin autem velim  
eas prouocare, venas quæ sunt in cruribus  
secandas esse. At verò in quibus sunt suppressa  
menstrua, semper in quâ semper sanguine ex  
inferioribus mittendū esse, cuius varia cura-  
tionis rationem reddit, quoniam non ita se re-  
habet in menstruis & hæmorrhoidibus.  
Namq; menstrua purgatio, cum sit natura-  
lis, nullum periculum afferre, & propterea  
nulla mulier cupit ab eiusmodi vacuatione  
liberari. In hæmorrhoidibus autem, si va-  
cuatio sit præter naturam, nonnullæ quidem  
cupiunt



upiunt eas habere, nonnullæ autem libe-  
 ri eiusmodi vacuatione volunt, à qua pe-  
 riculum imminet aliquando, ne homo ad  
 nalum corporis habitum, ad hydropem, &  
 ad interitum deducatur. Itaq; inquit Ga-  
 lenus, in ijs in quibus suppressa sunt men-  
 strua semper venas, quæ sunt in cruribus in-  
 idere oportet. Ex his duobus locis Galeni  
 manifestissimè licet intelligere, quamobrem  
 Galenus in suppressione mensium nunquam  
 velit venas brachij, perpetuò venas cruris  
 secandas esse, nimirum quod venæ superio-  
 res menstruas purgationes cohibeant, infe-  
 riores duo præstent, & vacuationem pleni-  
 tudinis & prouocationem mensium. Quod  
 si ita serres hæc habet, iure mihi videor di-  
 xisse, Altom. Trin. Mercatum temerè ac  
 frustra laborare, vt Aëtium & Galenum  
 concilient, qui conciliari nullo modò possunt,  
 omnesq; eorum conciliationes inanes esse ac  
 multis erroribus scatere. Etenim qui ge-  
 neraliter docet omnem plenitudinem ex sup-  
 pressis mensibus ortam, omninò ac sem-  
 per ex cruribus, nunquam ex brachijs va-  
 cuan-

E

cuan-



cuandam esse, quod facit Galenus, minimè potest alteri conuenire, qui docet quandoque ex brachijs sanguinem mittendum esse, quod facit Aëtius. Hæc sunt cōtradictoria nec simul possint consistere. Pariter est intelligere, quantum singula istorum hominum responsiones à scopo aberrant, & multas absurditates contineant, de quibus mihi videtur superuacaneum longius agere. Cum igitur in hac re Galenus & Aëtius dissentiant, & vterq; habeat suos sequaces, iam nunc restat, ut videamus, vtri melius sentiant, & quidnam medicos in mensium suppressione agere oporteat, cum res sit longè maximi momenti & ad probam curandi rationem maximè pertineat.

Proposita est difficultas de loco, vnde oporteat in suppressione mensium sanguinem mittere: proposita est aduersaria sententia Aëtij & Galeni, propositæ sunt responsiones & conciliationes variorum auctorum: nunc restat videndum vtri melius sentiant. Ego verò sentio sententiam Galeni sententia Aëtij & ceterorum omnium longè



longè anteponendam esse, & quoniam decisio huius controuersie tota videtur dependere ex natura, & vi sectionis venarum brachij & cruris: videndum est, quid utraque valeat, & quas vires obtineat.

Galenus inquit venam sectam in brachio reuellere menstruas purgationes, venam sectam in crure vacuare plenitudinem & menses prouocare. Alteri autem quatenus pertinet ad venam brachij, fatentur quidem sectionem huiusmodi venæ reuellere ab utero, sed ea limitatione, quæ fuerat Alcomari, nisi posterius venæ cruris aperiatur, quatenus autem pertinet ad venam cruris, hanc fatentur, ut puto, menstrua prouocare, sed negant plenitudinem ac potissimum insignem euacuare. Sententia Galeni rei naturæ videtur planè conuenire, quia res ipsa demonstrat sectionem venæ superioris fluxionem sanguinis ab utero reuellere & impedire: sectionem autem venæ inferioris fluxionem sanguinis ad uterum trahere & conuertere. Et quatenus pertinet ad plenitudinem non puto eos negare;

E 2

sectio



sectionem inferioris venæ de sententia Galeni, eam vacuare posse, qui id testatur, tam apertè & tot locis, non solum de sectione venæ, sed etiam de malleolorum scarificatione, ut nullus de hac re dubitationi locus videatur superesse. Sed fortasse illud simpliciter negant, quicquid Galenus sentiat, quod multi hoc tempore audent facere, quàm benè autem ipsi viderint. Quid enim prohibeat cur secta venæ & ea quidem magna, quales sunt venæ crurum, non totum corpus, & qualibet plenitudo possit vacuari? Alteri autem contendentes sectionem venæ superioris non reuellere ab utero, dum modò posterius aperiantur venæ inferiores, sua ipsorum responsione redarguuntur. Siquidem manifestè fatentur secta vena brachij menses impediri, ut propterea opus sit altera sectione venæ inferioris, quæ huiusmodi impedimentum possit auferre. Verùm sicuti docent Theologi, non esse facienda mala, ut eueniant bona: ita equidem puto, nunquam homini à medico malum inferendum esse, ut deinceps illi succurratur, præterquam quod



quod non semper in nostra potestate positum sit, huiusmodi malum corrigere, cum fieri possit, ut magis valeat secta vena superior ad impediendum, quàm altera inferior ad pronotandum menstruas purgationes. Si quis verò est demum, qui his omnibus non acquiescat, is quaeso secum reputet, an liceat aliquando mulieri puerperæ, cui retenti sunt menses, Venas superiores incidere, tametsi hæc mulier magna & summa plenitudine laboret. Neq; enim puto aliquem tam infantem & insanientem esse, qui id audeat asseuerare. Quod si in suppressione mensium magna urgente plenitudine, per aduersarios licet primum superiores, deinde inferiores venas incidere, idem quoq; de mulieribus puerperis statuendum esse videtur, quod tamen existimo neminem dicturū aut facturum esse. Itaq; concludo quicquid Aetius & eius sectatores sentiāt, in suppressione mensium cum Galeno nunquam venas cubiti, sed perpetuo venas crurum secandas esse. Hunc locum tractavi longius, quod ille mihi videtur longè maximi momenti,

E 3

neq;



neq; satis ab aliquo hactenus explicatus fuisse. Verum cætera quæ restant persequamur.

Si quærat aliquis, quo nam tempore & qua mensura sanguinem mittere oporteat. Huic inter cæteros respondet Paulus lib. 3. cap. 61. quod pertinet ad tempus, decem dies post præscriptum tempus mensium sanguinem mittendum esse, quatenus verò pertinet ad copiam, non plus 2. libr. cum  $\frac{1}{2}$  ne etiam minus 1. libr. sanguinem fore detrahendum. Sed Paulus fortè de utraq; re malè sentit, siquidem tempus oportunum huic remedio illud potissimum videtur censendum esse, quando natura consuevit eiusmodi purgationem aggredi. Cum enim certum sit naturam hoc tempore moueri & conari, ut noxium excrementum deponatur, omnis ratio colligit, & sectionem venæ, & omnia præsidia, quæ hunc naturæ conatum possint iuuare, tunc opportunissimè administrari. Vnde sunt nonnulli qui in suppressione mensium decrescente luna sanguinis missionem probant, quod ferè mulieres  
hoc



hoc tempore menstruas purgationes soleant  
 habere: quæ videtur fuisse sententia Aristot.  
 . de gen. anim. cap. 4. 4. de gen. an. c. 2. qui  
 tribuit mulierib<sup>9</sup> menstrua secundum natu-  
 ram mensib<sup>9</sup> decrescētibus fieri, quod huius-  
 modi tempus primo mense frigidius sit. &  
 humidius, idq<sup>3</sup> propter lunæ decrementum  
 & defectum. Nam quod sol per totum an-  
 num hyemem & æstatem facit, idem per  
 mensem luna videtur agere, quod quidem  
 non accessu & discessu lunæ sicut fit de sole,  
 sed increcente & decrecente illius luce con-  
 ingit fieri. Quamobrem vt idem scribit  
 Aristoteles 7. de historia animal. cap. 2.  
 nonnulli sexum fœmineum lunæ tribuunt,  
 quod simul illa decrescat, & mulier purge-  
 ur, moxq<sup>3</sup> ambo repleantur. Sic Galenus  
 tribuit lunam determinatum tempus men-  
 truorum in mulieribus conseruare, 3. de  
 diebus Criticis cap. 2. Quoniam verò vs  
 cribit Aristoteles loco citato 2. de gen. ani-  
 mal. cap. 4<sup>i</sup> & confirmat experientia, men-  
 trua in mulieribus nullo certo dierum cir-  
 cuitu definiuntur: præclare Galenus mihi

E 4

videz



videtur hoc tempus statuiffe triduum aut  
quatrimum ante consuetum mulieri cir-  
cuitū, quandocunq; illud contingat, de san-  
guinis missione cap. 18. cum enim hoc tem-  
pore natura menstruas purgationes appetat  
nulli dubium esse debet, quin tunc secta ve-  
na ex vna parte medicus naturæ propensio-  
nem iuuabit, vt ex altera medicus, natu-  
ram adminiculantem sit habiturus. Ad  
quem modum idem scribit Galenus, Medi-  
cos qui Romæ mulieribus medicabantur  
tempore quo eruptio menstruorum expe-  
ctabatur, venæ sectionem vsurpare consue-  
uisse, vt propterea ego sum nescius, quid  
Paulo in mentem venerit cum velit die de-  
cima post præscriptum muliebris purga-  
tionis terminum, sanguinem mittendum  
esse, cum id tempus deficiente qualibet na-  
turæ propensione & conatu ad prouocanda  
menstrua ineptissimum censendum sit. Et si  
non ignoro nonnullos, vt tueantur Paulum  
quasdam suas subtiles cogitationes proferre,  
quæ mihi ab omni ratione & probabilitate  
videtur alienæ. Sic sententia Pauli de san-  
guinis



uinis copia reiicienda est, quandoquidem  
 cet mulieribus maiorem vel minorem san-  
 guinis copiam detrahere, pro varietate ple-  
 titudinis, pro qualitate sanguinis, ætatis.  
 temperamenti, corporis habitus, temporis  
 anni & similibus, ut nullo modo certa quæ-  
 lam mensura possit definiri, ad quem mo-  
 dum habetis historiam apud Gal. 6. Epid.  
 Sect. 3. 39. illius mulieris 8. menses sup-  
 pressionem purgationis menstrua laborantis  
 cui supra 3. libras sanguinis misit, atq; il-  
 lam breuissimo tempore in pristinum habi-  
 tum restituit. Cæterum hoc loco minimè  
 prætermittendum est Galeni præceptum,  
 cuius ille meminit de sanguinis missione ca.  
 11. nimirum, Mulieres quæ cæteris sunt  
 candidiores, sanguinem magis tenuem  
 coaceruare consueuisse, ac propterea  
 malleolorum scarificatione maximè iuuari.  
 Alteras autem quæ nigriores sunt, cras-  
 siorem magis & melancholicum sanguinem  
 congregare, & idcirco ex sectione venæ ma-  
 iorem utilitatem percipere, id quod eo ma-  
 gis faciendum est, si illæ magnas habeant  
 venas, cum ferè semper contingat, ut mu-  
 E s                      lieri-



lieribus gracilioribus & nigrioribus, vena  
magna, obesis verò & candidioribus exi-  
gua vena appareant. Itaq; sicut in nigriori-  
bus praestat venam incidere, quàm malleo-  
los scarificare, quod crassior earũ sanguis dif-  
ficile per scarificationes, commodè secta ve-  
na educatur: ita in cãdicionib; praestat mal-  
leolos scarificare, quam venã incidere. Cum  
enim huiusmodi mulieres venas in cruribus  
habeant exiguas, hinc fit, etsi venæ probè à  
medicis incidantur, vt sanguis nihil ominus  
ne quidem mediocriter possit profluere.

Diximus multa de sectione venæ,  
sed hoc demum loco illud quoq; ex Galeno  
sciendum est, sanguinis missionem, seu ve-  
nam incidere, seu malleolos velimus scari-  
ficare, partiendam esse, adeò vt vna die ex  
vno crure, postridiè ex altero sanguis detra-  
hatur Lib. de sanguinis missione 18. Namq;  
hac partita vacuandi ratione, præterquam  
quod vires minus laborant, sanguis magis  
excitatur, mouetur, & ad fluxionem pro-  
pensus redditur: Quod quidem præceptum  
Galenus observauit in ea muliere, cuius in  
superiore lectione mentionem fecimus, cum  
illis



lli primo die sesqui libram, postero die lib. j.  
 tertio ℥ viij sanguinis detraxerit. Neq; ve-  
 rò illud ago in presentia, vt demonstrem  
 scarificationem malleolorum apud veteros  
 sitatam, à nostris cucurbitulis incisis  
 nultum differre: (etsi non ignorem  
 multos vel præclaros medicos, & inter cæ-  
 teros Auic. aliter sentire) qui id feci ex  
 proposito & diffusè in disputatione de sco-  
 tis mittendi sanguinis. Præter sectionem  
 venæ & scarificationem malleolorum  
 sunt multi, qui in suppressione mensium hæ-  
 morrhoidum apertionem probant, quasi hac  
 operatione sanguis ad vterum trahatur, ac  
 menstrua possint iuuari, quos quidem censeo  
 in magno errore versari. Et quamobrem  
 ea censeam facit Galenus, qui docet aper-  
 tione huiusmodi venarum ab utero deriva-  
 tionem fieri. Itaq; ille tradens ex Hip. leges,  
 euulsionis & derivationis de singulis corpo-  
 ris partibus ita statuit s. Meth. 3. Quæ flu-  
 unt per aluum, ea vel per lotium, vel per v-  
 terum fore transmittenda, quæ fluunt per  
 otium, ea vel per vterum, vel per aluum  
 deriuanda. Et alio loco magis expresse li-  
 bello



bello de cucurbit. scarit. c. 18. ita inquit: Si mulieri per homorrhoidas sanguis irrum-  
pat, illum commodè ad venas vteri deriuari, quod si quæ ducuntur ad intestina & hæ-  
morrhoidas, ab vtero deriuationem efficiunt. Non ego satis intelligo, quomodo aper-  
tio hæmorrhoidarum mensiuorum prouo-  
cationem non possit insigniter impedire  
præterquam quod ex anatome licet intelli-  
gere, inter venas vteri & hæmorrhoidas,  
nullum propè consensum extare.

Postremò ad hunc locum cauteria quoque  
cruribus aut coxis in vsta videtur pertine-  
re, quæ multi contendunt ad peruocatio-  
nem mensiuorum esse accommodata. Inter  
quos est Mercurialis, qui scribit Tom. 2.  
consil. consil. 26. 4. de morbis mulierum ad  
finem, qui inquam, scribit, se multiplici ex-  
perientia didicisse, cauteria infra genu po-  
sita, suppressos menses reuocare. Sed neque  
huiusmodi præsidium rationi & doctrinæ  
Galeni omni ex parte mihi videtur conue-  
nire, siquidem fortasse hæc vlcerata menstrua  
purgationes potius ab vtero deriuant, quàm



ad vterum detrahant. Et memoria est re-  
 etendum, Galenum docentem causas sup-  
 pressionis mensium culpa totius corporis,  
 am quoq; causam commemorasse, quoties-  
 unq; humores ad alias partes, quàm ad v-  
 terum habent inclinationem, ad quem mo-  
 tum dixit, nonnullas quoq; excretiones, siue  
 naturales, siue artificiosas, qualia sunt vl-  
 cera, sanguinem ab vtero reuellere aut de-  
 iuare, & ad alias partes transferre, Idq;  
 circa huiusmodi cauteria vos cohortor, vt  
 discatis cautius agere, nec tam facile &  
 frequentèr vsum eorum probare, sicuti hoc  
 tempore à multis fieri solet.

Post hæc ad medicamenta prouo-  
 cantia menses deueniendum est. Sed tunc  
 antequam ad hæc deueniamus ac potissimè  
 ad valentiora, de totius corporis purgatione  
 cogitandum est. Cum autem redundant  
 humores frigidi, crassi, pituitosi, primum  
 necesse est illa exhibere, quæ illos incidere,  
 attenuare, præparare possint, inter quæ vi-  
 tus ratio, quæ extenuandi vim habet apud  
 Galenum de sang. miss. 18. principem lo-  
 cum



cum obtinet, de qua cum habeamus integrum Galeni libellum, qui satis cuiq; esse possit, in præsentia non est pluribus agendum. Medicamenta autem ad hanc rem accommodata plurima sunt, quorum catalogus apud omnes & veteres & recentiores facile potest haberi. Itaq; ea tantum libet mihi vobis proferre, quæ cæteris mihi videtur præstantiora, & quibus ego familiariter uti soleo. Hæc verò sunt leuiora quidem: Syr. de beton. de Arthemisia, mel rosat. decocta betonica, hysopi, ceterach. Valentiora Syrupi de 2. vel 5. radicibus, byzantinus, oxymel compositum, decocta seminum & radicum fenic. pulegij, Calamenthi & similium. Et pro junioribus sit exemplum. Re. Syr. de betonica, de arthemisia, byzantini cum aceto ana ʒ s. decoctionis hysopi, betonica an. ʒiij misc pro syrupo. Concoctis & preparatis humoribus ad eorum purgationem licet deuenire.

Sunt autem medicamenta partim simplicia, partim composita, quæ ad hanc rem sunt accommodata. Ex quibus sicuti



cuti de præparantibus factum est, mihi li-  
 et tamen proferre, quæ præ ceteris proba-  
 i & administrari solent. Talia sunt inter  
 simplicia Turbith, agaricus: inter composita  
 elect. Diaphœnic. hiera, diacolocynthidos,  
 ill. de hiera cū Agarico, cochia, trochisci  
 alhandal. quod quidem postremum medica-  
 nextum cæteris omnibus anteponendum  
 est. Pro iunioribus sint itidem exempla:  
 Re. Agaric. trochiscati ℥is. Gingiberis  
 ʒ i o. decoctionis beconicæ q. s. fiat infusio  
 a. & facta expressione adde elect. diaphen.  
 l. hiera diacolocynth. ana ℥iij mellis ro-  
 ati solutiui ℥iiss misc. fiat potio. Item, Re.  
 ill. alephang. ℥s cochiar ʒj misc: fiant  
 v. & deaurentur, de quibus me-  
 dicamentis, illud est aduertendum, ea nun-  
 quam fore exhibenda quo tempore natura  
 menstruas purgationes solet appetere & ex-  
 purgare, siquidem hoc tempore exhibita tra-  
 hendo humores ab utero ad alias partes, pos-  
 sent naturæ maximum impedimentum ad-  
 ferre. Toto corpore expurgato, tunc oportu-  
 nè ad ea medicamenta accedendum est,  
 quæ



quæ possunt vteri & vasorum intemperien-  
frigidam auferre, crassiores sanguinem in  
vtero & vasis contentum incidere, atte-  
nuare, & vno verbo, quæ valeant menstrua  
prouocare. Quæ quidem cum sint multi-  
plicia, partim simplicia, partim compo-  
ta, partim externa, partim interna, quæ  
varijs rationibus possunt administrari, ac  
veram exercitationem mihi libet de singu-  
lis, sed quàm breuissimè addere. Non igitur  
ago in præsentia vt exponam, qualis nan-  
sit causa medicamentorum prouocan-  
tium menstrua, & quomodo ea differant  
medicamentis prouocantibus lac & lotium  
quod posterius mihi est propositum facere  
in tractatione de fluxu muliebri vel vterino  
ad quem locum tantum hæc tractatio vide-  
bitur pertinere. Peruenimus ad medica-  
menta prouocantia menses, quæ sunt du-  
plicia, partim interna, partim externa.  
Primum igitur sunt medicamenta inter-  
na. Syr. de betonica, de arthemif. de ca-  
lamenth. byzantinis, decocta seminum &  
radicum fœniculi, Petroselini, asparagi,  
cicerum



icerum rubeorum, calamenthi montani,  
 dictamni cretensis, pulegij, sabinae, rubeae  
 inctorum & similium, Habetis exemplum.  
 Re. Syr. de arthemis. ℥j mellis rosati co-  
 ati ℥s decoctionis calamenthi, pulegij  
 ℥v mis. pro syrupo. Sunt conseruae capil. ♀  
 betonicae, saluiae, Roris marini, quibus vel  
 solis, vel simul cum alijs medicamentis licet  
 uti. Exemplum, Re. Conseruae saluiae,  
 capill. ♀ beton. ana ℥j cinamomi elect.  
 dictamni cretensis, calamenthi montani  
 ana ℥s cum syr. de arthemis. q. s. mis. fiat  
 electuarium. Sunt rotulae siue confectiones  
 arom. rosaceum, diamoschum, diambra,  
 Sed praeter ceteris diacalamentum ex descri-  
 ptione Galleni 4. de T. V. videtur habere  
 insignem prerogatiuam, & sit exemplum.  
 Rec. spec. diambrae, diacalamenthi ana ℥j  
 suchari fini, ℥iiij cum vino aromatic. mis.  
 & fiat confectio in rotulis. Apud Rasen. 9.  
 lib. ad Almanforem c. 83. sunt trochisci de  
 myrrha, quos, ille inquit, in ducendis men-  
 struis tam esse efficaces, ut foetum quoque pos-  
 sint educere, ac sanè praclarissimam saepe-  
 F numero



numero operam præstant. Galenus Castoreum probat maximoperè, de quo ita scribitur 11. de simpl. med. C. de Castoreo: retentis mensibus, ubi ex vena, quæ in talo est sanguinem modicè detraxisset oblato Castoreo una cum pulegio aut calamentho, se experitum esse hoc medicamentum purgatione prouocare. Postremò sunt magna antidota Michrid. & Theriaca, quæ inter cætera ad roborandum ventriculum, & uterum frigidiorum & humidiorum, nec non prouocandos menses, mea quidem sententia postremū locū non obtinent. Sed tamen post hæc omnia non prætermittendus est potus aquarum Thermalium calidiorum, quales sunt nostræ Aponitana, aquiariana & similes. Cum ratio persuadeat & ratio confirmet frequentissimè hoc naturale præsidium id feliciter præstitisse, quod alia præsidia præstare non potuerunt. Sed quoniam scimus viros clarissimos de hoc remedio aliter sentire, qui potissimum mouentur authoritate Auicennæ, mihi liceat hunc Auicen. locum duobus verbis perpendere. Verba Auicennæ

su



nt huiusmodi lib. 2. cap. 59, de aqua. Et  
 nes aquæ minerales faciunt urinae diffi-  
 cultatem & parturiendi, & menstruorum.  
 go verò nescio, quomodo id generaliter pos-  
 de omnibus aquis mineralibus pronun-  
 iari. Nam sicuti rationi consentaneum est  
 quas aluminosas, ferreas, & omnes quæ-  
 unq, refrigerandi & astringendi vi prædi-  
 e sunt, menstruas purgationes impedire.  
 ta altera ex parte neq, à ratione alienū est,  
 quas sulphureas, nitrosas, bituminosas, &  
 quæcunq, calefaciendi, abstergerendi, aperi-  
 endi vim habent, menstrua purgandi vim  
 habere. Quod dixi, experientia euidentissi-  
 mē & frequentissimē confirmat.

Deinde sunt medicamenta externa  
 qua pariter sunt quam plurima, ac varijs ra-  
 tionib<sup>9</sup> administrantur. Ac primū sunt, lo-  
 tiones & balnea, quæ possunt esse partim na-  
 turalia, sicut ex aquis Thermarū calidiori-  
 bus, partim artificiosa, quæ ex congruis  
 medicamentis solent parari. Exemplum  
 sit. Re. flor. chamomel. arthemis. puleg.  
 Calamenthi, dictamni Cretensis, Sabine, ci-  
 clami.



claminis ana Mj. Se. anisorum, fœniculi,  
 Dauci, ameos ana ℥ss. Mis. omnia deco-  
 quantur in aqua. Huiusmodi lotionum &  
 balneorum duplex est usus. Primus ut  
 mulieris lauentur & balneentur crura. Al-  
 ter ut tota mulier vsq; ad umbilicum in ta-  
 li balneo aliquandiu sedeat & moretur.

Secundo sunt nonnulla medicamen-  
 ta, quæ iniiciuntur in vuluam, vulgò pess-  
 vel pessaria appellantur. Sunt autem velu-  
 ti suppositoria, quæ ex varijs medicamen-  
 tis lana vel bombyce, vel re simili ex-  
 ceptis, conficiuntur, ut commodè in puden-  
 dum mulieris possint imponi, quæ quidem  
 longiore tempore debent retineri. Et habetis  
 exempla. Ac primum antiquissimus est v-  
 sus folij radicis & succi Mercurialis, quæ  
 quidem vel sola, vel cum alijs medicamen-  
 tis possunt administrari. Itaq; licet solam  
 radicem, & sola folia supponere, licet ex  
 folijs & radicibus succum extrahere, eumq;  
 vel solum vel cum alijs medicamentis, vel  
 linteolo excipere, quæ pessaria sicuti fami-  
 liaria, ita optima sunt, sed tamen leuiora  
 Sic



c præparantur pessaria ex rebus odora-  
 tis myrrha, belzoim & similibus. Habeatis  
 exemplum, Rec. Ladani optimi part. ij  
 belzoim, myrrhæ, ana part. j. moschi parum  
 ei liliorum alborum cum aromatibus q. s.  
 formam commodam. Sed illis valentiora  
 adhuc sunt quæ conficiuntur ex colocynthide  
 ciclamine, scammono & similibus, & sit  
 exemplum. Rec. Fellis bubuli, succi ciclami-  
 nis ana ℥j pulpæ colocynth. ℥ij myrrhæ e-  
 t. ℥j, misc. fiat pessarium.

Tertiò sunt suffitus vel suffumigia, quæ  
 notissimùm ex rebus odoratis conficiuntur,  
 unde est Aphorif. V. aph. 28. suffitus aro-  
 natum mulieri. Et habeatis exemplum,  
 Rec. Belzoini, styrac. calamit. myrrhæ,  
 odellij ana ℥j Gallie muschatæ Mes. ℥ss Zi-  
 bethi ℥ss styracis liquidæ vel olei de spica  
 odorati q. s. fiât pillulæ vel trochisci, ex qui-  
 bus modico igni impositis vapor seu fumus  
 eleuatur, quem mulieres commodè recipi-  
 unt accommodato vase ad vterum, qualia  
 sunt, quibus repleri solent vasa vinaria  
 parua, si pars latior supra ignem & fu-  
 mum



munum ponatur, pars verò angustior veluti cannula in pudendum iniiciatur. Quia verò huiusmodi suffitus, ut docet Hip. aph. superiore, solet gravitatem capitis inducere, mulieres ita debent pannis muniri, ut ne vapores ad ipsum caput possint penetrare,

Quartò sunt nonnulla medicamenta, linimenta, emplastra, fomenta, quæ ad infimam abdominis partem, & omnes locos muliebres solent accommodari, quæ ex iisdem componuntur medicamentis, de quibus satis diximus. Tamen nec grauabor vnum aut alterum exemplum afferre. Rec. olei amygd. dulc. ℥ij lil. alb. cum aromatibus de cheiri (florib. illius) ana ℥j ol. ex seminibus anisorum ℥ij (oleum valde efficax in affectibus uterinis) misc. Exemp. aliud: Rec. pulegij, calamenthi, dictamni, arthemis. ana misc. cinnamomi, Caryoph, myrrhæ, balsami, ana ℥j farine cicerum rubeorum lib. j. M. cum vino albo aromatico ad ignem, & fiat emplastrum.

Postremo loco, præter ea, quæ supra diximus, conueniunt omnia genera reuul-



euulsionum, frictiones, ligaturæ, cucurbi-  
 ula, tam scarificata, quam sine scarifica-  
 tione, quæ omnia ad partes inferiores, coxas  
 & crura adhibenda sunt. Atq; hæc de sup-  
 pressionem mensium propter alteram intem-  
 periem simplicem vteri nimirum siccam, nec  
 non propter intemperies compositas, cali-  
 dam & siccam, frigidam & siccam, de qui-  
 bus cum Auic. supra diximus. Sed tractatio  
 foret nimium prolixa, neq; angustia præ-  
 sentis temporis patiuntur, vt omnia possi-  
 nus examinare & absolvere. Quamobrem  
 cum liceat vtiq; ex ijs, quæ hætenus tradita  
 sunt, & rationem curandi cæteras intempe-  
 ries, & singula præsidia sibi comparare, mi-  
 hi libet huic tractationi, quæ nescio quomodo  
 longior euasit, quam mea voluntas fuerit,  
 finem imponere. Gratia exempli, in simplici  
 intemperie sicca est facile intelligere, ca-  
 uendum esse ab omnibus tum alimentis tum  
 medicamentis, quæ siccandi vim habent,  
 totamq; curationem perficiendam esse, cum  
 ijs, quæ humectandi facultate prædita sunt.  
 Ac de his fortè mulieribus intelligebat Ga-



lenus L. aduersus Erasistrateos cap. 13. quando scribit Medicos Rationales humidam victus rationem & copiosa balnea concedere consueuisse, postquam mediocris copia sanguinis ex cruribus detracta, purgationem confestim succedere volebant, quod idē de altera intemperie composita calida & sicca, frigida & sicca, statuendum est. Diximus menstrua in mulieribus aut prorsus retineri, aut diminui, aut deprauari. Et diximus de retentione mensium. Quoniam verò menstrua retinentur & diminuuntur, propter easdē causas, aut vehementiores aut debiliores, & utriq; eadē curandi ratio competit: Prætermissa tractatione de menstruis imminutis, statim ad menstrua deprauata veniendum est. Itaq; menstrua fluunt deprauatè multis modis. Ac primum quidem locum apud Galenum 3. de Sympt. causis cap. 4. obtinet illud symptoma, quod græcè *ῥῆς γυναικῶν*, latine fluxus muliebris dicitur. Deinde verò sunt deprauati menses, quotiescunq; illi immoderatè, & sine ordine fluunt, quotiescunq; illi



li sine colore, flauī, virides, substantia te-  
 ues, crassi, viscidi, quotiescunq; mulieres,  
 no tempore menstrua fluunt, dolent capi-  
 te, dorso, ventriculo, & alijs partibus.  
 Tot itaq; modis fortè etiam alijs menses de-  
 rauantur, de quibus symptomatis non cer-  
 è omnibus, quod nimis longum foret, sed  
 de ijs, quæ sunt frequentiora & maioris mo-  
 menti statuimus agere incipientes à super-  
 flua mensum fluxione.

## CAPVT III.

DE IMMODERATA  
 TO FLVXV MEN-  
 STRVORVM.

**M**ulti existimant superfluum  
 fluxum menstruorum & fluxum mu-  
 liebrem, vnum atq; eundem morbum esse,  
 qui longè decipiuntur, cum sint duo distin-  
 cti morbi & affectus, vt manifestè docet Ga-  
 lenus 4. Loc. affect. ad finem, Siquidem in  
 superfluo fluxu menstruorum sanguis pro-  
 fluit,



fluit, qualis per menses naturales solet apparere, sed fluit immoderatè: in fluxu autem muliebri non sanguis, sed varia excrementa, aliquando aquosa, albida, aliquando alterius substantiæ euacuatur, ut proprio loco monstrabimus. Menstrua fluunt immoderatè dupliciter. Primo modo, S semel ac breui tempore confertim ac profusè exeant. Altero modo, si huiusmodi vacuatio perseueret plures dies, ad quem modum scribit Galenus 1. Epid, 2. commenta 4, Homines multas quoque pluuias appellare, vel si longiore tempore durent, licet non largè decident, vel si breui tempore largiter in terrâ decident. Et si quis à me quærat, qualis nam sit mensuræ quantitas, vel mēsuræ, quæ mulieribus secundū naturā debeant profluere, huic respondet Hip. 1. lib. de morbis mulierum, pag. 313. ad finem (in codice Basiliensi latino) in omni muliere sana moderatos menses esse duarum heminarum Atticarum, quæ circiter 20. 3 continent aut paulò plures, vel minores & pauciores, Sin autem longè plures & pauciores fuerint,

tunc



nunc menses morbosos esse. Sed fortè non ita  
 certa menstruorum quantitas potest defini-  
 ri, siquidem verisimile est mulieres pro  
 varia victus ratione, pro vario corporis ha-  
 bitu, & cæteris id genus, nonnullas copiosius,  
 nonnullas parcius purgari. Itaq; ego sentio  
 hanc mensuram definiendam esse facta im-  
 rimis comparatione ad mensuram & tem-  
 pus cuiusq; mulieris, dum illa integra frui-  
 tur sanitate. Exemp. grat. Si mulier fue-  
 rit assueta purgare iij libr. 3. dies, nunc verò  
 fluat sanguis iij lib. 10. dies, tunc licebit  
 asseuerare menses fluere immoderatè, præ-  
 terquam quod hoc ipsum licet intelligere ex  
 bona vel mala, ex facili vel difficili mu-  
 lieris tolerantia. Namq; si menses fuerint  
 immoderati, fieri non potest, quin mulier  
 hanc purgationem difficile ferat, atq; in ea  
 concurrant symptomata, de quibus statim ser-  
 monem habebimus.

Menstrua immoderata sine dolore ad  
 symptomata exeuntia immutata referenda  
 sunt. Sed cum hæc triplicia sint, ut docet  
 Galenus de sympt. diff. cap. 6. vel toto ge-  
 nere,



nere, vel qualitate, vel quantitate præter naturam, sciendum est, sicuti idem Galenus docet 3. de Sympt. causis cap. 2. omnes sanguinis excretiones ex nostro corpore esse toto genere præter naturam, ijs duntaxat exceptis, quæ mulieribus per uterum solent emanare, quæ sola quantitate à natura sunt aliena. Itaque immoderatus fluxus menstruorum est symptoma exiens immutatum non toto genere, non qualitate, sed quantitate præter naturam. Cum enim huiusmodi excretio sit naturalis, si ea tamen copia exeat, quæ superuacanea & inutilis est, si eadem modum excesserit cum quantitate, præter naturam censenda est.

Causæ.

Sed ad causas huius symptomatis progrediamur, quæ distinctè & accuratè à Galeno explicantur 3. de Sympt. causis cap. 2. 5. Aphor. Com 58. Ergo menstrua profluunt immoderatè (quod idem in quolibet sanguinis fluxu contingit) tribus de causis, vel propter facultatem, quæ vas sanguinem continens recludit, sicut in profluio



fluuio sanguinis è naribus, vel secundò pro-  
 pter sanguinem malè affectum, vel tertio  
 propter vitium vasorum. Ac primum  
 stud propter facultatem, quo loco est me-  
 moria repetendum pro iunioribus. Facul-  
 tates naturales, quæ omnib<sup>9</sup> membris insunt  
 §4. Attractricem, Retentricem, Altera-  
 tricem, Expultricem, quæ per propriam tempera-  
 menta suas operationes perficiunt, vt diffusè  
 monstrat Galenus 1. de facul. naturalibus.  
 Quamobrem ad fluxus menstruum im-  
 moderatos facit, si huiusmodi facultates  
 non probè fungantur suo munere, præcipuè  
 verò si facultas contentrix non retineat,  
 quæ & quàm diu sunt retinenda, quod in-  
 primis ex mala vteri, vel vasorum in-  
 temperie, vel humida vel frigida, vel vtraq<sup>ue</sup>  
 fieri solet. Pariter si facultas expultrix ni-  
 mium expellat, quæ & quando non sunt  
 expellenda, quod potissimum ex mala vte-  
 ri, vel vasorum intemperie, vel calida, vel  
 frigida, vel vtraq<sup>ue</sup> solet contingere. Secun-  
 dò menses fluunt immoderatè propter  
 sanguinem malè affectum, quod quidem  
 Gale-



Galenus docet fieri dupliciter: Primo modo, Cum ille redditus sit adeo vitiosus, ut vasa erodat in quibus continetur, quod non aliter videtur fieri, quam si sanguis reddatur tenuior, calidior, acrior, vel ex temperamento, vel ex victus ratione, vel aliter, aut quod ille permisceatur cum excrementis biliosis, cum salsa pituita, cum atra bile, quae omnia cum sint acriora, naturae molestiam inferunt, ex quo illa excitata & irritata eorum expulsionem molitur. Scit Avic. & cum eo multos praestantes medicos sanguinem male affectum interpretari, non solum si ille fuerit calidior, acrior, atque erodendi facultate praeditus, verum etiam si ille humidior & aquosior fuerit. Sed isti mihi videntur à Galeno & ratione dissentire siquidem Galenus unius tantum acrioris & erodentis meminit, qui solus reuera ipsa vasa potest aperire & disrumpere. Praeterea si sanguis fuerit male affectus propter multitudinem aquositatis & humiditatis ut loquitur Avicenna. tunc menstrua non forent sola quantitate praeter naturam, im  
ver



erò huiusmodi fluxio ad profluvium potius  
 muliebre, quàm ad immoderata menstrua  
 pertinere. Altero modo sanguis male  
 efficitur apud Galenum, cum ille ita est  
 ductus, ut in vasis contineri non possit, si qui-  
 em is quoque rumpere aut recludere vas po-  
 test. Quas quidem duas causas apertionis  
 vasorum, copiam scilicet & acrimoniam san-  
 guinis, ille quoque commemorat 4. Meth.  
 2. Diximus de duabus causis superflue flu-  
 cionis menstruorum. Itaque superest Ter-  
 tia propter vitium vasorum, quod qui-  
 dem vitium docet Galenus consistere in ni-  
 mia eorum mollietate & duritie, & tenuitate.  
 Idque nonnunquam in prima statim confor-  
 matione, quæ fit in utero, solet accidere.  
 Nonnunquam posterius, temporis progres-  
 sione. Hæc autem proveniunt, nimia molli-  
 ties ex redundante humiditate, nimia du-  
 rities ex siccitate, nimia tenuitas ex atro-  
 phia, id est, inopia alimenti. Quomodocun-  
 que enim uterus, & vasa ad eum pertinen-  
 tia, fiant molliora, duriora, & tenuiora, im-  
 moderatum sanguinis profluvium potest  
 succe-



succedere, siquidem quod immodicè molle  
vel durum est, frangitur faciliè, Molle  
quidem propter imbecillitatem, Durum  
autem propterea, quod amplius extendi non  
potest. Quod verò tenue est propter utros-  
què huiusmodi venarum defectus, h. e. pro-  
pter imbecillitatem & difficilem exten-  
sionem faciliè rumpitur. Et si quis cupiat  
magis distinctè intelligere causas, quæcunq[ue]  
possent uteri vasa aperire, atq[ue] eorum con-  
tinuum soluere, is confugiat ad Galenum  
de causis morborum L. ad finem, qui doce-  
illas esse duplices, Nonnullas quæ extrinse-  
cus irruunt, Nonnullas quæ ex corporis  
ipso ortum habent. Ad causas externas pos-  
sunt referri, quæ contundunt, vulnerant,  
vt casus ab alto, contusiones & similia, Me-  
dicamenta acria & erodendi facultate præ-  
dita, nimius ac frequens coitus, ac maximè  
si vir fuerit maximè mentulatus, sicuti pu-  
ellis deuirginatis aliquando contingit, qui-  
bus rumpuntur venæ uteri, & profluvium  
menstruorum succedit, & alia id genus quæ  
exterius accidunt.

Ac



Ad causas internas ex Galeno 2. referuntur. 1. Immoderati & inordinati motus. 2. Humores quidam deprauati, quibus erodendi vis inest. Itaque si mulieres frequenter & præter modum vehantur, currunt, saltent, choreas ducant, vel alia immoderatas exercitationes, vel labores subeunt, pariter, si in partu, vel abortu, vel propter magnitudinem fœtus, vel propter imperitiam obstetricis, vel propter aliam causam, contingat in utero atque illius vasis aliquam violentam ruptionem fieri, mulieres propter eiusmodi immoderatos motus in profluvium menstruorum solent incidere. Sic demum, si fuerint humores acres biliosi, salsi, adusti, qui in locis muliebribus possint aliquam erosionem, aliquod vlcus efficere, vel aliter continuum soluere tanquam causa interna, huiusmodi humores possunt profluvium mensium excitare. Atque hætenus de causis huiusmodi Symptomatis ad mentem Galeni, ad quas quidem, si quis voluerit animum adhibere, certum est cæteras omnes posse referri, quæcumque ab alijs proponuntur.

G

Signa



Signa Pathognomica.

Signa differentiarum.

Signa Pathognomica, quae immoderatum profluvium menstruorum demonstrarent, ex mulieris relatione fiunt manifestissima. Sed tamen nonnulla quoque Symptomata huiusmodi immodicas vacuationes sequuntur, quae id cuique satis confirmant. Illa verò sunt vitiosus color & tumor universi corporis, edema pedum, mala tum appetentia, tum concoctio, & reliqua, de quibus Galenus lib. 6. Loc. affect. ad finem. Avic. c. proprio, ac ferè omnes loquuntur quorum omnium facile est rationem reddere. Sed signa singularum causarum breuiter percurramus. Si menstrua profluant immoderatè propter vitium facultatis quae aut importunè expellat, aut nequea continere, quae alioqui forent retinenda tunc oportet ad ea confugere signa, quae vteri & vasorum intemperiem vel calidam vel frigidam, vel humidam vel siccam, vel simplicem vel compositam possunt significare, de quibus omnes tractant, & nos quoque saepe diximus: siquidem apud Galenum facultatem, aut esse temperamentum, aut

in te npe



temperamento suam essentiam habere, ex-  
 at. in calida intemperie mulieres circa  
 partes percipiunt caliditatem, maximè  
 electantur venere, concipiunt mares, & si-  
 milia. In frigida signa apparent contraria.  
 In humida intemperie loci muliebres per-  
 etuo madent, mulieres viuunt otiosæ, nul-  
 lus circa uterum percipitur dolor. In sicca  
 intemperie res contrario modo se habet.

Secundo succedit vitium sanguinis,  
 primum illius copia ex proprijs indicijs  
 plenitudinis deprehenditur, quæ à Galeno  
 tradita sunt L. de plenitudine & alijs locis,  
 qualia sunt tumor venarum, & vniuersi  
 corporis grauitas, rubedo, præcessit orium,  
 victus ratio copiosa, & similia. Deinde si  
 sanguis redditus fuerit calidior ac rarior,  
 siue id fiat propter intemperiem jecoris cali-  
 dam & siccam, inditia huiusmodi intem-  
 peraturæ sunt manifesta: Si verò id con-  
 tingat propter mistionem salsæ pituitæ, vel  
 aliorum humorum, tunc aderunt inditia ca-  
 cochymia, id est, redundantia vel vnius vel  
 alterius humoris, de quibus pariter tractat



Galenus, atq; ex temperamento, habitu corporis, præcedente victus ratione & similibus licebit iudicium facere. Tertiò, si fluant menstrua immoderata propter viciurn uteri & vasorum, quæ sint nimium aperta causa externa quæ contundunt, vulnerant casus ab alto, & similes, facile alijs referentibus intelliguntur. Causæ autem internæ quales potissimum sunt erosiones, ulcera & vno verbo, quælibet solutio continui ex copia humorum acriorum, ex doloribus, excrementis & alijs id genus symptomatis facile possunt iudicari.

Indicationes generales omnis fluxus.

De ratione curandi quemlibet fluxum sanguinis nostri corporis, diffusè & diligenter tractat Galenus s. Meth. c. 2. vsq; 7. Summa autem istius doctrinæ est eiusmodi: Quicumq; ex corpore sanguis effluit, ne amplius fluit & cohibetur, vel quoniam illi non fertur ad locum apertum, vel quia diuisio vasorum occluditur, vel simul propter utrunq; quæ ratio tutissima censenda est. Prohibetur sanguis vt ne confluat ad partem apertam, inducto animi deliquio, reuulsio



lisione facta ad contraria, deriuatione fa-  
 ctā ad vicina, refrigerando corpus vniuer-  
 ſum ac maximè partem affectam ex qua  
 sanguis profluit. Clauditur diuifio ſi quod  
 & diuiſum contrahatur, cōniueatq; vel ob-  
 ſtruatur. Sanè contrahitur pars diuiſa,  
 frictione, refrigeratione, vinculo vel aliter  
 ſi præſidijs, quibus conamur diuiſum cor-  
 pus vnire & coniungere. Obſtruitur autem  
 vel intrā vel extrā: intrā quidem à ſangui-  
 ne concreto, qui vulgo thrombus dicitur: ex-  
 tra tūm hoc ipſo ſanguine, tūm verò lini-  
 mentis, ſpongijs atq; ijs demum medicamen-  
 tis, quæ vel proprio lentore & craſſitiè mea-  
 ſus obſtruunt & claudunt, vel vrente vi ve-  
 luti operculum eſcharam, id eſt, cru-  
 ſtam inducunt. Verūm quæ de profundo cor-  
 poris ſanguinis profluvia ſiunt, quale eſt  
 profluuium menſtruorum, de quo agimus,  
 quæ nec vinculo, nec ſutura, nec ligatura,  
 nec ferramenti ignitis, nec alia ſimili ra-  
 tione poſſent ſanari, per reuulſionem ac de-  
 riuationem, nec non per alimenta, quæ em-  
 plasticam vim habent & refrigerent, ac de-

G 3

mum



num per medicamenta quae astringunt, sanari debent. Haec est praeclearissima Galeni methodus curandi omnem sanguinis fluxionem, quam, puto illum accepisse ab Hippocrate, qui una breuissima, sed grauissima sententia mihi videtur haec omnia complecti. Illa autem habetur 6. Epidem. Se. 7. tex. 3. & est huiusmodi: Sanguinem ex venis permanantē sistunt animi deliquiū, figura alio tendens, venae interceptio, linamenti in orbe conuolutio, appositio, deligatura. Etenim Galenus sententiam hanc admirabilem in commento vocat, illamque exponit accuratissime atque asserit omnia complecti, quaecunque ad nimiam sanguinis profusionum pertinent.

Indicationes fluxus  
menstrui.

Diximus de generali methodo curandi quemlibet fluxum sanguinis, Sed hanc methodum ad rem nostram accomodemus. In superfluo menstruorum fluxu duae se nobis offerunt indicationes curandi. Prima, ut sanguis non feratur ad vterum & vasa, quae ad illum pertingunt. Altera, ut locus apertus, per quem fluit sanguis, clau-



audatur. Ad primam pertinent præ-  
 dia, Primùm quæ reuellunt, Secundò  
 quæ deriuant, Tertiò quæ animi deliquium  
 ferunt, Postremò quæ refrigerant &  
 stringunt. Ad alteram sunt accommoda-  
 ta præsidia, quæ obstruunt & astringendi-  
 um habent, quæ non solum ad vterum, sed  
 ad partes illi proximas debent imponi, de  
 quibus sigillatim dicendum est. Vtrum ijs  
 indicationibus liceat satisfacere, nec ne, sci- Prognosti-  
con.  
 endum est, hoc negotiũ esse admodum diffi-  
 cile, ac mulieres maiori ex parte nunquam  
 sanari, atq; id potissimum usu venire, si in  
 vtero aut vasis ad illum pertinentibus, vel  
 profusio, vel aliqua insignis continui solutio  
 acta fuerit. Veruntamen nulli dubium esse  
 debet, quin difficultas curationis vel augea-  
 tur, vel minuatur pro magnitudiue ac diu-  
 rnitate symptomatis, pro habitu corpo- Curatio-  
nis p. æst.  
dia.  
 ris, temperamento, & similibus. Sed ag-  
 grediamur curationem. Sed ante omnia hoc  
 loco est aduertendum, vtrum huiusmodi  
 evacuatio per vterum sit critica & instituta  
 à natura, an symptomatica & præter na-  
 turam.



turam. Namq; Galenus sermonem habentem de Crisibus, quæ varijs excretionum modis, & per varias corporis partes fieri solent, mensium quoq; & purgationis per uterum mentionem facit 3. de Crisib. ad finem: Quoniam nonnulla quoq; signa commemorat, in signum gravitatem lumborum & dolorem, & tensionem quæ huiusmodi Crisim precedere consueverunt. Sic Auic. Fen. 21. libr. 3. tractatu 3. C. 4. statim initio capitis de cura superflui fluxus sanguinis mēstrui docet aduertendū esse, an vacuatio sit facta secundum semitam expulsionis naturalis, in quo casu inquit Auicenna, fluxus minimè est retinendus, quousq; vires integræ permaneant. Itaq; negotium foret permittendum naturæ iuxta sententiam 1. aph. 21. Quæ iudicantur & iudicata sunt, &c. At verò si euacuatio non fuerit Critica, quod potissimum licet intelligere, quod ea non conferat, neq; mulieres benè ferant, imò quod ea sequantur symptomata, de quibus supra diximus. Iam licet illius curationem aggredi. Itaq; primum occurrunt reuulsiones, inter quæ



as Hipp. cucurbitulae vsum, robat s. aph.  
 10. Si mulieri menstrua volueris cohibe-  
 re, cucurbitulam quam maximam sub  
 mammis defige. Et ratio est in promptu  
 propter communicantia vasorum, quibus natu-  
 ra utramque partem mammas & uterum  
 voluit coniungere, ut diffusè Galenus mon-  
 strat 14. de vsu part. cap. 4. & 8. Sic con-  
 veniunt frictiones, ligaturæ, compressiones  
 partium extremarum: de quibus tamen du-  
 bium videtur, utrum ad partes inferiores,  
 vel superiores debeant adhiberi, & occasio  
 dubitationis est, quoniam primum est  
 Hip. 2. de morbis mulierum circa princi-  
 pium, qui docet ligaturas atque, ut ipse loqui-  
 tur, laqueum non solum supra cubitos, sed et-  
 iam ad poplites supra genua apponendum  
 esse. Deinde sunt Paulus Lib. 3. 62. Aët.  
 L. ult. 64. Auic. c. proprio: qui fortè ad-  
 herentes sententiæ Hipp. iubent frictiones  
 & ligaturas faciendas esse non solum mani-  
 bus, sed etiam cruribus, atque ab inguinibus  
 exordiendum esse. Præterea neque huiusmo-  
 di sententiæ à Galeni mente videtur aliena

G s      fi



si velimus leges reuulsionis & deriuationis  
 considerare, hæc remedia infernis partibus  
 adhibita, videntur ab vtero, & reuellere &  
 deriuare, Et Galenus docet manifestè, sectu-  
 venis in cruribus, reuulsionem ab vtero fie-  
 ri, qui scribit ad hunc modum de sang. miss.  
 c. 18. quæ sectiones venæ ex cruribus fiunt  
 non solum reuellant, sed etiam menses solent  
 euocare. Vnde in phlegmone vteri huius-  
 modi venas in cruribus incisas magis pro-  
 bat, quàm alteras in cubito, quod profectò  
 non fecisset, nisi ille censuisset venas crurum  
 ab vtero posse, & reuellere & deriuare,  
 cum fateantur omnes inflammationi & re-  
 uulsionem & deriuationem conuenire. Al-  
 tera autem ex parte Galen⁹ apertissimè do-  
 cet, huiusmodi reuulsiones ad partes superio-  
 res, minimè inferiores fore adhibendas, atq;  
 ex multis locis satis sit vnicum omnium luce-  
 clariorè proferre. Itaq; Galen. 1. ad Glauc.  
 c. 14. hæc habet: Sed neq; malum, manus &  
 crura alligare. Oportet autem nexus fieri  
 plures ac fortiores circa manus, quando per  
 inferiores partes fiunt euacuationes, quem-  
 admo-



admodum quando per hamorrhoidas sanguis profluit, aut ventris profluvia adsunt, aut cum per vteros exeunt mulieribus menstrua. Nam si tùm crura fortius ligentur saepius aliquid ad partes inferiores attrahitur. Haecenus Galenus.

Ad dissoluendam hanc difficultatem, quam puto arduam esse, etsi pleriq; omnes conniuentibus oculis eam prætereunt, multis foret opus, atq; inprimis necesse est naturam ac præcepta, tùm reuulsionis, tùm deriuationis explicare, quod nimis longum esset. Quare illud vnum vobis sufficiat in præsentia: In superfluo fluxu menstruorum omnia genera reuulsionum partibus superioribus adhibenda esse, cum reuera & rei natura, & Galenus doceat apertissimè, reuulsionis vim in eo potissimum consistere, ut humores in contrarium sui motus trahantur & deducantur. Sed quid ad positas authoritates oportet respondere. Primum ad Hipp. L. 2. de morbis mulierum, Ego quidem censeo eum textum planè esse deprauatum, cum manifestè repugnet illius doctrina.



Erina, qui non solum docet in aphorismis  
 sicuti diximus, ad cohibendos menses cucur-  
 bitulam sub mammis affigendam esse, Se-  
 etiam hoc ipso loco scribit cucurbitulas su-  
 mammis affixas eleuandas, ac modò  
 ad dexteram modò ad sinistram partem  
 transferandas esse. Ad Paulum, Aëtium  
 & Auicennam quid aliter dicendum est  
 quàm eos fuisse deceptos, qui sine ullo deli-  
 ctu solent multa alteri ab alteris transcri-  
 bere, id quod multifaciunt quoque recentio-  
 res. Vnde Alth. hoc loco de sententia Pau-  
 li & Aëtij probat inguina vinctis fore  
 excipienda, tametsi ille ex Galeno ferè vn-  
 verborum serie aliter statuit, & sectione  
 venæ & omnia reuellentia præsidia superi-  
 ribus partibus adhibenda esse. Sed veni-  
 mus ad Galenum, & quoniam hic locus est  
 longè maximi momenti, & multas continet  
 difficultates, mihi liceat paulò altius eu-  
 examinare. Hic Galeno propositum fu-  
 rat nos docere discrimen & commodum  
 sum sectionis venarum vel cubiti vel crur-  
 qui scribit omnes partes superiores corporis  
 thoracicae



thoraci, & in thorace contentas, sectione venarum in cubito iuari, partibus autem inferioribus thoraci, sectionem venarum in cruribus magis conuenire, quas partes inferiores ille interpretatur, quæ iuxta coxam, vesicam & vterum sunt. Inter utrasque autem eiusmodi partes superiores & inferiores, Renes tanquam ancipites & medium quendam locum obtinentes à Galeno constituuntur. Vnde fit ut sectione venarum ex utrisque iuuentur partibus. Ex superiori quidem parte, si phlegmone recens fuerit, & sanguis redundantia affuerit, Ex inferioribus autem si phlegmone fuerit inueterata, nec sanguis redundare videatur. Post hæc Galenus de Phlegmone uteri sermonem instituens inquit: Eam magis, quàm phlegmonem renum à venis in cruribus sectis iuari, & statim hæc addit: vacuationibus enim, quæ in cubito fiunt, aliud etiam quoddam malum accedit, quippe menstruas purgationes supprimunt, eo quod sanguinem ad superiora corporis reuellunt: quæ verò ex cruribus fiunt, non solum reuellunt, sed etiam



iam menses solent euocare. Hac verborum serie manifestum est, Galenum tanquam opposita comparare inter se, sectionem venae in cubito, & sectionem venae in cruribus, Ex quo omnis ratio colligit contrarias quoque facultates & vires utrisque necessario tribuendas esse. Quod si per Galenum sectio venae facta in cubito, ex utero ad superiores partes sanguinem reuellit, & menstrua suppressit purgationes, ut altera sectio facta in crure, sanguinem ad uterum trahat & menstruas purgationes promoueat, necessarium est.

Attulimus locum Galeni, in quo illud docet, sectionem venarum in cruribus non solum reuellere ab utero, sed etiam menses prouocare. Etsi autem latina interpretatio respondeat Graecae literae, veruntamen ego censeo sine dubio hunc locum esse deprauatum, atque illum sensu contrario legendum esse, sicuti eum legunt & interpretantur antiquus interpres, nec non Theodoricus Gaudauus, qui mea sententia verum Galeni verborum sensum exprimunt. Quod



quis cupit habere in promptu utramque huiusmodi interpretationem, antiquus interpres sua lingua ita loquitur: 'Nam eis, quæ à subito euacuant, & aliud quidem malignū, Detinent enim menstruales purgationes, antispasēs sanguinis ad corporis superiora. Eis verò quæ à cruribus non solum non antispasē, sed etiam prouocare inest menstrua. Interpretatio autem Gaudauicē huiusmodi: Quæ verò ex cruribus fiunt tantum abest ut retrahant, ut etiam menses promoueant: Quam quidem lectionem & interpretationem codices quoque Valgrisiani confirmant, quos scitis clarissimi nostri Paterni opera editos fuisse, huiusmodi enim interpretatione scitè priora posterioribus conueniunt, priora posterioribus respondent neque ulla repugnantia aut absurditas in Galeno potest afferri. Altera autem ex parte, si quis velit alteram lectionem & interpretationem seruare, quod inter ceteros perinaciter facit Fuchsius, ut multa in doctrina Galeni absurda consequantur necesse est.

Primum



Primum enim quomodo potest sectio  
venae in cruribus ab utero reuellere & men-  
ses prouocare? Hac simul non possunt con-  
sistere. Quae reuellunt ab utero menstrua  
prouocationem impediunt, quae menstrua  
prouocant, ab utero non possunt reuellere.  
Deinde si generaliter partes supra thoracem  
in cubito, partes autem inferiores sectione  
venarum in cruribus iuuantur, quomodo  
Galenus in libro de sanguinis missione c. 19.  
docet, Podagra laborantibus in cubito  
comitiali autem morbo & vertigini obnoxiiis  
potius in cruribus venas secandas esse. Quo-  
modo Galenus ad cohibendum superfluum  
fluxum haemorrhoidarum sectionem in brachiijs  
probat. Quomodo scribit Galenus  
de med. simpl. l. c. 2. In dolore coxendi  
sanguinem, primum ex cubito, deinde  
in cruribus mittendum esse. Demum si phle-  
botomia uteri à venis in cruribus sectis per  
se iuuatur, quomodo Galenus iubet me-  
nstrua non fore prouocanda? Quomodo as-



rit in locis muliebribus, in contrariū trahi si illa vena, quæ in cubito sunt incidantur? Sed de hac re satis. Facile autem isthæc omnia cessant, si intelligamus ad mentem Galeni, nunc venas in cubito, nunc in cruribus secandas esse, non solum pro varia ratione partium laborantium, sed etiam pro varia indicatione, quàm morbus & causa morbi nobis suggerunt, vnde vel reuellere vel derivare, vel simul reuellere & derivare opus sit. Ad quem modum et si partes, exem. grat. Cœca, vesica, uterus, quæ ratione sunt inferiores thoraci sectione venarum in cruribus magis iuvantur: veruntamen si contingat illas vel inflammatione, vel alio morbo laborare, vnde omnium primum sit necesse humores ad locum fluentes reuellere, jam licebit venas superiores incidere: sicuti contrà, et si partes superiores cerebrum, cor, pulmones, quæ ratione sunt superiores, sectionem venæ in cubito magis desiderant, nihilominus si aliquo morbo laborent, qui reuellendi indicationem adferat, tunc licebit venas in cruribus

H      incide-



incidere. Quod si demum non reuulsione, se  
vel dexiuatione, vel simul reuulsione & dexi  
riuatione opus fuerit, modò vnā modò al  
terā proximiorē & commodiorē ve  
nā licebit secare. Quae quidem omni  
multis Galeni exemplis facile esset confir  
mare: Sed ijs, quae diximus volumus esse  
contenti. Et illud tamen addere de sectione  
venae in cruribus vtero inflammatione la  
borante, quod videtur nescio quam difficul  
tatem retinere. Cum enim ex vna parte  
apud Galenum & omnes rationales medici  
satis constet, inflammationibus ante omni  
reuulsionem conuenire: Ex altera autē  
Galenus doceat inflammationes vteri secti  
onis in cruribus magis iuuari, hinc potiss  
imum. Fuchsius colligebat huiusmodi inf  
riores venas reuellendi ab vtero vim hab  
ere, Et propterea graecam literam & inter  
pretationem vulgatam illi respondentem  
seruandam esse hunc in modum: Quae venae  
ex cruribus fiunt non solum reuellunt, se  
etiam menses euocare solent. Vnde Fuchsius  
quoque vtero & vesica laborantibus doc



lib. 3. de medendis morbis Capp. proprijs docet, nec, mea sententia, sine magno errori, statim morbi initio venas crurum secandas esse.

Ego autem vno verbo respondeo, Galenum hoc loco docentem, inflammationes vteri ex sectis venis inferioribus in cruribus magis iuuari, intelligere, non de principio inflammationis, cui certum est, reuulsionem & sectionem venæ superioris conuenire, sed de inflammatione progressa, quæ non amplius reuulsionem, sed deriuationem & sectionem venæ inferioris requirit. Quod autem venæ sectio in cubito ab vtero reuellet, venæ in cruribus deriuent, manifestissime traditum est apud Galenum 2. ad Glauc. 2. cui inquit, in locis muliebribus, in contrarium trahes, si eas quæ in cubito sunt, venas secueris, deriuabis autem si eas, quæ sunt in poplitibus secueris. Sed ad institutum redeamus. Inter cætera omnia reuulsionum genera omnium consensu sectio venæ principem locum obtinet, in cuius administratione Galeni præ-

H 2

cepta



cepta retinenda sunt, Primum, Ex ca. 12. de sanguinis missione: Sanguinis missionem tantò efficaciorē esse, quantò maiorem in numerū particulares detractiones auctæ fuerint, adeò ut non modò semel, sed & bis, 3. & sæpius liceat quādocunq; sanguinem mittere, siquidem natura toties excitata & irritata, facilius ac maiori cum impetu assuescit in contrarias partes transmittere, quæcunq; ad locos laborantes confluunt. Secundum præceptum est ex c. 21. eiusdem libri, quod generaliter pertinet ad omnem iteratam sanguinis detractionem, in quibus studemus simpliciter vacuare, tempus accommodatum esse eundem diem, e. g. Manè bis, vel manè & vesp̄i eadem die sangis detrahatur. At verò in quibus volumus reuellere, melius foret, si vacuatio duobus deinceps diebus fiat, quod verisimile sit, naturam hoc modico temporis interposito magis moueri & excitari ad transmissionem humorum in contrarias partes, quàm si statim & momento temporis sanguis detrahatur. Atq; hætenus de reuulsione.

Hacte-



Haftenus diximus de reuulfione: post reuulfionem sequitur deriuatio, quae secundum praesidium fuerat seruiens primae indicationi, vt ne sanguis ad vterum vehatur. Ac primò cum deriuatio fiat ad loca vicina, docet Galenus s. Metho. c. 3. quae erumpunt per vterum, vel per vrivas vel per aluum deriuanda esse: Itaq; licebit capita venarum haemorrhoidarum aperire, vel aspera frictione, vel folio ficus & similitudine. Nonnulli probant aloën ore sumptam, quod inquiunt, peculiarem prouocandi haemorrhoidas vim habere, quod quidem remedij genus ab ijs aduertendum, qui ad prouocandos menses huiusmodi venas consueuerunt aperire. Sic licebit vel clystere, vel leuiore medicamēto, e. g. Cassia, Tamarindis, Myrabolanis, Prunis & similibus aluum mouere. Sic demum licebit, quae ad vterum confluunt, per lotia deriuare, illa exhibēdo medicamēta, quae propterea diurectia appellantur. Etsi multi hanc deriuationem, & huiusmodi medicamentorum vsum non probant, propterea,

H 3                      quod



quod quæ prouocant lotium, eadem quoque prouocandi menses vim habeant, qui decipiuntur, de qua re posterius tractabimus de fluxu muliebri, Sed quæ aluum & lotium? Auicenna probat vsum cucurbitularum, quas, inquit, ponendas esse super locum inter utrasque anchas, id est, coxendices. Quamobrem nec sententia mea foret inutile, si cucurbitulae vel scarificatae, vel sine scarificatione in posteriore, ac postrema parte dorsi in regione ossis sacri & ossis ilij sæpius imponerentur, & sic fortasse hæc verius reuulsio quàm deriuatio dici debet. Itaque tot modis licebit fluxionem menstruorum ad proximas partes deriuare.

Tertio loco fuerant præsidia ad primam indicationem accommodata, ut sanguis ad vterum non feratur, quæ nimirum animi deliquium inducant, id quod summa cum ratione euenit. Cum enim deliquium animi non aliter fiat, quàm laborante corde aut primario, aut alijs partibus consentientibus: Confestim sanguis ad internas partes recurrit, ex quo ægri palleſcunt & refrigeran-



gerantur- Vnde hac ratione sanguis aliò  
conuersus, non amplius ad vterum tendit.  
Hoc verò deliquium animi cum multis mo-  
dis possit induci. Exemp. grat. tristi nuntio:  
cum præcipuè ex vehementissimis doloribus  
facile excitatur: quos quidem dolores expe-  
dit in partibus superioribus excitari. e. gr.  
Violenter ligatis brachijs, compressis digitis  
manus: sed maximè omnium constrictis  
mammis, quæ ut diximus, longè maximum  
cum vtero consensum habet.

Postremò prohibetur sanguis, vt ne  
ad vterum defluat vsu medicamentorum,  
quæ refrigerandi & astringendi vim habet,  
ita vt ille cohibetur ac ferè immobilis red-  
ditur, & quoniam huiusmodi medicamen-  
tis conueniunt ferè altera quoq; medicamen-  
ta, obstruentia & astringentia, quæ ad po-  
steriorem indicationem pertinent, nempe vt  
loca vteri aperta, per quæ sanguis fluit,  
claudantur, mihi libet de vtrisq; simul age-  
re, vt ne cogar sæpius eadem repetere.  
Itaq; huiusmodi medicamenta, quæ sunt  
quam plurima, partim interna, partim  
H 4 exter-



externa, ex quibus mihi statutum est non-  
nulla seligere, quæ cæteris videntur effica-  
ciora, & quibus ego familiariter uti soleo.  
Interna sunt decocta, vel quæ sunt effi-  
caciores, succi endiuia, portulacæ, epaticæ,  
nenupharis, sed præ cæteris omnibus sim-  
plicibus medicamentis à Galeno 6. de simp.  
med. fac: ab Auerroe & omnib<sup>9</sup> adcohiben-  
dum fluxum sanguinis plantago solet pro-  
bari, quomodocunq; vel ex succo, vel pulue-  
re, vel decoctione, vel aliter præparetur.  
Sunt Syrupi violatus, de endiuia, de rosis  
siccis, de portulaca, de plantagine, de agre-  
sta, de ribes, sunt Conseruæ rosarum, viola-  
rum, cichorei, nenupharis, sunt corallia,  
margaritæ, bolus armena, terra lemnia,  
Rosæ, balaustie, acatia, hipocystis: sunt  
confectiones, diarrhod. Et postremo sunt  
medicamenta stupefacientia. Atq; si res  
valdè vrgeat, licet quandoq; deuenire ad  
Syr. de papauere, diacodion, philonium re-  
quiæ Nicolai, Theriac. recent. & alia id ge-  
nus. Ex quibus varia medicamentorum  
formæ possunt parari. Habeatis exemplū:

Re.



Re. Syr. de Endiuia ℥j

Portulaca ℥s

decocti Epaticæ

plantaginis ℥iij

Misc. pro syrupo.

Re. Succu plantaginis siccati ad so-  
lem ℥j

spec. diatri. santal. ℥s

Misc. fiat bolus (possunt exhiberi  
simul, vel ante decoctū, ut sæpè di-  
ctum.)

Re. Conser. rosa ℥j

nenuph. ℥j

Margarit. ꝑꝑ.

Cornu cerui usti ana ℥s

Boli armena

Terra lemnie ana ℥s

cum syr. de plant. q. s.

misc. & fiat electuarium.

Exemplum medicamenti stupef. aciensis

Re. Conseruæ rosarum ℥s

Philonij vel

Requiei Nicolai ℥iij

Mis. fiat bolus.

H s

Auicenna



Auic. inter plurima eiusmodi medicamenta probat vsū aceti, quod fortè alicui mirum videbitur. Cum vulgus opinetur acetum magna vi aperiendi praeditum esse. Veruntamen cum Auic. conuenit Galenus, qui l. de simpl. med. c. 18. & 19. astringendi vim habere, & sanguinem suppressere. Illud verò exhibendum est non solum sed aqua temperatum, poscam nominant sicuti in sanguine erumpente ex thorace exhibetur à Galeno s. Meth. 8. Sed non desunt, qui alia ratione aceti vsum in praesent casu non probant, quod nimirum videatur mulieribus, & vtero aduersari, vt docent Hipp. & Galenus 3. lib. de ratione v in morbis acutis 39. Ac reuera cum sint in promptu alia medicamenta, quae nullam continent difficultatem, mihi quidem tutius videretur, si medici ab illo abstinerent.

Sed ad medicamenta externa progrediamur, quae pariter plurima sunt, ac varijs modis conficiuntur, tametsi omnia eadem ferè naturam obtinent, nimirum m  
dic



licamenta, quæ astringendi & obstruendi  
im habent.

Inter medicamenta externa sunt pri-  
mum pessaria, quæ, vt sæpè diximus, sunt  
medicamenta duriuscula, oblonga instar  
suppositorij, vt commodè mulieribus suppo-  
sint, Et sit exemplum: *Re. Balaust.*  
*cor. gran. myrtillorum ana ℥ss Mel.*  
*q. s. mis. fiat pessarium.* Sed aliquando  
et huiusmodi pulueres excipere, vel lana  
vel bombyce, vel linteo serico tenuissimo, si-  
cut cum album: oui, oleo coton. aut simili-  
bus, & ita medicamentum supponere. De-  
inde sunt medicamenta liquidiora, quæ ac-  
commodato instrumento instar clysteriorum  
uterum injiciuntur, quos quidem uteri  
cysteres, vt Galenus notat *℞ Meth. c. 11.*  
Medici *Metrenchytas* appellant. Et sit  
exemplum:

*Re. Balaust.*

*Cor. granat.*

*Hipocystid.*

*Acatia.*

*Tragacantiana ℥ss*

*Dico*



Decoctionis rubi

Sumach.

(suc

Consolidæ, vel eius loco decoctione

Plantag. ℥iij misc.

Tertio sunt lotiones & balnea, in quibus mulieres debent insidere, inter quæ longæ experientia mihi compertum est, si crura & coxæ mulierum lauentur simplici aqua frigidior, tunc superflua menstrua maxime iuuari, & quandoq; ex toto supprimi. Sed tamen alia quoq; balnea parari possunt, quæ ex decocto plantag. portulacæ, lentisci, myrtillorum, consolidæ. cort. gaulther. Balaust. & similibus, conficiuntur quibus quidem ex præcepto Galeni Lib. 7. sumpta indicatione à situ partu laborantis, oportet nonnulla permiscere quæ vim eiusmodi medicamentorum cum possint deducere, sicut facit Avicenna qui simul cum cæteris medicamentis miscet Calamentum, tanquam reliquorum vehiculum, etsi ille ab ignavis medicis reprehenditur & irridetur, qui Rhodum conficiendi medicamenta non intelligunt. Postremo sunt linimenta, Episcopi



ta, Emplastra, quæ pectini, dorso & par-  
tis proximis solent adhiberi. Ac primum  
ut olea Citoneorum, myrtin. mastichin:  
ut si quis præterea velit oleum astringens  
parare, is Galeni regulam debet seruare,  
am ille tradit 4. tuend. Val. c. 8. Ea ve-  
re est, ut simplicia medicamenta decoquan-  
tur in oleo astringente, cui præterea adiun-  
tur portio vini vel aqua, ne medica-  
menta torrefiant. Decoctio autem fiat in  
simplici vase B. M. appellant, donec vinum  
vel aqua consumpta fuerit. Exemp. est o.

Re. Ol. oliu. astringentis vel omphacini  
libr. ij

Cort. granat.

Balaust.

Rhu obsoniorum

Hypocistis ana ʒi

Vini austeri astringentis libr s Con-  
rundantur omnia crasso modo &  
in vase vitreo benè obturato fiat  
decoctio, ut supra.

inde sunt Epithemata, quæ ex aquis stil-  
licij aut succis fieri solent:

Rec.



Rec. Aquarum Rosarum ℥iij  
Plantig.

Nenuphiana ℥ij

Troch. de camphora

Carabeana ℥is Mis.

pro Epithemate.

Quod non solum extra, sed etiam in  
locos muliebres potest adhiberi. Par  
sunt cataplasmata, emplastra, quae ex  
dem medicamentis componuntur, atq  
ijs quae haec ten. dicta sunt, facile poss  
intelligi.

Sed in officinis sunt duo; Unguenta a  
rum Comitissae, alterum decoct. Castan  
rum, quae insigni astringente facultate p  
dita sunt, quorum frequens est usus a  
Medicos ad cohibendos superfluos men  
imò verò ad prohibendum imminem  
ortum. Medici autem sicut diximus,  
plurimum dorso, nonnulli etiam pe  
mulierum haec medicamenta solent appo  
re, quamvis fortè huiusmodi vnguenta  
medicamenta hac in re non tantam ope  
praestent, quantam multi opinantur:



verisimile sit eorum vim non parum re-  
 nitti & labefactari antequam ad vterum  
 possint peruenire. Vnde mea quidem senten-  
 tia longè magis medicamentis intra locos  
 mulieris impositis, quàm externis fidendum  
 est. Quæ hæcenus de curatione immoderati  
 fluxus menstrui à nobis tradita sunt, vnius  
 potissimum symptomatis videntur ratio-  
 nem habuisse. Sed istud non est, satis nisi cau-  
 se symptomatis simul afferantur. Hæ au-  
 tem cum sint plures, certum est cuiq; pro-  
 pria curandi rationem convenire. Sed cum  
 non liceat omnia persequi, nos de ijs tan-  
 tum vna vel altera e. g. sermonem habe-  
 mus, quæ cæteris sunt maioris momenti &  
 frequentiores. Itaq; si menses immoderati  
 & nimia copia sanguinis: ille ante omnia  
 minuendus est ac potissimum sectione ve-  
 næ, & ea quidem copiosa, cum hinc nullum  
 periculum virium videatur imminere.  
 Ictenui victus ratione, atq; ijs alimentis  
 quæ parum nutriunt e. g. pisciculis, herbis,  
 cucurbitis & similibus. Sic exercitationibus,  
 frictionibus, & alijs modis licebit sanguinis  
 copiam



copiam minuire. Si verò sanguis non copius  
 sed nimia caliditate, tenuitate, acedine  
 fuerit vitiosus, quod contingit frequentissi-  
 mē, tūc præcipua sese offert remittendi et  
 corrigendi huiusmodi prauas qualitates indi-  
 catio. Et quoniam sanguis aut maiori ex par-  
 te, aut semper talis fit propter calidiorem jeco-  
 ris intemperiem: Idcirco refrigerationi huius  
 visceris in primis attendendum est. Et in  
 hoc casu inter cetera omnia præsidia aquæ  
 thermarum frigidiores habent insigne  
 prerogatiuam, quales sunt aquæ B. virg-  
 nis, villenses, & quæ omnium sunt efficaci-  
 simæ, Chalderianæ. Sed antequam ad hoc  
 alterantia veniamus, non solum utile, sed  
 fortè etiam necessarium fucrit, aliquam le-  
 uiorem purgationem adhibere, propter vi-  
 tiosos humores, quos verisimile est sangui-  
 ni permisceri, atque esse tanquam vehiculum  
 vnde ille facilius ad vterum deducatur.  
 Itaque redundante flauabile, excipiat  
 bolo cassiæ cum tamarindis, in potione Sy-  
 Ros. solut. Myrabol. & potissimum citri-  
 Rhabarbaro ex sero lactis & similib. Et si  
 exempla:



Re. Flor. Cass. recens extracta ℥j

Pulpæ tamarind. ℥s

Spec. diarrhod. ℥s

Misc. fiat potio.

Re. Myrobal. Citrin. ℥ij

Rhab. elect. ℥j fiat infusio s. a. in  
sero lactis vel decoctione fructuum

q. s. & facta colatura adde

Syrup. ros. Solut ℥is

Misc. & fiat potio.

Si redundet salsa pituita vel melancholia,  
exhibeatis agaricū, myrobal. chebulas, e-  
lect. lenit. & si opus fuerit, confect. hamech.

Neg. verò vnquam prætermittendum est,  
quin præcipuæ causæ & fonti prospiciamus.

Exemp. grat. cerebro, jecori, ventriculo (in  
his consistit vera curatio) vnde hi humores  
solent originem habere. Victus ratio, vno

verbo, sunt alimenta boni succi, facilis  
concoctionis, & quæ speciatim possint quoquo

modo sanguinem crassiorem reddere, atq;  
illius fluxibilitatem impedire, qualia forent

edulia ex farre, panico, oriza, lentibus, ci-  
toneæ, granata, mespila, & omnia mala

I adstrin-



astringentia. Herba, lactuca, plantago, portulaca, consolida, polygonum, Carni-  
 auicularum, quadrupedū, ac præcipue sy-  
 uestrium, ex quibus, cerebra, pedes, & vi-  
 cera omnia, quod cæteris partibus viden-  
 tur viscidiora, principem locum habent.  
 Potus sit vel vinum oligophorum, astring-  
 gens, vel aqua chalibeata, vel aqua in qua  
 plantaginis folia, radices & semina decocti  
 fuerint, vel quid simile. Atq; hætenus  
 superfluo fluxu muliebri.

## CAPVT IV.

DE VTERI PRO-  
FLUVIO SEV MEN-  
STRUIS ALBIS.

Essentia.

**A**Liàs de menstruis tractante  
 diximus profluvium muliebri & im-  
 moderata menstrua inter se differre, quo  
 manifestissimè colligitur ex Galeno, qui c.  
 L. Aff. ad finē primū tractat de immodera-  
 tis menstruis. Deinde tractationem perso-  
 quitur



uitur tanquam de re diuersa, de profluui-  
 oteri, quod, ille inquit, muliebri profluuium  
 appellatur. Sic Aëtius inter ceteros duo  
 separatim facit capita Lib. 16. Alterum  
 ap. 64. de nimia mensium purgatione: Al-  
 terum 65. de fluxu muliebri ex Archige-  
 ne. Sic Paulus duo separatim facit cap.  
 de huiusmodi affectibus duobus. Differentia  
 autem est huiusmodi, quod in menstruis  
 immoderatis sanguis propemodum sincerus  
 effluit: in fluxu autem muliebri planè varia  
 prodeunt excrementa, per quæ vniuersum  
 corpus solet purgari, de quibus postea statim  
 sermonem habebimus. Itaq, profluuium  
 vteri, vt ex Galeno colligitur in lib. 3. de  
 sym. Caus. c. 4. & 6. L. aff. ad finem c. 5.  
 non aliud, inquam, est, quàm destilla-  
 tio vteri diuturna, per quam vniuersum  
 corpus expurgatur, quod quidem sympto-  
 ma exiens immutatum inter deprauatas v-  
 teri fluxiones reponitur à Galeno 3. de sym.  
 Caus. c. 4.

Differentia huius sympt. plurimæ sunt, sed  
 communiores & potiores sumuntur, à qua-  
 litate

Differentia



litate excrementorum, quæ effluunt, quæ,  
dixi, planè varia sunt. Namq; huiusmodi  
excrementa, modò rubra, modò flaua, nunc  
pallida, nunc nigra, quandoq; alba, quā-  
doq; viridia, interdum serosa & aquosa  
fortè alijs coloribus & qualitatibus prædi-  
carent: quæ quidem, inquit Galenus, t  
lia sunt specie, quale est id, quod in anim  
te redundat. Etenim exēp. grat. Si quod e  
fluit quoquo modo rubrum fuerit, sangui-  
nem, si flauum aut subpallidum, flauam  
lem: Si album, pituitam: si aquosum, sero-  
excrementa certum est redundare in co-  
pore. Sed præter hæc omnia dubium videtur,  
an mulieres laborent gonorrhæa, id e  
seminis profusione, sicuti viri facere solent.  
Nonnulli fortè consentientes Peripatetici  
qui videntur mulieribus nullum semen tribuere,  
inquiunt, hoc vitium propriè virorum esse,  
minimè mulierum. Quibus ipse quoq;  
Galenus quoquo modo videtur fauere,  
qui vbiq; tractat de huiusmodi symptomate,  
tanquam de proprio virorum symptomate  
videtur de illo mentionem facere. Alter



Altera autem ex parte, Cum mulieres quoque sicuti viri habeant suos testes & vasa seminaria, eaq; frigidiora & imbecilliora, um pariter non careant semine, atq; illo quidem crudiore & tenuiore: cum demum in mulieribus eadem causæ possint conuenire, quæ in generanda gonorrhæa in viris concurrunt: mihi planè videtur consentaneum rationi & rei naturæ, mulieres non minus quàm viros hoc symptomate laborare posse. Sed illud notandum est, quod mulieres totam huiusmodi fluxionem, quandoq; & qualiscunq; ea fiat, alba menstrua solent appellare, quod omninò alba quedam excrementa perpetuò cæteris commisceantur. Nonnulli autem quarunt hoc loco: sicut non solum mas, sed etiam mulier laborat gonorrhæa, an pariter non solum mulier, sed etiam vir, menstruarum albarum fluxione possit laborare, quæ fluxio in marib; proportionem muliebri fluxioni respondeat? Et si verò multi id negant, & potissimū adducti argumento, quod mulieres sint viris frigidiores, ac propterea plurib; quoq; quàm viri

I 3

abun-



abundent excrementis: Veruntamen non  
 hi videtur alienum à ratione & rei natura  
 mares quoque eiusmodi fluxione laborare  
 Ac sane ego sentio medicos frequenter ha-  
 lucinari, qui opinantur, egrotas profusione  
 seminis laborare, cum magis aliorum ex-  
 crementorum fluxione laborent: siquidem  
 videmus plurimis egrotis hoc profluvium  
 multos annos perdurare, ex quo profluens  
 semine necessarium foret illos ad extrema  
 maciem & consumptionem corporis deducere  
 sicut ijs solet contingere, qui immoderate  
 coitu utuntur, quod tamen non videmus in  
 aliis contingere.

**Causa.**

Conuenit inter omnes legitimam & pro-  
 priam causam profluvij uterini non aliam  
 esse, quam nimiam copiam excremento-  
 rum. Sed ubi & quomodo huiusmodi excre-

**Locus affe-  
 ctus an ute-  
 rius.**

menta generentur, non conuenit inter omne-  
 Cause, inquit Trincauell. quæ corruptus  
 humorem assidue gignit, alias in principibus  
 partibus consistit. Sic Mercurialis & ceteri  
 ferè omnes hanc rem tractantes & consenti-  
 entes Trincauellio, causam profluvij mulie-

br



bris, vel in totum corpus, vel in partes principes, vel in vterū referūt. Vnus Alth. contēdit vterū nequaquā affectum esse, qui inquit, huiusmodi affectionem nullius determinatæ corporis partis statui posse: pro se asserens Galeni autoritatē. loc. ad finē. Quam quidem Althomari opinionem Mercur. inter ceteros conatur euertere, docens in profluvio muliebri interdum vniuersum corpus, interdum vterum laborare. Et quoniam vt dixi, hæc res est difficilis, sed maximè pertinet ad curationem, mihi liceat hanc difficultatem, in primis verò Galeni sententiam paulò altius examinare, cum vterque tam Mercurialis, quàm Althomarius profiteatur cum Galeni doctrina suam opinionē tueri. Itaq; Merc. dupliciter aduersus Althomarum agit: Primum quidem verba Galeni, quæ sonant, in profluvio muliebri vterum non laborare, ita interpretatur, quasi non aliud significaret, nisi quod sæpè vterus sit affectus, sed non semper. Deinde Mercur. hanc autoritate Auic. confirmat opinionem, qui scribit hoc malum



fieri non solum ob superfluitatem humorum  
 verum etiam propter imbecillitatem venarum  
 uteri menstrualium. Sed ad Galenum  
 accedamus, qui duobus potissimum locis de  
 hac re sermonem habet. Altero lib. 6. de I  
 Aff. ca. 5. Altero 3. de Sympt. causis c. 4  
 Priori igitur loco Galenus cum sermonem ha  
 buisset de symptomatis, quae retentas men  
 struas purgationes solent subsequi, deinde a  
 muliebri profluvium transit, de quo affectu  
 hac habet: Verum accidit interdum foeminae  
 utero nihil laborante muliebri vocatur  
 profluvium, cum uniuersum corpus pe  
 ipsum expurgatur, quae admodum interdum pe  
 renes quoque euacuatur. Contingit potissimum  
 ijs foeminis, quae tenuiori & pituitosiori ha  
 bitu praeditae sunt. Has utique intacte uterum  
 per remedia, quae toti corpori adhibentur  
 sanauimus. Hac verborum serie, ne eg  
 fallor, tantum abest, ut Galenus doceat  
 in profluvio muliebri saepe uterum laborare  
 quod contendit Mercur. ut ille quidem m  
 hi videatur plane contrarium docere, nem  
 in huiusmodi symptomate hanc partem m

nin



imè affectam esse. Nam præterquam  
quod illius verbis id significatur apertissi-  
mè, huius quoq; suæ sententiæ rationes  
adiungit. Primam, quod affectio sit uni-  
uersi corporis, quæ per vterum expurgatur,  
sicut illud per renes quoq; quandoq; solet eua-  
cuari. Secundam, Quod hoc genus mali  
mulieribus pituitosis laxa & tenera carne  
præditis, soleat in primis contingere. Ter-  
tiam, quæ fundata est magno Hipp. argu-  
mento: Ostendit autem sanatio, quod nimi-  
rum, ille intacto & neglecto vtero huius mo-  
di mulieres sanauerit per ea remedia, quæ  
toti corpori adhibentur. Quod si vterus quo-  
que laboret, ut hæ rationes sint nullius mo-  
menti, immò planè inutiles & falsæ, neces-  
sarium est:

Alter locus Galeni 3. de sympt. Caus.  
cap. 4. Cum Galenus tractasset de causis  
symptomatum, quæ ad omnes corporis va-  
cuationes generaliter pertinent: mox transit  
ad causas symptomatum, quæ ad mensium  
suppressionem, nec non ad deprauatam o-  
mnium quæ ex vtero manant, expulsionum  
I s attinent



attinent. Itaq; primum expositis causis  
suppressionis mensium, de quibus iam satis  
dictum, tandem, veniens ad deprauatas fluxiones  
per vterum haec habet: Ceterum deprauatae  
fluxiones per vterum fiunt, expurgato per hanc  
partem corpore vniuerso. Vocatur autem id  
symptoma fluxus muliebris. Est autem id  
quod vacuatur perpetuum, quale est id, quod  
in animante redundat. Ac postremo haec addit:  
Præterea haec deprauata ex vtero fit vacuatio,  
propter malum aliquod in ipso factum. Quae  
hoc loco scribuntur à Galeno planè mihi  
videntur ijs consentire, quae priore loco L. A.  
exposita sunt, nempe vterum in muliebri  
profluuiio nequaquam laborare. Cum enim  
ille doceat, deprauatam fluxionem, vteri,  
quae fluxus muliebris dicitur, fieri toto corpore  
per eam partem expurgato, ac simul  
singulorum excrementorum in corpore  
redundantium naturam & differentiam  
exponat, satis cuiq; potest constare, huiusmodi  
affectum minimè ad vterum, sed vniuersum  
corpus pertinere. Postrema autem verba  
mani-



manifestissimè mihi videntur istud confir-  
mare, quasi Galenus id velit, se hæcenus de  
deprauatis fluxionibus per vterum dixisse,  
in quibus vterus nihil laborat, sed præter  
huiusmodi symptomata nonnunquam de-  
prauatam ex vtero vacuationem fieri, in  
qua aliquod malum in ipso vtero excitatum  
est. Ac sanè si quis diligenter hunc locum  
consideret, & rationes à Galeno expositas  
expendat, is facillè, ut puto, fatebitur, de il-  
lius sententia in profluvio muliebri vterum  
nequaquam laborare. Itaque ego quidem cen-  
seo, Mercurialem hæc in parte Galeni men-  
tem non fuisse assecutum, ac temerè Altha-  
mari opinionem redarguisse.

Quantum pertinet ad Auic. locum, quem  
pro se affert Mercur. Etsi illius autoritas  
parùm, aut nihil memouet, ubicunq; ille vult  
discedere à Galeno: Veruntamen nec hic lo-  
cus Auic. fauet Mercur. Nam Auic. scri-  
bit mulierib. accidere fluxiones ex matrice  
& propter multitudinẽ superfluitatũ & pro-  
pter debilitatem digestionis in venis, non v-  
teri, ut refert Merc. sed in venis menstru-



rum. Quæ quidem verba, si quis velit interpretari de coctione, quæ fit in venis, & quibus deinde præparatur materia menstruum, fortè hæc sententia à Galeni mente non erit aliena. Sed ad causas redeamus. Cum statutum sit, in profluvio muliebri purgari varia excrementa, qualia redundant in corpore, nulli dubium esse debere quin omnia, quæcunq; huiusmodi excrementa possunt gignere, & in corpore coacervare, causæ huius symptomatis statuenda sint. Etsi verò tradendis proprijs causis huius symptomatis, pleriq; omnes admodum confuse agunt: tamen Galenus satis aperite & accurate mihi videtur illas explicare. Qui in lib. de diff. Sympt: cap. 5. scribit fluxum muliebrem fieri, vel propter imbecillitatem facultatis retentricis, vel quia facultas expultrix immoderate movetur vel propter vitium & læsionem utriusq; facultatis, vel demùm quia totus sanguis serosus ac tenuis redditus est. Ergo quotiescunq; in corpore gignuntur, & coacervantur excrementa, quod fieri potest, vel vi



io partium naturalium principalium, ac  
 proximè earum, quæ seruiunt coctioni. e.g.  
 ventriculi, jecoris, vel vitio vniuersi cor-  
 poris, quod improbè nutriatur, vel propter  
 externos errores in omnibus sex rebus non  
 naturalibus, ac potissimum ventriculi ratio-  
 ne, tunc si facultas retentrix fuerit imbecil-  
 la, vel expultrix immoderatè moueat,  
 vel vtraq; facultas laboret, vel totus eò  
 sanguis tenuior ac serosior reddatur, tunc  
 contingit fluxum muliebrem fieri. Et quo-  
 niam Galenus sæpè numero demonstraue-  
 rat, quando facultates lædantur, & in suis  
 operationibus deficient, hac parte præter-  
 missa de facultatibus, statim transit & de-  
 clarat, quomodo sanguis tenuis & serosus  
 reddatur, qui inquit, huius quoq; sympto-  
 matis multiformem esse generationem, &  
 generari propter multas causas.

Inter cæteras causas profluxuij mulie-  
 bris Galenus posuerat sanguinem tenuio-  
 rem & serosum, cuius quidem serosi sangui-  
 nis generatio apud eundem est multiplex.  
 Siquidem error contingit, vel in facultate  
 sangui-



sanguifica, quæ deficit à suo munere, quod  
hydropè apparet manifestè, vel error con-  
tingit in facultate separatrice, quæ id non  
potest separare, quod in sanguine tenue  
serosum est, vel in facultate expultrice, quæ  
partem sanguinis serosam non potest pu-  
gare, vel demum error contingit in facul-  
tate retentrice, quæ immoderate fungit  
suo munere, nec non cute densata & renib;  
constipatis. Ex quo summa cum ratione fit,  
ut sanguis tenuis & serosus propter vari-  
causas retentus videatur in corpore redu-  
cere. Hunc locum Galeni ego volui pau-  
longius tractare, quod nemo hactenus vide-  
tur illum intellexisse & explicare. Merca-  
nter cæteros, inquit, hunc locum valdè  
se difficilem, atq; in eo explicando multum  
laborat, sed mea sententia infelicitè, quæ  
minimè Galeni mentem affecutus, totam  
lius doctrinam ac totum eiusmodi locum  
peruertit. Cum enim Galenus perspicuè  
distinctè exponat, primum causas fluxus  
muliebris, deinde causas tenuitatis & sero-  
sitis sanguinis, sicuti iam satis explicat-

mi



Mercurialis utrasque causas confundit,  
 si omnes ad fluxum muliebre pertine-  
 ant, adeò, ut ille tandem quærat, quomodo  
 fieri possit, ut propter læsionem facultatis  
 retentricis, quæ magis retineat quàm con-  
 ueniat, quomodo, inquam, fluxus mulie-  
 ris fieri possit, cum sit magis consentaneum  
 retentioni, valida existente facultate retentri-  
 ce fluxionem magis cohiberi, quàm prouo-  
 cari, quod quidem problema nihil ad rem  
 pertinet. Siquidem Galenus non inquit, ro-  
 bur facultatis retentricis esse in causa, ut  
 fiat fluxus muliebris, quod ab omni ratione  
 & à se ipso & à natura esset alienum, qui in-  
 ter cæteras causas huius symptomatis po-  
 suerat primo loco imbecillitatem facultatis  
 retentricis, quippe robur & imbecillitas  
 contraria sunt, repugnant inter se, nec simul  
 possunt consistere: Sed Galenus docet pro-  
 pter errorem facultatis retentricis, quæ im-  
 moderatè fungitur suo munere, ac præter  
 modum retinet, quæ non sunt retinenda,  
 propter hanc causam sanguinem reddi te-  
 nuio-



nuiorem & serosiorē, quod quidem conuenit rationi, nec ullam in se continet difficultatem.

Signa pathognom.

Signa quæ fluxum muliebrem demonstrant, vel hoc vno argumento fuerunt euidentissima, quod loci muliebres perpetui sint humidiores & madidi, de quibus loquitur speciatim Hipp. 2. de morbis mulierum pag. 353. ad finem in Frobeniano. Sed præterea apud Auic. Paul. Aët. sunt alia signa animaduertenda, e. g. Fastidium ciborum, difficilis spiratio, improbus color vniuersi corporis, & alia id genus, quæ faciunt ad redundantiam excrementorum, ac ad malum corporis habitum possunt referri. Sed

Signa diff. cum varia omnia fluant excrementa rubra, pallida, alba, &c. quæ perpetuo apud Galenum talia sunt specie, quale id est quod in animali redūdat. Ante omnia oportet nos intelligere, qualia nam excrementa profluant & redundant in corpore, in qua cognitione & distinctione ferè tota summus huius erroris videtur consistere. Et si enim ex colore, habitu corporis, excrementis, e

præce



cedente victus ratione non est admo-  
 dum difficile de redundante excremento iu-  
 dicium facere, tamen huius adhuc quod-  
 dam signum ac facile experimentum tradi-  
 tur ab Hipp. 2. de morbis mulierum, quod  
 ne labore potest nos deducere in cognitio-  
 nem huiusmodi humorum. Illud verò est, ut  
 menter infecta arefacta, ex simplici aqua la-  
 ventur, & siccentur in umbra, & postea in-  
 spectantur diligenter, siquidem ea ratione  
 sicca & siccata manifestissimè colorem re-  
 undantis excrementi solent referre, quod  
 quotidiana experientia demonstrat esse ve-  
 rissimum. Verum hoc non est satis. Etenim  
 ubi certi fuerimus, hunc vel illum hu-  
 morem, hoc vel illud excrementum redun-  
 dare, id præterea necessario requirendum  
 est, quomodo huiusmodi humores in corpo-  
 re generentur, ut ne in eum errorem inci-  
 dat, in quem Galenus inquit, medicos  
 frequenter incurrere, & in quem quoque fa-  
 ctur se incidisse L. de præcognit. ad post-  
 umum 6. Dum medici euacuant id excre-  
 mentum quod redundat in corpore, ne autem

K

aliud



aliud simile illi generetur non prohibetur.  
Sed nec difficile est illud intelligere.  
enim humores fuerint biliosi & calidiores  
quales referunt colores flauis, pallidis, vitidis,  
des, liuidis, tunc maiori ex parte illi vitio  
coris generantur, quod membrum calida  
sicca intemperie laboret. Si fuerint humores  
res pituitosi, quales referunt colores albi  
cantes, tunc eorum generatio pendet, vel  
multis humoribus ac deprauata victus  
tione, vel ex ventriculo, qui aliqua inte  
perie ac potissimum frigida & humida  
boret. Si fuerint humores serosi, hoc vix  
jecoris vitio possit fieri, quod aliquo modo  
refrigeratum, adeo ut probum sanguinem  
nequeat generare. Hoc idem de cæteris  
crementis, si quæ sunt, statuendum est.  
Postremo autem ea restant signa, quæ  
xionem muliebrem à Gonorrhœa & fluxu  
seminis possunt distinguere, quæ quidem  
signa potius quibusdam signis coniecturalibus  
quàm certis signis haberi possunt. Nam  
semen profluens quoquo modo crassius est  
profluit minore quantitate, & minus fa  
dium ferè semper coloris albicantis. Coni

ven



erò cætera excrementa sunt tenuiora, co-  
 siora, fœtidiora, neq; eundem semper refe-  
 unt colorem. Sic mulieres longè magis in-  
 monorrhæa, quàm fluxu muliebri tabescunt,  
 consumuntur, ex coitu meli⁹ se habet. Quib⁹  
 orrò licet addere præcedentem, victus ra-  
 tionem pleniorē, deliciariorē, ac maxi-  
 mē alimentorum, quæ possunt semen gig-  
 nere & augere, abstinentia veneris, & alia  
 d genus. Sed iam aggrediamur curatio-  
 nem. Hic dua præcipuè se offerunt nobis  
 indicationes. Prima est, quæ pertinet ad  
 purgationem vniuersi corporis. Secunda,  
 quæ pertinet ad tollendos morbos earum  
 partium, propter quos morbos varia illa  
 excrementa generantur. Vtrum autem li-  
 ceat satisfacere ijs indicationibus, sciendum  
 est, generaliter huiusmodi symptoma,  
 qualecunq; illud fuerit, & à qualicunq; cau-  
 sa proueniat, ad medicandum periculo-  
 sum & perniciosum esse, nec nisi difficile  
 curari, ac mulieres sæpè numero ad malum  
 habitum, ad hydropem, ad tabem, & alia  
 gravissima mala deducere. Sed inter cæ-  
 tera mulieres muliebri fluxu laborantes ste-

Indicatio-  
 nes curati-  
 uæ

Prognosis

K 2

rili-



Curatio-  
nis præsi-  
dia.

ritate tanquam proprio & inseparabili  
symptomate solent laborare. Verum non  
dubium esse debet, quin pro varia causa  
pro profluente varia materia, pro varia  
temperie, ætate, & alijs differentijs, nonnullæ  
mulieres facilius, nonnullæ difficilior  
aliæ nulla ratione possint sanari. Sed sup-  
ponamus esse spem aliquam curationis  
illam aggrediamur, & incipiamus à pu-  
gatione redundantis humoris. Et quoniam  
huiusmodi humores redundantes, sicut d-  
etum, possunt esse multiplices, ad vestram  
utilitatem singulos brevissimè perpendamus.  
incipientes à bilioso humore. Hoc autem  
loco antequam curationem incipio, id cupio  
vos memoriâ tenere: Nullum fortè sym-  
ptoma, nullum fortè morbum deterius  
perniciosius curari, quàm fluxum mulierum  
brem, siquidem nemo ferè est, non solùm  
ex mulieribus & vulgo, sed etiam ex  
garibus medicis, qui non principio & omni  
tempore utatur suis medicamentis astringen-  
tibus rosis, ossibus messilorum in pu-  
vere, corallijs, mastiche, Acacia, hypocistia



tude & similibus, quæ quidem temerè ad-  
 ministrata & ante communem corporis pur-  
 gationem, impedita excrementorum fluxio-  
 possunt esse in causa, vt talia excremen-  
 alias præstantiores partes petant, & gra-  
 ssima pericula secum afferant. Quod inter  
 teros præclare notat Aëtius L. 16. c. 66.  
 uare vos perpetuò discatis ab eiusmodi  
 pernicioso errore cauere. Pro purgatione  
 biliosi humoris cum morbus det inducias  
 primo leuiori aliquo medicamento licet al-  
 ium lenire, & inter cætera omnia, cassia in  
 hoc casu videtur propriè locum obtinere.  
 tsi non ignoro, plurimos medicos ab usu  
 cassiæ in mulieribus abstinere. Lenita  
 uo communiter practiçantes propè omnes  
 nihil cogitant de secunda vena, à quo re-  
 medio redundantibus biliosis humoribus do-  
 cent perpetuo abstinendum esse, de qua re  
 lias. Vos contra, si præsentis scopi conueni-  
 nt, nullo modo hoc remedium prætermitta-  
 is, secando venam dextri cubiti. Ex quo  
 præsidio duas maxime utilitates licet vobis  
 consequi. Altera reuulsionem à partibus  
 K. 3 sub-



subiectis & laborantibus ad partes superi-  
res. Altera refrigerationem ipsius iecoris  
quod membrum, ut diximus, & paulo post  
repetemus, ferè semper laborat. Secta  
na praeparatur materia cum ijs, quae moder-  
ratè refrigerant, & moderatè absterguunt  
qualia sunt syr. ros. recens, de cichorea sin-  
plex, de endiu. de soncho. Decocta item si-  
cichorei, sonchi, plantaginis & similium.  
Deinde accedatis ad purgationem cum ta-  
marindis, myrobal. citrinis, cum Rhaba-  
baro, quod est præstantissimum. (Tama-  
rindi hoc loco conueniunt, quia parùm con-  
stringunt, in initio verò non admittantur.)  
Illud postremò memoria tenendum est,  
caueamus à valentioribus & scammonia-  
tis medicamentis. Demum verò facta seme-  
aut si opus sit, repetita purgatione  
partem præcipuè laborantem, tanqua-  
ad causam & fontem, unde eiusmodi hu-  
mor originem habet, deueniendum est.  
Hæc autem pars non alia quàm jecur sta-  
tui potest aut debet. Itaq; hoc tempore  
et uti ijs medicamentis, quæ calidam jec-



is intemperie possunt auferre. Intra sucha-  
 ros. violaceo, ex floribus cichorei, confect.  
 diarrhod. trionfaudal. sero lactis, aquis  
 hermalibus frigidioribus: extra inunctio-  
 nibus, epithematibus, balneo aquæ dulcis, &  
 æteris id genus præsidij, de quibus in  
 publicis lectionibus satis diximus.

Diximus de purgandis humoribus bilio-  
 sis. Si redundant humores pituitosi, lenien-  
 da est aluus cum melle ros. sol. vel hie-  
 ra simpl. vel hiera simul cum cassia, præpa-  
 retur materia cum syrup. de betonica, de  
 hyssopo, cum melle rosa, cum betonica, Me-  
 lissa hyssopo & similiū. Postremò ad pur-  
 gationem accedendum est, cum agarico  
 turbich, Myrobal. cheb. hiera pachij, dia-  
 athol. & diaphan. Quod si pituita fuerit  
 asalsa, tunc confectio Hamech vel pillule co-  
 chie forent præstantissimæ. Hic pariter o-  
 mnes præmittunt sectionem venæ, pro-  
 pter copiam humoris crudioris & frigidio-  
 ris. At verò nisi maxima urgeat crudi-  
 tas. adeò ut vel in præsentia, vel in poste-  
 rum aliquod periculum viribus videatur

K 4

immine-



imminere, nec mea sententia huiusmodi  
praesidium esset praetermittendum. Et quo-  
niam ubique ledunt pituitosi humores in  
corpore, ventriculus semper ferè laborat &  
quidem maiori ex parte intemperie frigi-  
da & humida: Idcirco post purgationem  
ille calefaciendus, siccandus, roborandus  
est: Extra cum ol. nardino, de absynthio  
cum fomentis ex decoct. menthae calamethae  
similibusq. Intra, cum Aromat. rosato  
diacymino, diacalamenthio, cum magna  
antidotis Theriaca & Mithridat. Verum  
sciat aquas thermarum calidiores inter  
omnia praesidia principem locum obtinere.  
Ac sanè id ego vobis verè possum testari  
me plurimas mulieres vidisse hac differen-  
tia fluxus muliebris laborantes, quae po-  
tione potissimum aquarum Aponensium  
prorsus sunt liberatae. Si totum corpus  
seateat humoribus melancholicis, qui sunt  
exusti & acriores, quod potissimum vitio  
coris solet contingere, eadem ferè instituenda  
est curatio, quae de redundantia bilio-  
humoris tradita est. Leniatur Aluus cu-

cass



*assia, cum elect. lenit. & modica portiun-*  
*cula hieræ simpl. incidatur vena dextræ cu-*  
*biti aut sinistri si lien malè fuerit affectus,*  
*præparetur materia cum Syrup. de fumo*  
*terre, simpl. de borrag. cum decoct. cichorei,*  
*borag. buglos. ac demum purgetur cum myro-*  
*bal. nigris, sena, epithymo, sed præ cæte-*  
*ris omnibus cum cort. hellebori nigri, aut*  
*cum medicamentis compositis El. diacath.*  
*conf. hamech, &c: Demum verò si in fluxu*  
*muliebri prodeant excrementa aquea & se-*  
*rosa, habetis curationem traditam à Gale-*  
*no in muliere nobilissima Romana in L. de*  
*præcognit. Et quoniam huiusmodi historia*  
*& sanatio continet nonnullas arduas diffi-*  
*cultates, & digna est maxima notatione:*  
*mihilibet paulò accuratius eam perpende-*  
*re & examinare. Consulto prætereo totam*  
*narrationem historię: etsi illa est pulcherr:*  
*& unctione dignissima, cum ea facile possit*  
*legi ab unoquoque apud Galenum. Sed sta-*  
*tim venio ad partem quæ curationem spe-*  
*ctat. Laborante ergò uxore Boethi muliebri*  
*profluvio, illius vir præcipuos quosque Roma-*

K 5

nos



nos medicos, atq; inter ceteros Galenum pro illius consultatione & curatione conuocauit. Inter quos conuenit ea remedia fore administranda, quæ ab Hipp. & alijs post Hipp. optimis quibusq; medicis tradita fuissent, quæ in summa eò tendebant, ut non solum uterus, sed etiam vniuersum corpus exsiccaretur. At verò cum hac instituta ratione curandi, morbus deterior indies videretur reddi, iure medici hæsitabant & maximè cupiebant ad alium curandi modum transire, sed tamen nihil melius, vel ratione, vel experientia inuentum illis occurrebat, quàm id, in quo optimi quiq; medici paulò ante consenserant: qui fortè memoria tenebant oraculum Hipp. 2. Aph. 52. Interea huic matronæ tumor in utero factus est, qualis utero gerentibus solet apparere, adeò, ut nonnullæ mulierculæ existimauerint eam prægnantem esse. Sed improuisum quoddam accidens huiusmodi suspicionem planè deleuit. Cum enim mulier aliquando lauaretur, id contingit ut in primo balnearum cubiculo vehementissimis dolori-



doloribus correpta, quales parientibus solent aduenire, aqueum humorem adeò copiosum excreuerit, ut animo deficeret. Ex quo protinus venter detumuit. Itaq; singulis medicis hæsitantibus, & dubijs quid factum opus foret, qui nec sperabant priore instituta curatione mulierem posse sanari, nec ad aliud curationis genus audebant transire, factum est, ut Galenus noctu de hac re cogitans, illi in mentem venit, se in hac muliere insignem circa hypochondria mollitiem deprehendisse, adeò ut illius carnes lacti, quod coagulatur, nondum tamen in caseum obduruit, similis fuit. Ex quo in eam sententiam venit, quod mulier frigida insigniter & humida esset temperatura, non solum siccanda nimie humiditati, sed etiam calefacienda nimie frigiditati insistendum esse. Itaq; ad particulares deueniens indicationes, ita secum ipse statuit: Primum in victus ratione potum admodum paucum & restrictum conuenire: Deinde redundantem humorem noxium purgandum esse per cutem, adhibita frictione totius corporis.



poris, ex melle multū quidē concocto, tamen  
tantum refrigerato, ut aquæ fontanæ aesti-  
uo tempore foret simile, nec non per urinam  
& aluum, cum ijs medicamentis, quæ pos-  
sint & lotium prouocare, & per aluum at-  
trahere. Cum verò Galenus ita secum sta-  
tuisset, quod fortè illi cum cæteris medicis  
non omni ex parte conueniret, id facile à  
Boëtho impetrauit, ut solus decem dies vxor-  
is curam susciperet, qui primū medica-  
mento aqueum humorem per aluum pur-  
gante vsus est. Deinde aquam in qua asa-  
rum & apium ferbuerat, illi bibendam ex-  
hibuit. Et cum (duobus primis diebus hæc  
remedia fuerunt administrata) vterus mi-  
nus cepisset fluere: Rursum tertio die me-  
dicamento per aluum purgante vsus est,  
quod illi propositum fuisset, ea, quæ per ute-  
rum fluebant, non solum per urinam, sed  
etiam per aluum deriuare. Post hæc Gale-  
nus mulierem quotidie melle unxit, &  
corpus fricauit linteo primum mollissimo,  
deinde asperrimo, & accommodatam victus  
rationem instituit. Quæ quidem simplici &

com-



compendiaria curatione factum est, ut spacio 15. dierum nullum prorsus morbi vestigium apparuerit, ac mulier transactio-  
 ne benè colorata reddita fuerit, & pri-  
 mum naturalem habitum recuperauerit.

Ex huiusmodi curandiratione à Gale-  
 no licet multa colligere, quæ sunt maxime  
 notatione digna. Sed nos paucis contenti  
 rimus. Primum notandum est, multos  
 medicos hallucinari, qui sunt in ea opinione,  
 profluvium muliebrem generaliter esse mor-  
 bum frigidum, & ab humoribus frigidis  
 ortum habere. Etenim etsi Galenus asse-  
 rit in hac muliere morbum frigidum fuisse,  
 amen non id de omni profluvio statuendum  
 est. ut docet Althomarus, & alij quàm  
 plurimi, cum in Galeni doctrina certum sit  
 non solum humores frigidos, sed etiam cali-  
 dos posse in corpore redundare & profluvium  
 muliebrem efficere. Deinde notandus est  
 error Trincavel. Iacchini, Mercur. & alio-  
 rum quicunque oscitanter Galenum legunt.  
 Etenim omnes inquit, Galenum iussisse,  
 ut mulier in calida maris arena decumbe-  
 ret:



ret: cum tamen Galenus fateatur apertè  
& ceteros omnes medicos, & se ipsum non  
sine errore hoc remedio usos fuisse. De  
mum notandus est error omnibus commu-  
nis vno excepto Althomaro, qui de vter-  
sunt admodum solliciti, ac plurima affe-  
runt remedia ad illum pertinentia, qua  
uterus quoq; laboret, & remediorum indi-  
geret: Cum tamen Galenus apertè doceat  
in profluio muliebri vterum nihil labora-  
re, & omnes mulieres intacto vtero ab illi  
sanatas esse, ut supra dictum, ac certissi-  
mum sit in hac ipsa matrona vteri proflu-  
vio laborante, Galenum nihil de vtero cogi-  
tasse ac nullius vterini praesidij mentionem  
fecisse. Sed ad curationem Galeni reuertamur,  
in qua id potissimum reuocatur in du-  
bium, quomodo ille in profluio muliebri a-  
deriuandam materiam ex vtero usus fue-  
rit medicamentis, quae prouocandi lotij vi-  
habent, cum haec eadem medicamentis  
videantur, non minus lotium, quàm ipse  
menses prouocare, quod à bona methodo me-  
dendi alienum esse videtur. Qua enim ratio



licet simul excrementa ab utero deriu-  
 antur, & ad uterum deducere? Vnde Aëtius  
 inter ceteros L. 16. c. 68. nullo modo pro-  
 hibet medicamenta prouocantia lotium  
 in amobrem Auerr. 7. colliget c. 4. ita in-  
 quit: Medicinae purgantes sunt medicinae  
 prouocantes urinam, & quod prouocat uri-  
 nam est de genere prouocantium menstrua,  
 cuius sententiam probat Franciscus Valesius  
 V. Epidem. commento 17. in Larissa,  
 alij quàm plurimi. De hac ardua diffi-  
 cultate multi multa loquuntur. Sed prae-  
 termiſſis aliorum responsionibus, ego meam  
 sententiam breuiter proferam. Ac pri-  
 mum nulli dubium esse debet, quin hac de-  
 riuatio ad aluum & vesicam ab utero ra-  
 tioni & doctrinae Galeni consentiat, qui  
 tribit 5. Meth. 3. quæ per aluum fluunt,  
 vel per sedem pariter, quæ per uterum e-  
 umpunt, ea per urinas vel per aluum  
 transferenda esse & deriuanda. Ad pro-  
 positam difficultatem quomodo medica-  
 menta prouocantia lotium in profluvio mu-  
 liebri possint conuenire, cum eadem valeant  
 men-



menstrua prouocare? Respondet Galenus  
quædam reperiri medicamenta, quæ  
prouocant lotium, vt nullo modo possunt  
menstrua prouocare. Quo loco sciendum  
ex Galeno de S. medicamentis c. 22. esse  
tria genera medicamentorum: ad prouocandum  
lac, ad prouocandum menses, ad prouocandum  
lotium accommodata, quæ  
omnia in eo conueniunt, vt sint calida, diffusiua  
runt autem partim caloris mensura, partim  
quod quædam desiccant, quædam non.  
Nam medicamenta quæ non desiccant  
moderatè calorem faciunt, lacti generando  
tilia sunt. Quæ verò plus calefaciunt non  
mè valenter desiccant, mensuris prouocandis  
conueniunt: Quæ autem simul calefaciunt  
valenter & desiccant, vrinas prouocant,  
quæ quidem propterea peculiaritè  
diuretica, id est, vrinam mouentia dicuntur.  
De quibus medicamentorum generibus  
ita habendum est. Duo priora lac  
mirum gignentia & menses prouocantia  
lotium quoque prouocare, Tertium verò  
genus altera ex parte solas vrinas mouere.

abs.



hq; eo, vt possint vel lac gignere, vel men-  
 ses prouocare. Quamobrem cum Galeni  
 doctrina facile est respondere: In fluxu  
 muliebri ea conuenire medicamenta, quæ  
 propriè diurètica dicuntur, & ita mouent  
 uterum, vt menses nequaquam possint mo-  
 ueri. Verum huiusmodi responsio nulla  
 est, propterea, quia Galenus in curanda  
 chore Boethi fatetur, se, vsum fuisse potionem  
 qua asarum & apium incocta fuerant.  
 Quæ ambo medicamenta ab eodem Galeno  
 8. simpl. necnon 8. simpl. c. de Asaro inter  
 diuretica medicamenta, quæ non solum lotium, sed  
 etiam menses possunt prouocare. Plæ-  
 que omnes respondent, medicamenta prouo-  
 cantia menses id facere dupliciter, Vno  
 modo primum & per se, Altero modo secun-  
 dario & per accidens. Ex quo colligunt  
 diuretica medicamenta, qualia sunt asa-  
 rum & apium secundario & per accidens  
 menses prouocare. Sed mea sententia ne-  
 quiusmodi responsio tollit difficultatem.  
 Jam primò Galenus l. V. simpl. nume-  
 rat asarum cum sabina, calamentho, pule-  
 L                      gio;



gio, dictamno, cinamomo, aristol. & ali  
id genus medicamentis, quæ omnia, inqu  
ille, absolutas retentiones purgationum  
teri sanare: Quæ quidem medicamen  
puto neminem dicturum esse per acciden  
menstrua prouocare. Deinde utcun  
concedamus asarum & apium non primū  
& perse, sed secundo & per accidens men  
strua prouocare, id nihil est, quoniam si  
vno modo, siue altero id fiat, iam materia  
ad uterum deducitur, quod deriuationi re  
pugnat, atq; ex communi methodo null  
modo videtur conuenire. Quid igitur di  
cendum est? Ego quidem id primū fa  
teor, quod putō à nemine posse negari de sen  
tentia Galeni nonnulla esse medicamenta  
quæ propriè diuretica videntur, tali nimi  
rum & tanta caliditate & siccitate prædi  
ta, ut solum vrinas, nequaquam menstrua  
possint prouocare. Deinde verò & illa  
addo nonnulla quoq; esse medicamenta, quæ  
possint utrumq; & vrinas mouere & men  
strua prouocare. Ac primò id confirmo  
asarum & apium inter hæc medicamenta  
repo



monenda esse, qua vtramq; purgationem  
 per vrinas & per menses possunt iuuare,  
 & pariter duæ conditiones in doctrina Ga-  
 leni nullam mihi videtur continere diffi-  
 cultatem. Sed quomodo in fluxu muliebri  
 dicamenta prouocantia menses conue-  
 niunt? Ego dicam liberè quod sentio,  
 si id videatur alicui paradoxon, & à Ga-  
 leni doctrina alienum: Dico igitur in fluxu  
 muliebri medicamenta quædam diuretica  
 conuenire, quod ea per lotium sicut  
 purgantia per aluum possint ab vtero  
 crassa & aquosa excrementa deriuare.  
 Quod si hæc eadem medicamenta possint  
 menstrua quoq; prouocare, eiusmodi incom-  
 modum leuissimum ac ferè nullius momen-  
 ti censendum esse, ac potissimum, si illud  
 comparetur maximè vtilitati quam ægri  
 & agra ex prouocatione lotij percipiunt.  
 Num enim corpus scateat excrementis fri-  
 gidis & serosis, si illa medicamentis calidis  
 siccis corrigantur, & quasi sanguinis for-  
 mam recipiant, ex quo deinceps materia  
 mensibus subiiciatur, id mihi videtur aut

L. 2

sine



sine aliquo periculo, aut fortè etiam non  
 ne utilitate fieri posse. Nam quatenus  
 vterum pertinet, propter quam potissimu  
 causam prouocatio mensium suscepta vid  
 tur, si memoria repetamus, quæ supra d  
 ximus cum Galeno, in fluxu muliebri vt  
 rum nequaquam laborare, utiq; huiusmo  
 dicamenta prouocantia menses, mul  
 minus videri possunt noxia, periculosa,  
 à proba medendi methodo abhorrere,  
 quidè Galenus 3. M. c. 6. vbi cunq; de hu  
 usmodi reuulsione & deriuatione sermone  
 habet, docet à renibus, vesica, vtero, & al  
 is partibus reuellendum aut deriuandu  
 esse, si illa inflammatione aut aliter la  
 borent.

Quod quidem maxime conuenit ratio  
 ni, ut ne maior copia excrementorum a  
 locum laborantem trahatur. Quamobrem  
 vtero neq; inflammatione, neq; vllò mo  
 laborante, iure licuit Galeno, & nobis li  
 cebit ijs vti medicamentis, qualia sunt asa  
 rum & apium, quæ valent non solum v  
 nas mouere, sed etiam menstrua prouocare

Con



concludendo igitur in fluxu muliebri redun-  
 dentibus humoribus frigidis & aquosis ex  
 Galeni doctrina, atq; ex loco summæ ratio-  
 nis est, vt huiusmodi humores deriuentur  
 rimò per aluum, per accommodata pur-  
 gantia medicamenta, Deinde ad vesicā, per  
 medicamēta diuretica, Ac postremò ad cu-  
 rā per fricationes, linimenta, & similia. Et  
 quis junior id quoq; cupit intelligere, qua-  
 nam singula hæc medicamenta esse de-  
 beant: Galenus nullius purgantis mentio-  
 nem facit, sed ea sunt multiplicia, de qui-  
 bus in tractatione de hydropse diximus dif-  
 fuse. Inter cætera autem vel elaterium, vel  
 succus radicis iridis mihi maxime proban-  
 tur. Exemp. grat.

Re. Spec. pill. alocephang. ℥s  
 Elaterij gr iij. Mis. fiat pillulæ.  
 Vel:

Re. Succii reos recenter extract. ℥ij  
 Mannæ Calabrensis electæ ℥j  
 Misce.

Quatenus autem pertinet ad medicamenta  
 diuretica, iam auditis Galenum vsum fuisse

L 3 asaro



asarum & apio decoctis ex aqua, quae mihi  
modo mihi videntur praetermittenda, &  
permutanda. Si quis autem velit &  
experiri, Praeterea sunt semina anisorum  
faeniculi, dauci, & alia quam plurima,  
quibus Galenus loquitur cum alijs locis  
maximè de S. med. c. 13. demum  
praesidia quae per cutem redundantem  
morem possunt euacuare, apud Galenum  
fuerant frictio totius corporis cum lini  
primum molliore, deinde asperiore, nec  
inunctio ex solo melle multum quidem  
esto, sed instar aestivae aquae fontanae refri-  
geratae. Quae item praesidia facilia & opor-  
tuna sunt, si quis melli velit addere ol. ch-  
momel. amygd. amar. vel quid simile, a-  
praetermisso melle solis oleis uti neq. ista  
mea sententia foret inutile. Ceterum  
quidem non puto Galenum in vxore Boetii  
curanda ijs propositis remedijs contentum  
esse, sed alijs quoq. praeterea usum fuisse  
atq. ijs praecipue, quae generationis serosi e-  
crementi rationem haberent, alioquin ille  
in eo errore perseverasset, in quem fatetur



Vnà cum alijs medicis incidisse, dum illi  
 quidem quod abundat euacuant: vt autem  
 nihil amplius generetur, non impediunt. Et  
 quoniam nulli dubium esse debet, vbiq;  
 humores serosi, aquosi, frigidi generantur,  
 quin iecur principaliter, quod est instrumen-  
 tum generandi sanguinis ledatur, & quidē  
 intemperie frigida & humida, rationi con-  
 sentaneum est Galenum post purgatio-  
 nem & deriuationem ab vtero huius præci-  
 pue membri sollicitum fuisse, atq; illa præsi-  
 dia administrasse, partim interna, partim  
 externa, quæcunq; ad tollendam huiusmo-  
 di iecoris intemperiem sunt accommoda-  
 ta, de quibus quidem præsidij, cum nos  
 diffusè tractauerimus in publicis lectionibus  
 priuatis & proprijs locis, non est vt hoc lo-  
 co iterum inutiliter tractemus, siquidem il-  
 la omnia ad hunc locum debent trans-  
 ferri.



DE CONCEPTU  
SECUNDVM NATV-

RAM.

Ratio or-  
dinis.Quomodo  
fiat con-  
ceptio.

POST tractationem de menstribus absolutam, sequitur tractatio de iis, quæ pertinent ad conceptum & partum hominis, in qua re conservatio totius humani generis consistit. Iam diximus ad generationem hominis distinctionem utriusque sexus maris & feminae, nec non coniunctionem utriusque necessariam rem fuisse. Quomodo autem hæc admirabilis naturæ operatio fiat declaratur à Galeno l. sem. 4. qui inquit simul coeuntibus mare & femina semen viri ab utero mulieris atque omnibus illius partibus expeti, attrahi, extendi & dilatari, atque ex eo propter illius continuitatem, lentorem & crassitiem accedente calidorum corporum accessione ante omnia membranam fieri, sicuti illis tenuibus placentulis vel acetabulis contingit, quæ à dulcioribus pistoribus



distoribus conficiuntur. Etenim sicuti pisto-  
 res liquidam aliquantulum pultem ex fa-  
 rina & aqua factam supra ferreum quod-  
 dam instrumentum latum & calidum in-  
 ducunt & illo compresso statim nebulam  
 conficiunt, ita natura ex semine quasi qua-  
 dam pulve in utero, quasi instrumento pi-  
 storio se comprimente ac semen dilatante  
 didicit membranam fabricare, quæ tamen  
 ab ipso utero sicuti nebula à ferreo instru-  
 mento separata est, in qua deinceps  
 membrana Græci *χωγίον* vocant, mul-  
 tæ venæ & arteriæ generantur, quæ variè  
 admodum implicite tandem inuicem col-  
 liguntur, aliquæ in maiores quosdam cau-  
 dices & ramos simul coeunt, ex quibus po-  
 stea & aliæ duæ tunicæ & totus foetus planè  
 admirabili ratione conficiuntur sicuti ele-  
 ganter & diffusè explicatur à Gal. lib. de  
 for. foetus. de sem. 15. de usu part.

Quoniam verò sicuti ex vna parte satis  
 cuiq; potest constare, ad humani corporis fa-  
 bricam utrumq; & marem & feminam  
 concurrere, ita ex altera non satis constat

Causæ

L s

quo



quo nam modo vterq; concurrat, & quidn. vterq; praestet, quod alias sum vobis pollicitus mihi libet hanc rem accuratè, sed v. quàm breuissimè potero, examinare cun. disputatio sit cognitione dignissima, & au. nostrum institutum de conceptu homini. maximè pertineat. Itaq; est celebris & di. agitata controuersia inter Aristotelem & Galenum, in qua disputatione, vt perspi. cuè & ordinatè agamus, omnium primum sententia veriusq; partis quibus vtraq; ve. conueniat vel dissentiat explicabimus. De. inde argumenta & rationes tam pro Ari. stotele quàm pro Galeno, non quidem omnes sed solidiores & efficaciores proferemus. Postremò pro Galeno cuius opinionem tan. quam veriore[m] cogimur amplecti & tueri aduersarias rationes & Aristotelis & suo. rum sequacium pro viribus conabimur confutare.

Sentētia A.  
ristotelis.

Qualis fuerit sententia Aristotelis de causis effectricib<sup>9</sup> & materia humani fetus non satis constat, neq; illius interpp. & se. ctatores hac in re omni ex parte conueniunt.

Nonnulli



Nonnulli docent Aristotelem ita sentire :  
 Semen viri sanguini menstruo nudam fa-  
 cultatem & vim efficientem impertiri, ac  
 deinde illud vel extra vterum effluere, vel  
 in spiritum aut flatum dissolui. Alij viros  
 non solum vim efficientem, sed etiam mate-  
 riam, fœminas solam materiam prestare,  
 Alij mulieres præter menstrua, neq; semi-  
 ne priuari, sed illud esse frigidius, tenuius  
 & ineptum ad generationem. Ac fortè ali-  
 j aliter sentiunt. Quæ quidem opinionum  
 varietas inde videtur originem habuisse,  
 quod Aristoteles varijs locis de hac re tra-  
 ctans admodum perplexè loquatur, nec sa-  
 tis videatur suam sententiam explicare, id  
 quod facile vnus quisq; intelliget & fate-  
 bitur, qui locos præcipuos voluerit euoluere,  
 in quibus de hac re agitur. Sunt autem  
 1. de gen. animal. 2. 17. 18. 19. & 20.  
 nec non 2. gen. animal. 3. Cæterum ve-  
 cunq; censuerit Aristoteles, de qua re mihi  
 longius laborandum aut agendum non est,  
 Illud nostro instituto in præsentia satis fue-  
 rit, quod ferè conuenit inter omnes Aristo-  
 telem



telem in ea sententia fuisse, semē viri in generatione foetus solum efficiendi vim, nullam materiam præstare: feminas sola menstrua tanquam materiā, minimè efficiendi vim conferre. De sententia Galeni non est, ut multum laboremus, qui illam explicat apertissimè, ac pro illa aduersus Aristotelem disputat diffusè cū alijs locis, tum maxime in lib: de semine. Itaq; Galenus sentit ad generationem foetus utrunq; & virum & mulierem duplici ratione concurrere. Virum quidem semen tanquam efficiens & materiam conferre. Mulierem & menstrua, & semē non solum pro materia, sed etiam pro efficiente exhibere, adeo ut uterq; in eo conueniat: Semen viri efficientis causæ, menstrua mulieris materialis causæ locum tenere: In eo verò dissentiat, Semen viri materiam præstare, menstrua & semen mulieris efficiendi vim conferre. Quod utrunq; Aristoteles negat, Galenus fatetur. Quoniam verò Aristotelis opinio duo continet capita. Alterum quod semen viri duntaxat qualitatem & vim efficien-



ficientem minimè quantitatem & materi-  
am conferat. Alterum quod mulieres solam  
materiam minimè efficiendi facultatem  
præstent: Clarioris doctrinæ causa mihi li-  
ceat de vtroq; separatim illius proprias ra-  
tiones afferre, quæ potiss: colligi possunt ex  
locis propositis de gen. animal. nec non ex  
Auer. 7. colliget c. 10. Et quatenus ad  
primum caput pertinet, semē viri nullam  
in generatione fœtus materiæ rationem ha-  
bere, sic primum cum Aristotele potest  
probari.

An semen  
viri mate-  
riæ rationē  
præbeat in  
generatio-  
ne.

Nullum agens respectu eius in quod agit  
rationem pati potest habere,

Sed semē viri omnium & Galeni quoq;  
consensu agentis formam retinet,

Ergo semē viri nullo modo potest fieri  
passivum & in se ipsum agere.

Ergo semen virile nullatenus materia  
fœtus esse potest.

Ergo sicut nemo dixerit artificem rei  
quàm efficit, partem & materiam esse: Ita  
neq; dicendum est, semē virile artifex gene-  
rationis fœtus illius partem & materiam  
fieri



feri posse. Secundò, inquit Aristoteles, facta etiam rationi consentiunt, siquidem reperiuntur nonnulli mares qui cœuantes nullum in fœminas membrum inferunt, sed contra potius fœminæ in mares. Ex quo necessario colligendum esse non materiam seminis, sed illius tamen vim & potentiam & facultatem illis communicari. Quod si absque materia seminis masculini, sed sola illius virtute nonnulla animalia fieri possunt, rationi consentaneum naturam, quæ nunquam pluribus agit, quod paucioribus agere potest, in quo libet fœtu sola masculini seminis efficacia, minimè materiæ ad conceptionem verti. Hoc ipsum confirmare possunt animalia fœminæ. exemp. grat. Aues quæ oua generant, quæ quidem tam diu infœcunda permanent, quàm diu mares illis superuenientes, non quidem materiam seminis immittunt, sed vitæ & fœcunditatis vim infundunt. Postremò hac sententia confirmatur ex natura seminis. Etenim si ex eo tanquam materia constituerentur aliqua corporis partes, Exemp. grat. Os nervus,



uus, cartilago, tunc semen coagulari foret  
 neceſſe: ſiquidem ſine coagulatione huius-  
 modi partes ſimilares nequeunt oriri. At  
 verò natura ſeminis neq; à calido, neq; à fri-  
 gido coagulatur: cum illud à frigido hu-  
 midum fiat, & aqueum à calido longè mi-  
 nus poſſit coagulari. Itaq; ijs reſponſionibus  
 concludunt pro Ariſtotele, ſemen viri nullo  
 modo materiam, ſed tantum efficiendi vim  
 præſtare foetui. In propoſita difficultate  
 in tequam ad alia progrediamur, mihi licet  
 aduerſariam Galeni ſententiam afferre, ut  
 rationes & Ariſtotelis & Galeni intelligan-  
 tur. Itaq; Galenus tanquam fundamen-  
 tum ſuæ diſputationis accepit: Semen viri  
 n vterum coniectum in eo retineri ac niſi re-  
 tineatur nullo modo conceptum fieri poſſe.  
 Hoc autem verum eſſe Galenus dupliciter  
 e comperiſſe ait 1. de ſemine 2. primum in  
 rutis in quibus partim aliorum ſibi inui-  
 em conſentientium confirmatione, partim  
 propria ac multiplici experientia depræ-  
 endit omnia bruta, quæcunq; poſſe coitum  
 mē excernunt, nunquam etiam conci-  
 pere.



pere. Contra verò quaecunq; semen conceperint, quandam motionem in vtero sentire, conuulsioni similem ferè, qua vterus se ipsum contrahere videtur. Ex quo Galenus inquit, verisimile hoc nomen conceptus à concipiendo foeminis impositum esse. Sic Hipp, lib. de genitura inquit: si foemina partus perita sit & cognouerit, quando genitura non excidit, tunc illa sciet, qua die intra se ipsam concepit. Tertiò Galenus inquit se istud comperisse ex lectione omnium librorum medicorum, quicunq; de hoc argumento tractant, quos omnes inuenit idem hoc affirmare, quorum nonnulli etiam diligentiores quoq; vteri motum meminerunt quo ille ad semen contraheretur, ipsumq; undiquaq; comprehendit.

Sed Galenus etiam præter huiusmodi rationes aliter id conatur confirmare. Ad primum testimonio & autoritate Platonis, qui vterum velut quoddam animal docet appetens procreationis, atq; illum propterea semen ad sese attrahere, illudq; avidè complecti & continere, id quod ipsis quoq; viris



viris contingit, non rarò euidenter perci-  
 bere, dum sentiant coeuntes membrum vi-  
 rile tanquam à cucurbita intro ab utero at-  
 trahi, maximè si coitus fiat proximè ces-  
 santibus mensibus, quo maximè tempore  
 conceptus fieri solet. Postremò aduersus  
 nonnullos, qui se Aristotelicos appellabant,  
 et si Aristotelis sententiam ignorarent, Ga-  
 lenus probat Aristotelem idem sentire 2.  
 gen. animal. ca. 3. vbi fatetur Aristoteles  
 semē virile in utero detineri. Itaq; funda-  
 mentum Galenicum est, post coitum  
 semen manere in utero. Quod si ita se res  
 habet, vt semen retineatur, gratia alicuius  
 vsus retineatur necesse est. Huiusmodi au-  
 tem vsus duplex tantum concipi potest a-  
 nimo, Vnus, vt illud vim & facultatem  
 mulieribus concipiendi afferat, Alter vt  
 fiat materia & pars conceptionis. Si pri-  
 mus vsus satis fuisset, satis quoq; fuisset na-  
 turæ solam vim & ἐνέργειαν minimè sub-  
 stantiam seminis in uterum transferre,  
 sicuti ipse quoq; Aristoteles notauit & con-  
 firmat experientia in multis imperfectiori-  
 M bus



bus animalibus fieri, ac potissimum cum hac se-  
 minis profusio fit, homines non leue detri-  
 mentum perpetuo percipiunt. Sed esto, con-  
 cedatur substantiam seminis maiori facul-  
 tate vim & efficientiam potuisse mulieribus  
 communicare, id verò postquam suum mu-  
 nus perfecit, ac sanguini menstruo princi-  
 pium coagulationis praestitit, quæro quid  
 nam de illo agitur? Nemo dixerit illud  
 frustra & inutiliter retineri, quod quidem  
 non solum frustra, sed etiam perniciosè fie-  
 ret, cum semē nequeat diutius retineri, qui-  
 putrescat, ex quo gravissima solent excita-  
 ri mala. Itaque ut substantia seminis ve-  
 l exeat vel insensibiliter in utero dissoluatur  
 necessarium est. Primum fieri nequit, cum  
 Hipp. & Galenus docent s. aph. s. i. s.  
 nat. fac. princip. Os uteri post conceptum  
 ut melius possit semen apprehendere, omni-  
 ex parte contrahi & coardari, ut illud te-  
 stimonio Herophili, ne minimum quidem  
 specillum admittat. Quamobrem id reli-  
 quum est, ut semē viri in utero mulieris i-  
 halitus vel insensibiliter dissipetur, quæ fer-  
 fu



Fuit Aristotelis sententia, vt colligitur 2. gen. animal. 3. ad finem, dicentis: Semen geniturae humida & aquosa dissoluitur atq; in spiritum abit. Ex quo factum est, vt Galenus ex proposito diffusè hanc Aristotelis opinionem euertere, de sem, c. 4. quod ex parua humoris portione contingat multum aëris generari, vnde vterus statim à prima conceptione plurimum intumesceret, quod tamen non fit: Sed contra vterus ex tempore omni ex parte materiam conceptus comprehendens detumescit, quod eiusmodi spiritus ex semine genitus, etiamsi contendatur eum per pudendum mulieris posse exire, non tamen sine strepitu, aut saltem non sine sensu possit excerni, sicut demonstrant ceteri vteri flatus, qui vel supra vel infra excernuntur. Quibus & alias rationes adiungit, quæ facile ex Galeno haberi possunt. Itaq; colligendo summam, si semen viri post coitum retinetur in vtero, si retinetur alicuius vsus gratia, Si vsus conferendi vim non potuit satis esse, si semen post conceptum nullo modo potest fluere.



ex utero, neq; in spiritum dissolui, summa  
cum ratione concludendum est, semen vi-  
ri non solum qualitatem, sed etiam sub-  
stantiam & materiam foetui communicare.  
Ac sanè huiusmodi rationes fundamentu  
demonstrationis inniti videntur, quibus &  
alias addemus pro confirmatione Galeni  
sententiae. Ac primum consideretur com-  
munis ratio conceptus, de qua Aristoteles  
ita statuit: Virum formam & principium  
motus, foeminam corpus & materiam  
conferre, sicuti manifestè ex eo colligitur  
cùm alijs locis, tùm maximè 1. de gen. a-  
nimal. 20. addens: sicut in lactis coagula-  
tione corpus est lac, succus verò vel coagu-  
lum est, quod principium concretionis præ-  
bet. Cum igitur per Aristotelem foemina  
menstruum tanquam materiam ad conce-  
ptum conferat, quæro cum Gal. quomodo  
istud fiat? Hoc verò videtur dupliciter  
fieri posse: Vno modo si tempore coitus  
sanguis menstrualis in uteri cavitate conti-  
neatur, in quem projectum semen agat a-  
præstet principium motus. Altero modo )  
sanguis



sanguis menstruus per vasa ad vterum pertinentia occurrat ipsi semini, quasi cupiens vim & motus principium ab illo recipere, quod menstruum foetui materiam præbeat. Primo modo utiq; ab omni ratione videtur alienum esse, partim quod vix probabile est, illud tempore coitus in vteri cavitato perpetuo contineri, cum potiss: doceant Medici & consentiat Aristoteles 7. hist. anim. 2. 1. gen. anim. 19. mulieribus accommodatum tempus esse ad conceptum statim à profluvio mensium, quando vterus ab huiusmodi excremento prorsus liber & mundus remaneat, partim quod fluentibus mensibus, quo tempore vterus hoc sanguine præcipue refertus est, raro fieri soleat conceptio, ipse Aristoteles 7. hist. anim. 2. partim quod tum animal non ex sanguine, sed potius excremento vel malo sanguine generaretur, siquidem Hipp. & Galenus docent 6. Aph. 20. sanguis cum à proprio naturali loco excidit, sub sanguinis forma non posse remanere, sed vel suppurari, vel linefcere, vel in grumos conuertri, vel aliter

M 3 à na-



à natura sanguinis degenerare. Et Aristoteles quoque scriptum reliquit 3. part. animal. 4. in nullo membro nostri corporis contineri, excepto corde, quod propterea, inquit, cauum esse, ut sanguinem contineat, nisi in venis, quas natura sanguinis receptaculum molita est. Itaque omni modo concludendum, menstruum secundo modo mediantibus vasis uteri, foetui materiam suppeditare. Ex his quae dicta sunt, cum sanguis menstruus non possit contineri in utero tempore coitus, concludendum, altero modo mediantibus vasis uteri, foetui materiam suppeditare. in quo casu necesse erit, ut sanguis per orificia vasorum uteri concurrat, & cum eo permisceatur, quod duplici ratione videtur fieri posse: vel ut semen dividatur in tot partes, quot sunt orificia vasorum uteri, & ita sanguini menstruo uniaur & perficiatur: vel ut semen minimè distractum, sed continuum sanguini copuletur. Prima ratio videtur admodum difficilis, vel potius absurda, partim quod eiusmodi seminis distractio & divisio non

con-



conuenit istius naturæ, quod omnes concedunt, & confirmat experientia esse lentum & viscidum, adeò, ut difficulter possit in varias partes distribui & dissipari: partim quod foret necesse aliam certam causam inuenire, quæ tanquam præses quidam semen diuiderent. Quamobrem id restat, ut semen secunda ratione sanguini menstruo copuletur, quod naturæ seminis maxime conuenit, neq; ullam tertiam efficientem causam requirit. Nam simul atq; semen in uterum proijcitur, ille quasi animal appetens alimenta totus constringitur, ut semen complectatur, ut ventriculo ferè euenit, qui ut tradit à Galeno, cum cibos appetit, fundo retrahitur ad gulam, atq; ea quasi manu ad recipiendum alimentum utitur: ita uterus qualitatem seminis affectans totus obuiam sese offert, ad pudendum occurrit, suo collo & gula tanquam manu utitur, qua semen intro recipiat. Plura apud Galenum de his præclariss: legantur. Cum ergo tempore coitus præter semen viri nulla materia possit præsto esse ad formationem

M 4

foetus



foetus, summa cum ratione concludendum videtur, eiusmodi semen non solum efficien-tem, sed etiam materiam concedere. Deinde consideremus eas partes quas medici solidas, radicales & seminales vocant, e. gr. Venam, arteriam, nervum tanquam communia instrumenta. Querit Galenus ab Aristotele 1. Sem. 5. ex qua materia gignantur huiusmodi instrumenta? Ille autem respondet, illa fieri ex sanguine, sed contra Galen. arguit, istud minimè fieri potuisse. Cum enim huiusmodi instrumenta sint alba, ex anguia, longa & cavà, nullo modo videntur potuisse generari ex materia rubra, tenui, liquida, quæ neq; intendi, neq; in modum fistulæ perforari possit, cum illa magis requirat materiam albam, crassam, lentam, quæ longius distrahi & perforari possit: propterea concludit, huiusmodi partes non ex sanguine, tanquam materia ineptissima. sed ex semine omninò fieri. Verùm nonnulli cum Aristotele ad hanc rationem respondent, illas partes fieri quidem ex sanguine, sicuti carnē & reliquas corporis partes, sed



Sed diuersa planè ratione: siquidem cæteræ  
 corporis partes sine pluribus transmuta-  
 tionibus pròximè ex sanguine generantur,  
 Solida autem fiunt ex sanguine, qui minimè  
 proprium colorem, substantiam & formam  
 retineat, sed multas antea transmutationes  
 subeat, adeò, vt ille primum ex rubro al-  
 bus, ex tenui crassus, & ex liquido lentus  
 efficiatur. Quam quidem rationem & Ari-  
 stotelem ipsum, irridet Galenus, quasi ille  
 suorum principiorum oblitus, naturam tan-  
 topere ab eo laudatam, nunc inertem & sto-  
 lidam faciat, quæ nihil vnquam frustra  
 aut temerè agens, cum ad efficiendum ve-  
 nam haberet album, crassum, lentum, &  
 accommodatissimum humorem, illum eli-  
 geret, qui diuersus sit ex sanguine scilicet,  
 id quod ab omni ratione tam est alienum &  
 in disciplina Aristotelis absurdum, quàm  
 quod absurdissimum. Sed præter hæc Gal.  
 I. de sem. 9. euidentissimam rationem, ac  
 similitudine accepta à semine plantarum  
 probat, semen viri non modò efficientiam,  
 sed materiam fetui præstare, quo loco gra-

M s niter



uiter inconstantia arguit Aristotelem, qui cum fateatur 1. gen. animal. ult. Semen in omnibus plantis, non solum materiale, sed etiam efficiens principium in se habere, quasi suorum dogmatum oblitus, voluerit alterum in animalibus auferre, ac opera naturae diverso modo in plantis atque animalibus exponere. Etenim cum natura seminis non alijs facultatibus plantam, alijs animal soleat creare: turpe omnino videtur, tantum Philosophum, quae in plantis confessus fuerit, non ad animalia quoque transferre, siquidem utriusque genera & plantae, & animalia eandem proportionem seruant. In plantis semen indiget terra, ut ex ea alatur, nutriatur, crescat, indiget radicibus, quae ex terra alimentum suscipiant. Semen plantae ex se ipso mittit truncum, ex trunco ramos, surculos, donec ad minimas frondes & cacumina veniat: Sic propemodum semen viri in utero mulieris opus habet utero mulieris, qui terrae proportionem recondet. Membrana  $\chi\omega\rho\iota\sigma$  appellata est multas venas, velut radices continet, quarum opus est ut foetus eductus

uter



utero alimentum praebeant, attractum à  
 semine viri, & non vnicum, sed tres prae-  
 cipuos truncos ex tribus certis principiis pro-  
 ducit: Ex jecore venam cauā, ex corde ma-  
 gnā arteriā, quā aortā appellant, ex  
 cerebro spinalem medullam, ex quibus de-  
 inde multae propagines primū maiores,  
 deinde minores, quasi rami quidam consur-  
 gunt, donec tandem huiusmodi propagatio  
 ad extremas & minores soboles deueniat, ut  
 animal non ineptè sanguinea planta nomi-  
 netur. Neque est ut quis putet se hanc Gale-  
 ni rationem & similitudinē posse euertere,  
 & Aristotelem tueri, propterea quod ex vno  
 semine fiat planta, quae vnā tantum facul-  
 tate vegetabili praedita sit: Ex altero au-  
 tem fiat animal, quod praeter eiusmodi fa-  
 cultatem, alijs quoque facultatibus praeditum  
 sit, ex quo colligat semen quidem planta &  
 efficientis & materiae principium contine-  
 re: semen verò animalis propter plures fa-  
 cultates & perfectiones id consequi non o-  
 mnis. Namque huic respondet Galenus, quod  
 neque Aristoteles negat, foetū in utero pri-  
 mum



num viuere vitā plantæ, deinde animalis, ac propterea vtrāq<sup>ue</sup> eundē opificem, eandēq<sup>ue</sup> vegetabilem animā habere, atq<sup>ue</sup> eo tantum differre inter se, quod hæc planta sanguinea vel carnea, non amissa, quam prius habebat, facultate, sed alia insuper acquisita in animal fuerat euasura, ac suo tempore de loco in locum transitura. Cum ergo & plantæ & animalia, quatenus pertinet ad generationem, nutritionē, augmentationē, vnā atq<sup>ue</sup> eadem ratione producantur, constet verò semen plantæ non solum efficiens, sed materiale principium continere: vtiq<sup>ue</sup> Aristoteles non videtur potius se excusare, qui non idem voluerit de semine animalis statuissē, quasi censuerit naturæ opera in animalibus & plantis diuersa esse. Ac sanè hæc itidem ratio aduersus Aristotelem videtur demonstrare. Videatis præter hæc locum notabilem apud Aristotelem 2. gen. animal. 4. qui docet primam partem hominis constitutionem ex semine fieri (sed semen dicitur rubrum alibi) sed dubitaueris cum primum cor oriatur sanguin



guine præditum, &c. Sic in animalium  
 materia excrementum constitutionis ali-  
 mentum est. Ac rursus ad finem ca. Ossa  
 guntur in prima partium constitutione gig-  
 untur ex seminali excremento: Sic nerui  
 o modo, quo ossa constituuntur, atq; ex eo-  
 dem seminali excremento oriuntur. Sed  
 ungues, pili, cornua, & si quid eiusmodi ali-  
 id est, ex cibo gignuntur aduentitio, quem  
 ament de foris acquirunt. Hæc Aristoteles.  
 Sed ferè nimium transgressus concludo cum  
 celeberrimo Hipp. experimento, de illa  
 ancilla saltatrice, Hip. lib de nat. inf. Ga-  
 en. 1. de sem. 4. Restat vt breuiter videam<sup>us</sup>  
 rationes, quæ pro Aristotele defendendo  
 allatæ fuere. Quantum ad primum argu-  
 mentum, illud concedatur tanquam veriss:  
 idem simul agens, & patiens esse non posse.  
 Actus enim & potentia simul forent, quod  
 natura non patitur, Sed respondeam<sup>us</sup> in se-  
 mine viri duas partes reperiri. Alteram qui-  
 dem tenuissimam ac plenam spiritus, in qua  
 anima vegetabilis est, vis generandi &  
 principium motus: Alteram crassiore

&



& magis corpoream seu materialē, in qua  
fit actio. Vnde nulli mirum videatur, semen  
secundū huiusmodi varias partes, cum agē-  
tis cum patientis vires habere, sicuti mirum  
vel absurdum non est, edito animali animā  
in corpus agere & illud regere. Quamob-  
rem sicut artifex & materia non idem sunt  
ita neq; animā seminis, & seminis corpus id  
statuendū est. Quod verò aduersarij aiunt  
de insectis, piscibus & reliquis id genus  
quod fœminis mares vim solum & in egypto  
soleant conferre, id primum negare non  
possum. Cum enim huiusmodi facultas se-  
minis sit quædam qualitas seu forma, sine  
aliquo subiecto nullo modo videtur posse  
de vno in alterum corpus transferri. Ex qua  
fit verisimile non modo generandi faculta-  
tem & vim, sed simul cum facultate aliquo  
corpus seu spirituosum, seu fortè humidum  
& materiale à maribus conferri, quod ex  
emplo gallinarum & auium potest con-  
firmari. Siquidem sensus demonstrat, in ou-  
earum, cum quibus coire, reperiri nescio  
quid crassi & rubri coloris, quod in reliquis  
fin



sine concubitu non apparet, quod quidem  
 nemo aliud, quam seminis materiam  
 esse dixerit. Sed de re admodum latente,  
 & fortè soli naturæ perspecta non multum  
 laboro, qui pro comperto habeo, naturam  
 propter multas evidentes rationes, dedita  
 opera hominem, de quo agimus, à reliquis  
 animantibus multis modis & rationibus se-  
 parasse, ut & animantia alia à plantis. De-  
 num utcumq; omnia concedantur, quacumq;  
 de huiusmodi animantibus isti fabulantur,  
 non puto eorum argumentationē concludere:  
 In nonnullis animalibus sola virtus se-  
 minis infunditur, Ergò semen generaliter  
 foetus materia non est. Sicut neq; valet ratio:  
 Testes in omnibus animalibus non sunt ne-  
 cessarij ad generationē, Ergò, &c. Postremò  
 restat extremū, sumptum à materia semi-  
 nis, quod aduersarij inquiunt, neq; à ca-  
 lido, neq; à frigido posse coagulari, sine qua  
 coagulatione certum est, conceptionem ac  
 formationem partium fieri non posse. Cum  
 autem de hac re multa possint disputari, de  
 qua ex proposito ac diffusè tractat Philoso-  
 phus



phus 4. Meth. 50. ubi docet quædam coagulari à calido tantum, ut sal: quædam à frigido tantum, ut Crystallus: quædam ab utroq; successivè, ut thus & similia. Quæ difficilior & longior disputatio huc non pertinet. Dico igitur huiusmodi argumentum in rebus externis, de quibus Aristoteles quoque sermonem fecit, aliquam vim obtinere. At verò in vivente corpore ac rebus quæ intra illud continentur, rem se aliter habere. Ac profecto nemini Aristotelis vel rerum naturæ perito debet mirum videri, semen in utero mulieris atq; illius temperie in unum cogi, alterrari & ad foetus formationem disponi. Sicuti g. e. alimenta à ventriculo eiusq; temperie nonnulla crassa fiunt, nonnulla attenuantur. Iam quod ad semen mulieris Aristoteles, Athenæus & reliqui eius sectatores fuerunt in ea sententia, foetus ex semine viri tanquam efficiente ex menstruo sanguine, tanquam materia generari, qui propterea contendunt in foemina aut nullum aut planè sterile reperiri, vult licet videre apud Aristotelem I. gen. an. 19

An foemina semen  
foecundum habeant.



20. nec non 2. gen. animal. 4. pro qua  
 opinionione cum multæ rationes ex ipso Ari-  
 stotele, Auerr. & alijs colligi possint desino,  
 pauca quædam quæ mihi validiora vi-  
 dentur afferro. Itaq; primùm sic licet argue-  
 re, si fœmina semen atq; illud fecundum  
 habet ex se ipsa, absq; maris congressu  
 concipiet, probatur: Vbi enim duo necessa-  
 ria principia generationis agens & patiens,  
 & præterea locus & tempus conueniunt,  
 tunc vt conceptio fiat est necesse, Sed hæc  
 omnia concurrunt in muliere, Ergò, &c.  
 Secundò afferunt argumentum sensus: Cum  
 manifestè appareat multas mulieres conci-  
 pere sine seminis emissionē, in quo argu-  
 mento Auer. multus est, qui inquit, post-  
 quam legit lib. Aristotelis se hanc rem quæ-  
 uisse à multis mulieribus, quæ indicaue-  
 unt plurimas grauidas fieri sine seminis e-  
 missionē. Quo loco narrat historiam mulie-  
 ris de cuius sacramento multum poterat  
 confidere, quod illa grauida facta sit in bal-  
 neo aquæ dulcis, in quo mali homines sper-  
 matizauerant. Tertiò, si semen mulieris

N

ad



ad foetus generationem concurreret, necess  
omnino esset mulieres semen habeant, Secunda  
plurimae semine carent, Ergo, Minor pro  
batur, quod multae mulieres concipientes fa  
teantur se nullam in coitu voluptatem per  
cipere, neq; vlllo tempore semen emittere  
Quarto, si mulier semen haberet, tunc habe  
ret duas naturales euacuationes inter se con  
trarias, alteram materiae coctae, id est, se  
minis, altera crude, id est, sanguinis, quod  
fieri nullo modo potest. Etenim constat  
quod coctum est a caliditate, quod crudum  
est a frigiditate provenire. Itaq; mu  
lier simul vno eodemq; tempore calida &  
frigida foret, quod absurdum. Quare mu  
lieres cum menstruis redundant, vt semen  
careant necesse est. Postremo vnius esse  
actus naturalis vnica est materia, vnicun  
agens, quod in cunctis rebus naturalibus fa  
cile potest declarari. At vero si semen mu  
lieris tanquam efficiens ad foetus generatio  
nem concurreret, tunc duo forent princi  
pia efficientia vnius effectus naturalis, se  
men viri & semen mulieris, quod repugna  
in/



stituto naturæ. Hæc peripateticorum & alia. Sed altera ex parte Galeni respon-  
sionem perpendamus, de qua non ignore  
omnes non idem sentire. Ego sentio ita  
habendum esse: Mulieres ad generationem  
fœtus, & sanguinem menstruum & semen  
conferre, atq; utrunq; partim materiam  
partim vim & facultatem tribuere, non  
tamen ijsdem viribus & conditionibus, sed  
in semine principium efficiens validissimum  
esse, materiale paucissimum: Contra in san-  
guine menstruo, quod ad materiam spectat  
plurimum, quod ad vim & facultatem im-  
becille reperiri. Quæ Galeni sententia  
passim & 2. de sem. 2. & inter omnes con-  
uenit illud ad generationem fœtus mini-  
mum esse, tametsi Philosophus vnum tan-  
tum materiale principium illi concedat.  
Et facile confirmatur, quod quæcunq; mu-  
lieres carent eiusmodi excremento, non con-  
cipiunt, nec non quod toto tempore conce-  
ptus & lactationis menstruæ purgationes  
mulieribus cessant, certissimo argumento,  
fœtum & in utero, & extra uterum illis

N 2

nutri-



nutriri. Sed tota difficultas in semine versatur. Quamobrem Galenus diffusè aduersus Aristotelem, Athenæum, Emped. &c. conatur probare mulieres & semine abundare, & illud fecundum esse, ac partim materiam, partim efficientiam formationi fœtus communicare. Ego verò non omnia Galeni argumenta, sed solidiora in medium proferam, ut cum Aristotelis argumentis factum est. Galenus itaq; ex rei natura atq; euidentia conatur suam sententiam stabilire, eò quod ex anatome apparet, testes ad vterum muliebrẽ vtrinq; alterum fuisse annexum, ac seminaria vasa eadem ferè sicut in maribus reperiri. Ex quo licet hanc rationem conficere: Vbicunq; instrumenta à natura instituuntur, ut propter certum vsum instituuntur necesse est. Sed testes tam in mare quàm fœmina sunt à natura instituti, ut & vasa: Ergò, Et si hæc eundem habere finem demonstretur, tamen Athen. & Auer. conati sunt eum destruere. Inquiunt, seminaria vasa fœminis data esse propter eam causam, ut aliqua similitu-



litudo & conuenientia in prima formatione membrorum apud vtrosq; appareret, minima verò vt vtrorumq; vsus seruaretur, sicuti in viris mammae quoq; sunt genitæ, quamuis nullum vsu præstent. Sed Gal. facile hanc responsionem confutat 2. de sem. 1. inquit: rem longè aliter in vasis mulierum ac mammis virorum sese habere, siquidem in maribus glandulosa illa corpora circa mammas non reperiuntur, pariter neq; vllum vestigium lactis in viris apparere, sicut in foeminis, nō solum vasa seminaria sed etiam testes copioso semine sunt referti. Quamobrem, inquit Galenus, quemadmodum si omnibus marib' mammae lacte plenæ conspicerentur, non opus foret ratione inuestigare, an id verum esset: Ita cum videamus semen in foeminis contineri, an foeminae semen excernant quærendum non est, quippe longè melius esset, quam vim illud habeat, perscrutari. Neq; verò desunt aliae quoq; rationes, qui confirmant mulieres seminis expertes non esse. Namq; sicuti retentum semen viri noxium est 6. loc. aff.

N 3

ita



ita in mulieribus & vteri praefocationem &  
alia mala grauissima solet excitare. Exem-  
plum apud Galenum ibidem de vidua. Un-  
de Galenus in eam sententiam venit, maiorem  
ex retento semine noxam, quam ex men-  
struis prouenire. Praeterea certum est  
somniautes mulieres in seminis pollutionem  
incidere, ut & viri, quod quidem ex nulla  
materia praeterquam seminis contingere  
potest. Sed quae mulieribus circa coitum  
contingunt, manifestè demonstrent illos se-  
mine non carere, siquidem quàm primum  
earum vasa crassa materia referta sunt  
ac turgent, quae in dissectionibus conspiciun-  
tur, tunc maxime in venerem proclines sunt,  
quod aliam ob causam non fit, quàm ut  
scribit Galenus 6. loc. aff. quod omnibus  
animalibus naturalis quaedam insit cupiditas  
ercernendi seminis. Manifestius apparet  
in brutis, quae furentius mares ad coitum  
excitant & quaerunt, post concubitum ve-  
rò profuso semine quiescunt, ut neq; mares  
amplius admittant. Illud etiam inde cla-  
rum est, quod foeminae castratae nullum ma-  
ris



is concubitus querant, aut admittant. Demum nemo est, qui non in concubitu aliquando seminis profusionem apud mulieres in se ipso non experiatur, præterquam quod ipsæ quoque mulieres fateantur se eiusmodi seminis effusionem sentire, eaque oblectari, ac statim facta seminis excretionem, libidinis ac concubitus desiderium finire. Cum ergo testes & vasa seminaria tam mulieribus quam viris data sint, cum illa semine referta conspiciantur, cum in præsecutionem mulieres incurrant ob retentum semen, cum pollutiones habeant, cum stimulentur, cum castratæ brutæ mares non amplius admittant, ipsæque mulieres in coitu emittant, voluptatemque percipiant, de hoc dubitandum non amplius erit sensibusque repugnandum nefas habeatur. Illud restat aduersus Aristotelem, semen fœminarum in procreatione fœtus non solum materialis, sed etiam efficientis principij obtinere rationem, quod quidem etsi multis rationibus potest confirmari, vnico argumento contenti erimus, quod mihi videtur posse reli-

N 4

quo-



Causa si-  
militudi-  
nis prolis.

quorum vicem supplere, ac planè demon-  
strare. Illud verò accipiendum est ex si-  
militudine, qua filijs cum parentibus inter-  
cedit. Sed cum Galen. in hoc generi  
argumenti multus sit, pauca pro hac contro-  
uersia adducemus. Similitudo filiorum ad  
parentes manifestiss: est: Causa autem pro-  
pter quam nunc patris, nunc matris simili-  
tudinem habeant, difficile est videre. Ari-  
stoteles diffusius et multum laborat. Sum-  
matim sic statuit 4. gen. animal. 3. filio-  
rum in vniuersum similitudinem hanc (&  
contra) vel fieri pro varia actione seminis  
virilis in sanguinem menstruum, ut si se-  
men viri planè superat materiam mulieris,  
tunc filius patri: Sin autem contra, filius  
matri assimilatur. Sed absurditas huius  
opinionis est manifestior, quàm ut possit  
refutari. Siquidem cuiq; debet constare  
actiones prodire à forma, non à materia.  
Quare, et si negandum non est, fœtum ex  
materia & alimento matris posse variam  
temperiem & mores sortiri, tamen nullo  
modo potest assenerari, hinc sexum vel fi-  
guram



guram posse mutare, id quod ab omni rerum euidencia alienum est. Nam persica arbor, inquit Galenus, in Ægyptum translata formam minimè transmutat, sed bonum tamen alimentum nata, fructum esui iucundum affert, cum prius non potuisset. Sic neq; oues mutato alimento capris, neq; capræ ouibus similes euadunt. Cæterum Galenus ita statuit, omnem fœtus similitudinem vel dissimilitudinem non aliunde quàm ex semine vtriusq; parentis prouenire: Cui communi omnium consensu vis agendi, atq; efficientis principij iure tributa est, qui quidē cum diffusè aduersus Aristotelem & Athæn. de hac re disputasset lib. 2. de sem: 1. duplici potissimum argumento utitur, altero hypothetico, altero categorico, idq; demonstratiuè.

Primum argumentum, Si vtriusq; parentibus similes partus nascantur, ex communi causa. quæ in vtriusq; inest, similes efficiuntur: si partus ex communi causa quæ vtriusq; inest parentibus similes efficiantur: id vel ex seminis vel menstruorū

N s

su'



substantia contingit, cum praeterea nihil  
tertij possit inueniri.

Sed substantia menstruorum vtriq<sup>q</sup> par-  
ti minimè inest communis.

Ergò part<sup>2</sup> ex semine similes efficiuntur.

Secundum argumentum Categoricalum.

Quoniam filij vtriusq<sup>q</sup> parentibus similes  
sunt, necessario commune cum vtriusq<sup>q</sup> prin-  
cipium habeant, necesse est, quod ipsos re-  
git: Prima pars. Secunda: Filij, vel ex se-  
mine vel sanguine menstruo parentibus si-  
miles euadunt:

Sed ex sanguine menstruo similes eua-  
dere parentibus non possunt, Ergò ex semi-  
ne.

Galenus tandem tertium adiungit &  
concludit: Si ex semine similitudo est,  
quia multi matribus quàm similimi red-  
dantur, foeminas quoq<sup>q</sup> semen habere ne-  
cesse est. Ex quibus videnda est senten-  
tia Montani consil. 228. qui inquit: semen  
emissum à muliere potius ad voluptatem,  
quàm conceptionem facere. Itaq<sup>q</sup> huius-  
modi sunt rationes Galeni. Iam ad argu-  
menta



nenta pro Aristotele proposita respondeamus. Primum fuerat aduersariorum argumentum: Si semen fecundum habet foemina, etiam sine concubitu conciperet. Hoc argumentum video multis doctis viris magnum dare, concipere posse muliebrem sine viro. Inter quos est Vallesius 2. contr. 6. ad finem, qui fatetur hoc saepius fieri, sed foetum ad perfectionem nunquam duci, Vnde et mola generentur. Sed non puto hanc sententiam esse recipiendam. Etsi Galenus videatur innuere foeminas posse sine concubitu concipere molas, ut gallina oua subuenanea, cum id potius ex aliorum quam propria sententia videtur admisisse, statim rearguens inquit, 4. vsu part. 7. neminem vidisse vnquam. Quare alia ratione respondeo ad argumentum, sicut respondet Galenus 2. de sem. 4. ad finem. Cum enim ad generationem & nutritionem foetus concurrant duo necessario: Alterum semen, quod debet esse copiosum, calidum, lentum & crassum. Alterum excrementitius humor, qui pariter debet esse copiosus, fieri non potest.



potest, ut ambo in muliere concurrant, si-  
 quidem eiusmodi semen, non nisi ab insigni  
 caliditate: excrementa autem à frigiditate  
 & humiditate possunt oriri. Itaque si foeminae  
 excrementis abundat, non poterit seme-  
 accommodatum gignere, vel si idoneum seme-  
 generet, excrementis non poterit redun-  
 dare. Atque haec certissimum & verissima cau-  
 sa est, propter quam mulieres sine concu-  
 bitu nequeant concipere. Ergo ad argu-  
 mentum: Negatur consequentia, quamvis  
 enim semen mulieris fecundum & optimum  
 fuerit, tamen deficit excrementicius humor  
 qui ad concipiendum & nutriendum foetum  
 necessarius est. 2. & 3. argumentum, quod  
 videntur ferè eandem vim habere, satis  
 leuia sunt. Quare ad primum respondeamus.  
 Nunquam feminas sine seminis emissionem  
 concipere, siquidem ut habet Galenus. lib.  
 14. de usu part. in conceptu necesse est ut  
 utrumque semen misceri. Hinc medici hortan-  
 tur, utrumque eodem tempore semen emitti  
 tere. Lucreti: Odi concubitus qui non ut-  
 trumque resolvunt. Ad Averroem. Indignus



hoc est tanto Philosopho, in balneo con-  
 ceptū fieri posse: alioquin poterat didicisse  
 Aristotele suo 2. gen. an. 2. semen esse  
 materiā spirituosam, & extra propria vasa  
 momento temporis alterari & corrumpi. Ec-  
 cēd ex 2. gen. anim. 6. illos homines esse in-  
 fecundos, quibus penis est immoderatus,  
 quod semen longius delatum refrigeretur.  
 ex quibus vanitas fabulæ huius manifesto  
 colligitur. Ridiculum etiā est de iuramen-  
 to mulieris, quasi ignoret ex suo Aristotel. 9.  
 stor. animal. 1. Mulieres suapte natura  
 se mendaces. Vnde etiam Iurecons. perjurij  
 causam illis sustulerunt, excepto in testa-  
 mento. Ex quo apud Græcos prouerb: mu-  
 lierem iurante ridet cælum. Hac ratione et-  
 iam facile respondetur ad aliud argumen-  
 tum. Omnes mulieres parientes semen emit-  
 tre, tametsi non fateantur, pudore vel ob-  
 lito sensu, aut aliam ob causam, Et quate-  
 nus ad voluptatem, nonnullæ mulieres do-  
 cent, se nullam percipere voluptatem in coi-  
 tu, sed illis non oportet fidem habere. Nisi  
 vim haberent voluptatem, abstinerent.

Imò



Imò Auic. (9. de animal. 21.) 1. Tert. 2. c. Haliabbus 6. Theor. & alij non verentur affirmare, mulieres multo maiorem voluptatem percipere, quam viri, quibus fauet iudicium Tiresiæ, qui cum vtrumq; fuisset expertus, arbiter electus à Ioue & Iunone de voluptatis in concubitu quantitate contendentibus: Tres voluptatis uncias in viro, nouem in mulieribus pronunciauit.

Quartum argumentum. Mulieres non potuisse habere duas naturales euacuationes contrarias, cocti scil. vt seminis, & crudi sanguinis menstrui 1. gen. animal. 19. 2. gen. animal. 4. quod mihi quidem videtur tam leue, vt mirum cur à tanto Philosopho productum fuerit. Quid? absurdum non est si homo varijs partibus, varias & diuersas excretiones habeat, & excrementis redundet.

Postremum argumentum erat de vni agente & vnica materia, quæ in rebus naturalibus à natura sunt instituta. Respondetur cum Gal. no 14. vsu part. 7. semina mulierum



mulieris non solum & separatim, sed simul  
 commisceri cum semine viri, simulq; agen-  
 di vim habere, ac propterea vtrumq; vni-  
 us motus principium fieri, atq; ad vnius  
 animalis procreationem conspirare: sicut re-  
 vera non possent, si vtrumq; semen motu in-  
 ter se discrepante, moueretur, vt ambo in  
 vnius animalis procreationem conspira-  
 rent, quod pariter de materia statuendum  
 est.

## CAPVT VI.

## DE STERILITATE.

Conuenit inter omnes, hominis  
 generationem & reliquorum anima-  
 rum præ cæteris naturæ operibus esse natu-  
 ralissimum & perfectissimum, quod elegan-  
 ter demonstrat Aristoteles 2. gen. animal.  
 Gal. usu part. 14. 2. cum singula anima-  
 lia sempiterna esse non possint, continua ge-  
 neratione id præstant. Ex quo factum esse  
 scribit Galenus, vt omnibus animalibus  
 gene-



Ratio  
dinis.

generandi instrumenta concessa sint, etiam  
rationis expertibus. Nos igitur sermo-  
nem habituri de admirabili naturæ opera-  
tione, id primum sciendum est, nobis hoc  
tempore minimè propositum esse, ut inqui-  
ramus, qualis nam sit ea virtus tantoperè à  
Philosoph. & medicis decantata, quæ fœ-  
tum in utero format, ideoq; formativa di-  
cta est, quo ordine singulæ corporis par-  
tēs formentur, quando & quot diebus, quæ  
temporis momento DEVS naturæ & re-  
rum omnium autor animam fœtui infun-  
dat, & alia, quæ maximas & iam diu agi-  
tat as controuersias continent. Sed nos illud  
vnum statutum habere, ut medici perso-  
nam sustinentes, ad quam præcipuè spectat  
naturæ conatus iuuare & tueri, de ijs aga-  
mus, quæ conceptum atq; illius absolutionē  
perfectionemq; possunt perturbare & impe-  
dire. Conceptus sicuti in omnibus actioni-  
bus corporis nostri contingit, potest vel  
prorsus auferri, vel imminui, vel depraua-  
ri. Si prorsus tollatur, ut mulier nunquam  
conciat, sterilitas dicitur huiusmodi affe-  
ctio.



Ratio. Si rarius, debilis & imminuta est  
conceptio. Quo etiam referri posse videtur, Essentia.  
si mulier quidem concipiat, nequeat tamen  
fœtum ad debitum partus tempus incolu-  
mem conseruare & tempestiuè edere, quod  
unico abortus nomine comprehendo. De-  
mum conceptio sit deprauata, quotiescunq;  
utero mulieris concipiuntur non fœtus legi-  
timi & naturales, sed monstra vel molæ,  
aqua, flatus, &c. quod conceptus formam  
præseferat, de quibus dicendum erit.

Ad primum, Quantum sterilitas pri- Causæ  
scis fuerit odiosa & detestabilis, declarât sa-  
cræ literæ. Causæ sterilitatis variæ ac plu-  
rimæ nominantur à medicis: Hipp. tan-  
quam principales recenset. Si os uteri di-  
stortum aut omninò auersum sit à pudendo.  
Si uterus nimium pateat, quàm conueniat.  
Si os uteri ex pudendo exciderit, atq; alia  
id genus, de quibus lib. de sterilitate  
à princip. Alij alias, nunc plures, nunc  
pauciores constituunt, & suo arbitratu di-  
sponunt. Sed nos experiamur clarioris do-  
ctrinæ gratia, an omnes causæ ad certiore[m]  
O metho-



methodum referri possint, ut Galenus docet 3. de sympt. Caus. Initium & caput inventionis omnium causarum, quæ facultatibus noxam inferunt, non aliud est, quàm cognitio modi, quo per sanitatem suas perficiunt actiones. Cum itaq; ante statutum sit, ad naturalem conceptum efficiendum maris & foeminae concubitus necessarium esse, id primum constare debet, sterilitatem aut vitio maris, aut foeminae, aut utriusq; fieri posse. Et si nos hoc tempore tantum mulieres morbos tractemus, tamen cum integram tractationem habeamus, huiusmodi causæ, quæ ad mares pertinent, etiam non sunt intermittendæ. Rursum verò cum uterq; mas & foemina ad generationem plurima conferre necessario, qualia sunt maioris momenti in maribus quidem testes, membrum genitale, semen, in foeminis pudendum, uterus, testes, semen, sanguis menstruus, omnis ratio colligit, quemlibet affectum præter naturam, tum maris, tum foeminae in singulis partibus propositis posse fecunditatem, vel imminuere, vel prorsus auferre. Causæ  
igitur



In viris.

igitur sterilitatis ex parte marium v. g.   
 entis longius vt infœcundus ab omnibus da-   
 minatur, quod semen in via refrigeretur,   
 riusquam ad vterum recipiatur. Auic.   
 b. 3. Fen. 21. Tract. 1. cap. 8. Et Ari-   
 oteles 1. gen. animal. 6. Et hæ rationes   
 cet tanti philosophi & ferè ab omnibus re-   
 ceptæ, tamen fortè inanes sunt. Cum enim   
 semen per canalem penis, cuius caliditas &   
 audendo muliebri fouetur, transcat, videtur   
 eri non posse, vt illud refrigeretur, vt fortè   
 contrarium videatur, longum penem ad ef-   
 iciendum conceptum aptiorem esse & ac-   
 commodatiorem, quod sic semen sine loci   
 ut temporis interuallo protinus in vtero   
 leponatur, alioquin malè ageretur cum   
 animalibus, vt equo, &c. Ex hoc loco licet   
 conijcere incredibilem delirationem Auer-   
 rois, de qua suprà. Et quomodo istud Ari-   
 toteli & bonæ philosophiæ conseniat aliq-   
 viderint. Et hic pro Auerr. nihil occurrit   
 aliud, quàm quod in glossa habet hæc ver-   
 ba (de conceptu in balneo super aquam) in   
 quibusdam hebraicis libris non haberi. Ce-



terum sicuti plerique omnes volunt longum  
penem infecundiores esse, ita altera ex par-  
te non desunt, qui affirmant penem quoque  
breuiorem viros infecundos reddere, quod  
fortè magis probabili ratione videtur, quod  
semen videatur non ita promptè posse in pe-  
nitiorum sinum uteri immitti. Sed ut liber  
dicam, Ego quidem sentio, utramque huius  
modi causam, Penis scilicet longitudinem  
& breuitatem in faciendâ hominis sterili-  
tate admodum infirmas rationes obtinere  
id quod experientia potest confirmari  
quorum utriusque copiosissimos filios procreant  
Sed magis videtur sterilitas fieri posse vitio  
penis, si obliquus fuerit, si ligamentum di-  
stortum habeat, si viâ seminis vel natura  
vel morbo acquisito aut proprio, angus-  
tia sit ob vicinas partes. Demum vitio  
penis accidit sterilitas, si ille perpetuo gra-  
cilis & flaccidus permaneat, ut neque inflari  
neque erigi possit, quod ad missionem seminis  
plurimum facit. Iam verò secundo loco vi-  
ri ob vitium testium steriles fiunt. Cum enim  
testes à natura sint fabricati, sicut aduersus

Aristote-



Aristotelem demonstrat Galenus 14. vsu  
 part. & 1. de sem. 15. 16. vt semen pro-  
 ducant, illudq; omnibus numeris absolutum  
 ac fecunditatis plenum reddant, si illi de-  
 ficiant à suo munere, summa cum ratione  
 possunt homini sterilitatē afferre. Neq; verò  
 diuti⁹ laborandum est, quomodo testes fiant  
 infœcundi, quoniam possunt laborare omni  
 genere morbi, intemperie, solutione conti-  
 nui, mala compositione. Quare, laboran-  
 te teste vno vel altero, intemperie simplici  
 vel composita, cum, aut sine materia, de  
 quibus videatis Galenum in arte medic. c.  
 45. Si aliqua inflammatione aut alio quo-  
 dam tumore præter naturam magno & diu-  
 turno fuerint oppressi, obsessi, indurati, vul-  
 nerati, ulcerati, conuulsi intra ventrem  
 adhuc latentes, potissimum autem, si ob  
 causas certas sunt euulsi: Omnes tales affe-  
 ctus & separatim & coniunctim testium ste-  
 rilitatis causam possunt afferre. Postremò  
 mares ob causam seminis steriles fiunt, idq;  
 dupliciter potest contingere. Primum si  
 semen prorsus non gignatur, vel minori co-  
 pia



pia quàm opus sit. Secundò, si semen generetur vitiosum & ad conceptum parum accommodatum. Semen nihil quicquam, vel parcè vel restrictè gignitur deficiente ipsa materia, ex qua illud fieri possit, velut contingit hominibus nimis pinguibus: Vel altera ex parte lædit atrophia, diuturno morbo nimium extenuatis, in quibus natura omnem materiam seminis in substantia & nutritionem conuertit corporis. Semen autem vitiosum ob multas causas internas æquè atq; externas fieri potest. Quamobrem si instrumenta & vasa seminaria sine insigniter intemperata, vel alio modo laborant, vnde illa nequeant materiam fecundam seminis attrahere, attractam concoquere & tam diu retinere, donec illud integram absolutionem recipiat, quod exemp. grat. frequentissimè illis accidit, qui longiore tempore gonorrhœa laborant: Si partes præcipuæ nostri corporis, ventriculus, esophagus, &c. sint malè affectæ, ut nisi improba fiant alimentorum concoctiones, probabile est, semen vitiosum generari, & ineptum ad



ad conceptum. Pariter causæ externæ quæcunq; possunt corpora nostra alterare, & ea afficere, quas non naturales appellant vitiosum & infæcundum semen solent efficere. Ad quem modum viri nimis frequenter concumbentes, fiunt steriles magna ex parte, quoniam quod præclare scribit Plutarchus in vita Lyncurgi, id quod Galen. etiã diffusè declarat lib. 1. de sem, c. 16. Cum enim seminarium humorẽ testes à vasis seminalibus eorumq; anfractibus attrahant antea ipsis præparatum, sicuti reliqua omnia membra naturæ instituto succũ sibi accommodatum solent attrahere: si quis assiduus coitibus hoc totum semen exhauriat, hinc fit ex vna parte, vt testes ex superioribus venis, quicquid in ipsis serosi humoris continetur, id omne trahant, quod certè ve sit paucò sanguine irroratũ, nondum probè decoctum necesse est. Altera autem parte vt venæ à testibus violenter priuata ab humore, etiam illæ à superioribus venis, & rursus illæ ex superioribus, & hæc à vicinis subinde trahant ratione vacui vsq;



quo talis trahendi necessitas in omnem corporis partem diffusa, omnibus membris animalis proprium alimentum eripiat. Ex quo fit, ut omnes animalis partes non tam se-  
roso humore, quàm vitali etiam spiritu pri-  
uentur, quoniam hic & arterijs simul cum  
genitali humore excernitur. Itaq; mirum  
non est, si qui immoderato coitu utuntur,  
generaliter quidem imbecilliores fiunt, cum  
totum corpus puriore parte optimi sanguinis  
& spiritus fraudatur, accedente quin etiam  
voluptate, quæ vel sola idonea est ad vi-  
tales vires dissoluendas, ut nonnulli iam ni-  
mia voluptate affecti interierint: speciatim  
verò mirum esse non debet, si tale semen  
non satis coctum & generationi idoneum  
reddatur. Quantum autem immoderatus  
concubitus animalibus perniciosus, satis de-  
monstrat Philosophus de long. & breu. vi-  
tæ c. 2. ubi ait: animalia salacia, & quæ  
semine redundant, citissimè senescere, atq;  
propterea mulum ex equo & asino procrea-  
tum longius vivere. Et fœminas etiam ma-  
ribus diutius posse vivere, si mares salaces  
fuerint



fuerint. Atq; hinc, vt puto, vt semen sit co-  
 ctum & generationi idoneum, Varro lib. 6. de  
 re rustica c. 5. & alij auctores rustici præ-  
 cipiunt, arietes & tauros admissarios du-  
 os menses ante admissuram ab omni concu-  
 bitu arcendos, vt ita semen fecundum fiat.  
 Et si quis obijciat Herculem, quem Pausa-  
 nias scribit & Diodorus Siculus lib. 5. bi-  
 blioth. cum quinquaginta fœminis vna no-  
 cte coijisse & omnes grauidas reddidisse  
 atq; ex ijs quinquaginta filios mares genu-  
 isse, & quidem geminos, natu maximum &  
 minimum, id tanquam prorsus fabulosum  
 aut monstrosum habendum est. Et si Athe-  
 neas lib. 13. Auctore Herodoto scribit:  
 Herculem 7. diebus 50. virgines compres-  
 sisse. Ad hunc modum homines in victu, po-  
 tissimum in vino delinquentes, vt in ebrio-  
 sis, semen inutile magna ex parte reddunt,  
 sicut Galenus ex Platone demonstrat l. quod  
 animi mores corporis, &c. Quare summa  
 cum ratione Hipp. in lib. de superfœtatione  
 atq; illius imitatione Plat. l. 2. & 6. de Le-  
 gibus & Plut. in lib. de educandis liberis



in principio iubet, eos debere, qui liberis procreandis operā daturi sunt à vino prorsus abstinere, aut minimo sumpto ad venere[m] accedere. Hæc duo exempla immoderati scilicet concubitus & ebrietatis, de externis causis sterilitatis sufficiant, quarum imitatione est facile reliquas eius generis causas afferre. Sed præter cæteras causas viri Hipp. 11. de aere aquis & locis, qui querens, quam ob causam plurimi ferè Eunuchinascantur, ac muliebria officia ducant, qui aliter effœminati dicuntur, & eorum opinionem irridet, qui huius rei causam in Deum referebant, respondet id fieri ob importunas eorum equitationes. Cum .n. propendentibus semper eorū cruribus ex equis diuturnis doloribus corripere[n]tur, ac deinde claudifient contractis coxis, cum morbus inualuerit, tale remedium sibi adhibebant, ut à principio morbi utramq[ue] venam retrò aures inciderent. Et ait Hipp. ea medicatione videntur mihi se ipsos perdere. Venæ enim retrò aures sunt, quas si quis incidat, sterilitatem inferunt illis, quibus



bus secantur. Cuius quidem rei facilis est ratio, cum idem Hipp. vel vt magis placeat Galeno in l. de genitura doceat, semen ex omni parte corporis, potiss: cerebro post aures in spinalem medullam profluere. Nec non Aristoteles 2. de gen. animal. 7. naturam geniturae cerebro similem esse confirmat. Plat. in Timæo ad finem, semen veluti à cista medullaria procerni, & de spina ad propria vasa deriuari, adeò vñ non ineptè quidam semen cerebri stimulum appellarit. Hinc admodum probabilis est sententia venis post aures seminis transmissionem impediri, & illud vel nulli ratione, vel erudum ad inferiores pares descendere. Iam de causis sterilitatis ex parte mulieris. Etsi mulieres multas de causis steriles In mulieribus.  
fiat, ac quod ad internas ac maximè principales, omnes eae vel ad partes pudendas, vel ad semen, aut sanguinem menstruum referri possunt. De externis postremo loco. Igitur Hipp. de acili & difficili mulierum conceptu hac habet ad finem: Porro ex mulieribus, quae facile aut difficile concipiant

ita



ita considerant, facere oportet (inquit) pri-  
 mum quidem considerationem specierum.  
 Paruae enim mulieres ad concipiendum prae-  
 stantiores sunt maioribus, tenues crassis, al-  
 ba rubicundis, nigrae liuidis, quae venas con-  
 spicuas habent meliores sunt alijs, carnem  
 autem vberiore habere malum est, mam-  
 mas autem tumidas & magnas bonum. Ve-  
 rum interrogare etiam oportet de menstru-  
 is purgationibus, an omnibus mensibus  
 compereant, satis magna copia & colore  
 bono, an sint etiam aequales singulis mensi-  
 bus, temporibus ac diebus statutis. Sic enim  
 purgatione fieri oportet. Locum verò in  
 quo fit conceptio sanum esse oportet, & sic-  
 cum & mollem, sitq; uterus non retractus,  
 non pronus, os non sit auersum neq; conclu-  
 sum, neq; euersum, &c. Hic certè Hipp.  
 omnia vel certè necessaria ad hanc rem  
 complexus est. Ne magis distinctè rem  
 consideremus. Primum igitur sunt puden-  
 da & uterus, quae partes vel natura, vel  
 prater naturam coalescunt & clauduntur,  
 ex quo huiusmodi mulieres imperforatae &

cuncti



cuntur. Philosophus 4. gen. animal: 4. ad fin. iam nonnullis fœminis os vteri compressum ab ineunte ætate vsq; ad tempus menstruum perseuerauit, mox vrgentibus mensuris dolore infestante, alijs sponte disruptum est, alijs dissectum à medicis, nonnullæ interierunt, cum aut per vim dirumperetur aut dirumpi non posset. Hic affectus Auic: & alijs dicitur Clausura Fen. 21. lib. 3. tract. 4. cap. 1. Verum Moschio græcus harmon: part. post. c. 15. & Aëtius lib. vlt. c. 69. præ cæteris distinctè rem tractat, qui scribit mulieres effici clausas trib. modis 1. Si alæ vel labia pudendi inter se cohæreant. 2. Si patentibus labijs in medio sinu muliebri membrana quædam innascatur. quæ viam & transitum impediat. 3. Si patentibus labijs & sinu os vteri prorsus claudatur, quæ quidem tres clausuræ impediunt mulieres: Prima ad tria officia, virorum vsum, purgationem, & conceptum, Secunda ad duos communicationem viri & conceptum, Tertia etiam ad duos: ad conceptionem & purgationem.



gationem. Exemplum apud Anton. Beniuenum c. 28. de abditis puella nubilis, quæ sanata est. Alterum cuius etiam meminit Ambrosius Paræus lib. de gen. c. 43. mulieris quæ credita est utero gerere ob tumorem & etiam facta sectione curata est, profluente sanguine concreto nigro ad 8. libr. Huc pertinet consideratio membranæ, quæ huiusmodi dicitur, de qua inter anatomicos non conuenit, nec non, an membranæ integritate vel læsione liceat de virginitate arguere. Hic ergo meum iudicium non interponam. Sed tamen id nequeo silentio præterire, apud Suidam reperiri historiam notatione & admiratione dignam cuiusdam Theodosij Hebræi de Christi sacerdotio ac diuino ex Beata ortum, qui post longam narrationem confirmat, sacerdotes Hebræos fidelibus obstetricibus mandasse, ut accuratè perquirerent & explorarent, an adhuc verè virgo esset Maria, quæ ipsis rebus certè edocta, virginem eam esse affirmârunt. Quod quidem humana ratione vix aliter conceptum videtur fieri posse, quam testimo-



estimonio huius membrana, quàm obstetri-  
 ces integram & incorruptam inuenerunt.  
 æterum ad rem. Inter omnes causas steri-  
 litatis mulieris ex parte instrumentorum,  
 tertium est principem locum obtinere uter-  
 um. Cum enim ille sit tanquam ager, in  
 quem semina sparguntur, nisi hæc pars &  
 ad concipiendum & retinendum semen sit  
 bene disposita, omnis ratio colligit, nulla ra-  
 tione conceptum fieri posse. Cum ergo.  
 uterus omni morborum genere laborare  
 possit, statuendum, quemlibet illius affe-  
 ctum præter naturam posse sterilitatem in-  
 ducere. Inter quos primum occurrunt mor-  
 bi ex intemperie. Hipp. 5. aph. 62. Quæ  
 est grauißima sententia Galen. in comment.  
 estatur Hipp. omnes intemperies comple-  
 tum esse, simplices & compositas. Vnde mu-  
 lieres denso & frigido utero nequeunt con-  
 cipere, quod frigiditas calorem seminis ex-  
 inguit, vel imminuit. In huiusmodi mu-  
 lieribus licet addere venarum uteri angu-  
 stiam, ac sanguinis menstrui frigiditatem,  
 quod utrumq; magis fecunditatem potest  
 impedi-



impedire. Deinde quaecunq; præhumidos habent uteros non concipiunt, quod propter immodicam laxitatem lubrici reddantur, de qua Philosophus lib. 7. histor. animal. 2. Semen viri in utero humidior, perinde ut semina cerealia in palustri & aquosa terra, obruitur & inundatur. Tertio, quaecunq; siccos uteros habent non concipiunt, quod ex defectu alimenti semen corrumpitur, ut semina alia projecta in terram arenosam & petrosam. Quarto, quæ habent uteros valde calidos & adurentes non concipiunt, siquidem ut in æstate semina terræ commissa pereunt. Præterquam enim quod huiusmodi calor immoderatus uniuersum corporis habitum depascitur, quò hæ mulieres nulla aut paucissima habent menstrua, è quibus earum fœtus neq; viuere neq; foueri possunt. Huiusmodi mulieres ab Aristotele 2. gen. animal. 7. appellantur viragines, quæ aliquando barbatae sunt, omnem sanguinem calore dissipante. Et hæc compositis intemperiebus facile possunt accommodari. Verum illud quoq; sciendum, intemperies



peries vteri non solum simplices, sed etiā, ac  
 fortè magis cū materia, qualiscunq, tandē  
 illa fuerit, posse sterilitatem afferre, quales  
 sunt tumores præter naturam, phlegmone,  
 Erysipelas, herpes, œdema, scirrhus, &c.  
 item mola, calculus, lumbrici, flatus, aqua,  
 his si non inchoari, saltem non perfici posse  
 fatum certum est. Secundo sunt morbi in  
 mala compositione, qui etsi quidem plures  
 esse possent in magnitudine, figura, cavi-  
 te, superficie, tamen præ cæteris est mor-  
 bus ex situ malo causa sterilitatis. De mo-  
 tione vteri ex sua sede non conuenit inter  
 omnes. Gal. l. 6. l. aff. ad finem scribit non-  
 nullos vterum animal putasse generandi a-  
 uidum, agrè ferens moram eorum, quæ con-  
 cupiscit, indeq, aberrare per corpus, mea-  
 tus spiritus intercludendo & noxam toti  
 corpori inferendo, vt erat Plato in Timæo,  
 qui vterum humectari cupientem, ad se-  
 ptum transcendere voluit, id quod Galenus  
 refutat, docendo ob nullam aliam causam  
 vterum moueri ad latera vel sursum, quā  
 P pro-



propter extensionem. Extendi autem quod  
 appendiculæ eius ac vincula ac vasa nimis  
 replentur, quæ repletio fit ob menstruorum  
 retentionem: Siquidem perueniens sanguis  
 ad uterum vsq; per, vasa ad interna uteri  
 non potest ingredi, vel quod sanguis sit  
 crassus, vel quod ora vasorum sint obstru-  
 ctæ. Hinc sanguis hoc modo multiplicatus  
 in vasis illa extendit, proxima vincula ir-  
 rigat ac madefacit, unde uterus continuo  
 retrahitur & peruertitur. Quod si extensa  
 vasa & vincula aequaliter trahantur, tunc  
 uteri transmutatio recta erit, & in neutram  
 partem inclinabit. Sin contrâ, ad eam par-  
 tem quæ magis trahit, uterus extendetur.  
 Et hæc est Galeni sententia etiam Com.  
 3. de articulis 100. præclare exposita. Et  
 hæc etiam cum Anatomica disciplina con-  
 sentiunt. Admirandum est, quid in men-  
 tem venerit Fernelio, qui præter Galeni  
 doctrinam & rerum euidenciam non est  
 veritus Plat. & aliorum sententiam pro-  
 bare 6. de part. morb. & sym. 16. se ali-  
 quando



quando motum auctoritate Galeni vterum  
 nihil aut exiguum moueri, At ægrotarum  
 mulierum modò quærimonia modò preci-  
 bus adductum sæpè tactu deprehendisse, in-  
 star globi in ventriculum efferri, eumq; gra-  
 uiter opprimere, ex quo loco sæpe manu de-  
 pressus est, manifestoq; in propriam sedem  
 repulsus. Mirum cur non Fernelius fatea-  
 tur vterum quoq; fauces, aliquando caput  
 ipsum petere consueuisse, quod idem mulie-  
 res frequenter prædicant. Addit Fernelius:  
 istud non magis alienum videri, quàm pro-  
 lapsum vteri, quo vterus totus procidit, qui  
 deinceps inquirens causam huiusmodi mo-  
 tionis vterinæ, inquit: Eam non aliam  
 esse, quàm irritationem quandam propter  
 quam ille sursum & deorsum, aut in alteru-  
 trum latus se contorqueat. Hanc autem  
 irritationem fieri, aut rei præter naturam  
 quam continet in se, aut internæ eiusq; ad-  
 uersa molestia, ex quo fiat, ut cum vterus  
 laceßitus & quasi irritatus de proprio loco  
 discedat, aliàs in aliam partem oberrans,  
 ut quod illi infensum inimicumq; fugiat,



quod verò iucundum ac blandum sequatur. Qui demum non parùm miratur Galenum contra Platonem censuisse vterum nihil aut perexiguum moueri, idq; non per se sed per accidens à vinctulis & appendicibus quibus annectitur, &c. Quæ si quis consideret, intelliget illum nihil docere. Ceterum sicut diximus cum Galeno vterum ad superiores partes non moueri posse, ita altera ex parte certum est, vterum ad inferiores partes frequenter decedere, cum totus aliquando ad pudendū, vel extrà egrediatur, quod sensibus fit manifestissimum. Cause verò huius symptom. plures possunt asferri internæ & externæ, quæcunq; ligamenta vteri possunt laxare & disrumpere. Sic igitur externa vociferatio, insignis tussis, violenta sternutamenta, & frequentia cursus, saltus, casus, ponderis leuatio, percussio immoderata, venus & potiss: in ipsa purgatione puerperij, vel paulò post purgationem improvisi tristes nuncij, &c. Sic interna nimia vasorum vteri relaxatio & humiditas, resolutio, apostema, corruptio,



ptio, difficilis abortus, fœtus nimium grandis & grauis, violentus partus, importuna & violenta detractio fœtus & secundinarũ, immoderate suppressiones menſtuorũ, purgatio copioſa, aqua in vtero collecta, magna mola, magnus lapis, &c. Sed Philoſophus præter omnes vnã commemorat 7. hiſtor. animal. 2. Quem locum video neminem aduertiffe, qui ſcribit multis mulieribus vterum deſcendere deſiderio coitus vel iuuenilis ætatis ratione, vel quod multo tempore à coitu abſtinuerunt, quæ quidem cauſa admodum probabilis eſt, & facile ad ſuperiores poteſt referri. Ad hunc locum de morbis vteri in compoſitione videtur poſſe referri vteri defectus. Et ſi enim quod à Philoſopho traditum eſt 1. hiſtor. animal. 13. Vterus eſt pars propria, indiuiduo nulli poteſt deeſſe, tamen teſtantur Paul. 3. c. 72. & 6. c. 88. & Aetius lib. 16. c. 76. nonnullis mulieribus vteros ſine vllò vitæ periculo exciſos fuiſſe, quod nonnulli recentiores quoq; confirmant de qua re videatur Franciſcus Ronſetus de,



partu Caesareo, 2. Tom. gynec. s. Tertio  
demum loco, morbi insoluta unitate sine du-  
bio sterilitatem introducunt, ut vulnera,  
ulcera, contusiones, rhagades, fistulae, ero-  
siones uteri, quae Gal. 6. l. aff. ad finem  
magna ex parte in ceruice solent continge-  
re, multasque continet differentias, ut pru-  
ritus uteri, &c. Nunc quae ad semen &  
sanguinem. De semine tanquam causa ste-  
rilitatis longius agendum non est, quan-  
doque illud in foeminis vel nullum aut parci-  
us vel vitiosum & ad conceptum ineptum  
gignitur, quod supra explicatum est. Ce-  
terum inter alia quae mulieribus sterilita-  
tem aut foecunditatem possunt afferre sunt  
menses, quae principem locum tenent in co-  
pia, ordine, qualitate & tempore, siquidem  
quae in his praeter naturam se habent mulie-  
res, omnes propemodum steriles fieri necesse  
est. De his in principio huius tractatus  
dictum est. Ad alia, Quo ad causas ex-  
ternas sterilitatis utriusque communes plurimae  
sunt, ut aetas, quae vel prouecta vel tenera  
ad conceptum inepta est. Leges quidem  
viro



viro 14um, fœminæ 12um, coeundi terminum statuunt. Quod si quis cupiat intelligere, cur fœminis citius quàm masculis venia ad nuptias detur: Respondet Macrobius in Som. Scipionis 6. fœminas propter festinationem votorum maturius liberari liberis. Sed fortè altera verior causa naturalis reddi potest, nempe mulieres citius pubescere & geniales fieri, quod sint viris natura infirmiores, siquidẽ scribit lib. 7. satur. 7. exilia poma & ad breue tempus durantia citius matura fiunt, robusta & durabilia serius. Ac generaliter quod Theoph. 4. caus. plant. 9. & 11. quæ infirmiora sunt, ea facilius ac celerius perficiuntur. Vnde prouerbium: Citò nata citò pereunt. Nec sanè hoc latuit Philosophũ lib. 4. gen. animal. 7. & pubes & vigor & senectus fœminis prius venit, quàm maribus, sunt enim fœminæ sua natura debiliores & frigidiore, & sexum fœmineum, quasi læsionem & detrimentum esse. Etsi verò hic est communis omnium consensus, mulierem anno 12. & marẽ 14. geniales fieri, Veruntamen

P 4



tamen fortè magis probandam Philosophi  
 opinionem censeo, qui plurima & grauissi-  
 ma de hac re tradit praecepta, quae digna  
 sunt ut ab omnib<sup>9</sup> legantur lib. 6. de rep. 16.  
 Sed quod ad rem nostram, illud est certum,  
 generationis terminum ac finem defini-  
 tum fuisse viris quidem ad summum an-  
 num 70. foeminis verò 50. Verùm id rarò,  
 Paucis n. contingit, sed magna ex parte  
 maribus 65. finis generandi est, & fæmi-  
 nis 45. Et 5. histor. animal 4. In quo eodẽ  
 loco ille scribit viros principium facere fe-  
 rendi seminis circa annos bis 7. Sed tamen  
 illud vim genitalem suscipere circa annum  
 21. Ex quo puto factum esse ut l. l. latores,  
 qui congruum nuptiarum tempus constitu-  
 unt puellae quidem à 16. vsq<sup>3</sup> ad 20. viro  
 autem à 30. vsq<sup>3</sup> ad 35. circiter. Plut. in  
 Apologet. nec non in vita Lycurgi. Plato  
 4. & 6. ll. Aristoteles polit. 7. c. 16. Itaq<sup>3</sup>  
 ætas in fœmina ante annum 12. & post an-  
 num 45. vel ad summum 50. In mare an-  
 te 14. & post 65. vel 70. minimè est ad  
 conceptionem accommodata. Neq<sup>3</sup> hoc tem-

P 5

pore



pote vir & mulier steriles censendi sunt.  
 Quod si quis obijciat, nonnullos viros ante  
 & post huiusmodi ætatis terminum gene-  
 rasse, vt sunt historiae apud Sauanarolam  
 de puella 9. annorum, apud Gregorium de  
 puero 9. annorum, qui suam nutricem gra-  
 uidam reddidit. Et apud D. Hieronym.  
 qui etiam vix annum 10. agens, nutricem  
 compresserit & inpregnauerit. Et apud Va-  
 lescum de Taranta de vetula, quæ post an-  
 nos 60. filios tres peperit, & 7. dum vltimum  
 gigneret. Et Plin: Val. Max. & alios de  
 quibusdam viris, qui post annum 80. fili-  
 os generarunt. Si quis ita obijciat, is sciat  
 hæc tanquam mirabilia atq; planè prodi-  
 giosis similia, scriptis mandata, de quibus,  
 vt ratis, non liceat aliquam certam ratio-  
 nem colligere, & naturæ institutum per-  
 uertere. Habitus corporis tam maris  
 quàm fœminæ si fuerit carnosior & pinguior  
 sterilitatem vtriq; solet inferre. Idq; pro-  
 pter duas causas potissimum: Altera, quod  
 caro, adeps, &c. nimia mole sit impedimen-  
 to, quo minus genitalia vtriusq; possint con-  
 iungi.



iungi. Altera, quod quo plus sanguinis & humorum in carnem & pinguedinem conuertitur, tanto minus de semine & sanguine menstruo restabit. Causae traditae sunt à Philosopho 2. part. animal. 5. & Hipp. 5. aph. 16. quae sententia repetitur lib. de aëre aquis & locis c. 10. Sed nihil est, quin eadem sententia ad viros quoque possit accommodari. Supra iam diximus viros vel nimis coeuntes vel crapulis deditos steriles reddi, id quod ad mulieres quoque referri posse sentio. Et quod ad coitum, certum esse debet, mulieres, quo frequentiores coeant, eò esse steriliores, quod speciatim notauit Philosophus 6. hist. animal. 23. de asinis, qui scribit, si haec animalia frequenter coeant, neque interposito tempore quiescant, foeminae breui sterilem fieri. Ex quo fit inquit, ut qui curam huic rei adhibeant tempus interponant, quod quidem meretrices satis possunt confirmare, quae propter hanc vnam causam vel raro vel nunquam concipiunt. Huius rei multiplices causae reddi possunt, ut redduntur ab auctore lib. de histor.



*storia Philosophica, qui sub nomine Galeni circumfertur, vel potius à Plut. cuius verè hic liber est censendus, qui lib. 6. de plac. philosophorum c. 9. scribit hoc modo. Diocles medicus sæpè concumbentes mulieres rarò concipere iudicat, vel quia semen non emittant, vel quia minus quàm conueniat, vel quia tale ut in eo vis prolifica non sit, vel quia caloris, frigoris, humiditatis, siccitatis plus minusue quàm par sit, habeant, vel quia uterus resolutus semen non contineat. Quatenus autem ad crapulam & ebrietatem pertinet, nulli dubium esse debet, quin idem de viris & mulieribus statuendum sit. Cum pares omnino rationes in utrisq; facillè idem possint demonstrare. Vnde Plat. lib. 2. ll. postremis verbis. Mulieri aut viro nocte liberis operam daturis minimè permittit, ut bibant vinum: quam quidem Platonis sententiam Galenus refert ac probat (quod animi mores seq.) Imò verò idem Plato de hac ipsa re admodum præclara ac diuina tradit præcepta. Atq; hinc fortè factum est, ut tradunt historie, quod*

*Roma*



Romana fuerint abstemia, quæ alioqui fuerunt fecundissima, ac filios fortissimos pepererunt. Quantum spectat ad causas sterilitatis utriusque communes, mihi videretur unico loco omnia posse comprehendere, qui est, si vir & femina inter se dissentiant. In qua causa sola, Stoici inquirentes causas sterilitatis, acquiescebant l. de historia Philosophica, aut verius in Plut. Placit. Phil. 1 3. quæ quidem dissensio multis modis potest contingere. Nos vno aut altero e.g. contenti erimus. Possunt igitur discordes fieri vir & mulier, primum corpore, si alter sit pusillus alter grandior fuerit, qua ratione genitalia instrumenta nullo modo possunt bene coherere. Deinde si incongruam intemperiem nacti fuerint. Nam sicut præclare docet Galenus s. aph. 26. quanquam immodi & imperaturæ omnimodæ sterilitatis sunt causæ, tamen si eadem fuerint moderatæ & contrarijs iungantur, tunc grauida fiunt mulieres. Si verò cum similibus copulentur, tunc non concipiunt, siquidem fieri non potest, ut semen frigidius in frigidioris utero fecundetur, neq. siccius in siccio-



sicciorē. Quod idem de cæteris statuen-  
dum est, sed indiget, semen quidem frigi-  
dius vtero tantò calidiorē, quantò deficit  
ab optima temperatura, ac humidius siccio-  
re eodem modo. Secundò possunt discordes  
fieri animo & moribus, potissimum verò a-  
more & odio, quantum enim perturbatio-  
nes valeant in nobis, ac præ cæteris amor &  
odium tanquam duo Tyranni in nostras  
animas & corpora, non est necesse demon-  
strare. Ex quo iure scriptum reliquit Aë-  
tius lib. vlt. c. 26. inuitos coitus inanes  
esse, Contra verò amorem genituram con-  
ciliare. Itaq; ijs & alijs multis rationibus  
viri & mulieres inter se possunt dissentire, ac  
propterea steriles fieri. Cuius discrepantiæ  
vim Aristoteles quoq; non solum benè nouit,  
sed etiam amplificauit, qui docet huius mo-  
di dissidium contingere, non solum ratione  
varietatis corporis ætatis, & rerum si-  
milium : Sed etiam ratione diuer-  
si aeris, regionis, victus rationis. Ex  
quibus verisimile est & necessarium, no-  
stra corpora variè disponi. Nec verò id so-  
lum facere generaliter ad fecunditatem &  
steri-



sterilitatem, sed etiam speciatim ad procreationem maris & feminae, qui scribit 4. gen. animal. 2. Multis tunc maribus tunc feminis euenit, ut coniuncti inter se nequeant generare, disiuncti queant. Atque hinc factum est ut obstetrices in eo potissimum ponerent, ut viri & mulieres minimè dispares copularentur. Cuius quidem memorabilis instituti praeclare meminit Plato in Theetato in principio, repetit Galenus s. aph. 25. 69. Caterum ut hanc partem de causis sterilitatis finiamus, illud reliquum est adiungere, quando nonnulli quibusdam maleficijs & magicis incantamentis steriles fiunt, quod varijs experimentis probari potest. Inter cetera impedimenta quae possunt matrimonium dissolvere, maleficium nominatur, si illud tres annos perseueret ut declarat D. Thom. in suppl. partis quaestio 58. art. 2. sed quoniam huiusmodi incantationes & maleficia non sunt medicae contemplationis, nec fortè naturalibus praesidijs, sed tantum sacris ministerijs tolluntur, praetermittamus. Igitur ad utiliora. Restat



Restat ut post causas signa, demum curationem aggrediamur. Verum quoniam apud antiquos licebat, ut testatur Galenus s. aph. 59. & hoc tempore apud quasdam nationes licet propter hanc præcipuè causam vel rationem, viri vel mulieris diuortium facere, de quo apud Plato. l. 6. ll. ad finem, ut notat Plut. in quæstionibus centuriatis: Romanis nuptiæ coram pontifice dirimebantur, qui multa horrenda monstrosa & dira peragebant, propterea quod omnes faciunt, ante omnia proponenda sunt signa, quæ in vniuersum tam viri, quàm mulieris fœcunditatem & infœcunditatem declarant, de quibus Aristoteles diffusè 2. gen. animal. 7. Ac primum quidem licet de probò ac improbo, fœcundo ac infœcundo viri semine iudicium facere, docet id experimento in aqua probare hoc modo: Quod enim semen tenue ac frigidum est, diffusum cito per summa innatare, Quod verò fœcundum est in imum descendit. Calidum enim quod concoctum est, concoctum autem quod spissum crassumq̃. Quam ferè eandem sen-

Signa fœ-  
cund & in-  
fœcund.



sententiam ille repetit 4. gen. animal. c. 1.  
7. hist. animal. 1. Quæ quidem probandi  
seminis ratio turpis fortè & parùm efficax  
& contra veritatem nonnullis videtur, qui  
honestiore & certiore ratione existimant se-  
men fore vel fecundius vel minus pro va-  
ria temperie ac dispositione totius corporis,  
vel partium principalium. Ex quibus cer-  
tum est in doctrina Galeni illud originem  
habere. Etsi non ignoro Aristotelem aliter  
sentire 1. gen. animal. 17. 18. Deinde ve-  
rò quatenus pertinet ad probationem mu-  
lierum Aristoteles docet, id fieri dupliciter,  
Vno modo per suffitum, si odores subeuntes  
uterum efferantur ad locum spirandi & ef-  
ficient halitum. Altero per linimentum, si  
colores oculis impositi oris salivam persi-  
ciant.

Primus modus Philop. interprete erat  
huiusmodi, Antiqui spongiam vel lanam,  
vel linteum velamen, vel quid simile aquæ  
rosarum, siue alio grati vel ingrati humo-  
re odoris madefactum, quasi quodam sup-  
positorio fœminarum genitalibus impone-  
bant.



bant. Quod si odor per meatus pectoris ad  
 narium respirationem ascendisset, eas sta-  
 tuebant fœcundas, qui volebant tunc mea-  
 tus esse apertos, per quos à partibus superio-  
 ribus ad vterum prolifica mēstrua solent  
 descendere. Si verò huiusmodi odores ad  
 spirandi loca non ascenderent, tunc statue-  
 runt fœcunditate carere illas, eo quod aut  
 mēstrua ad vterum non possent descende-  
 re, vel saltem non quanta & qualia debe-  
 rent. Aristoteles, ni fallor, hanc rationē ex  
 Hipp. accepit s. aph: 56. Si mulier non con-  
 cipit, &c. Quod quidem documentum nulli  
 dubium est, quin accuratius ab Hipp. quàm  
 Aristotele traditum sit, neq; vt cetera prae-  
 termittantur, nisi Hipp. cautionem adhi-  
 beas, nempe, vt mulier omni ex parte vesti-  
 bus muniatur, aliàs fallax esset. Illud au-  
 tem sciendum, hoc praeceptum Hipp. vt fa-  
 cilimum, ita verissimum esse: meq; illud non  
 semel ad vsum reuocasse, qui possum verè  
 testari factò periculo, me quibusdam mulie-  
 ribus sterilibus nullum prorsus odorem ad  
 nares ascendere obseruasse. Fœcundas verò

Q

quàm



quam maximè odorem sensisse, adeò ut ex nimia euaporatione illæ sibi viderentur suffocari. Galen. in Com. docet qualia suffimenta esse debeant. Re. Myrrhae ꝯ Benzoi, Styrac. calam. ana ꝯ olei de spic. q. s. misce, fiat Trochis: ponatur supra instrumentum angusto orificio, quod collum uteri ingrediatur, substrato calido cinere.

Alter modus explorandarum mulierum eodem Philop. interprete erat huiusmodi: ut mulier desponsanda palpebris & supercilijs nonnullis coloribus liniretur (quibus feminae corpora ad questum prostitute vtebantur) quo factò, si saliuam oris inficerent, statuebant fecundam esse, qui opinabantur omnes meatus corporis conclusos & impeditos esse, si non inficeretur lingua, atq; sic sanguinem menstruorum ad uterum etiam prouenire non posse. Aristoteles verò probat ea ratione, quod inter omnes partes capitis sedes oculorum sit maximè seminalis, quod ex eo probat, quod sola ea per coitum manifestè immutetur, & usu immodico rei veneræ oculi apertè langueant & substi-



subsideant, quod communi hominum opinio-  
 oni videtur consentire, qui nullo euidentio-  
 ri argumento colligunt hominem concubu-  
 isse, quàm si oculos depressos & languidos  
 habeat. Et si verò hæc posterior ratio co-  
 gnoscendæ fecunditatis aut sterilitatis,  
 quam ego apud neminem, excepto Aristo-  
 tele, me legisse memini, videtur probabilis  
 & ingeniosa: tamen si diligentius confide-  
 retur, ea fortè neq, admodum firma, neq,  
 rationi consentiens fuerit. Quamuis enim  
 colores palpebris & supercilijs adhibiti lin-  
 guam & saliuam oris possint inficere, non  
 satis tamen intelligo, quomodo hinc liceat  
 colligere, ceteros omnes meatus corporis es-  
 se adeò patentes & dispositos, ut possint per  
 ipsos semen & sanguis menstruus ad vasa  
 vteri & ad ipsum vterum peruenire,  
 siquidem constat viam ab oculis ad linguam  
 satis apertam, finitimã & breuem esse: Al-  
 teram autem ad vterũ, angustiolem, lon-  
 giorẽ, difficiliorẽ. Præter signa iam  
 posita solent alia multa medici afferre, ex  
 quibus volunt futuram sterilitatem aut

Q 2

fecun-



fecunditatem praedicere, qualia nonnulla  
 reperiuntur apud Hipp. l. de sterilibus a  
 princip. nec non apud Ras. 22. cont. Tr.  
 56. c. 1. & fortasse apud alios, de quibus  
 docet Auic. meritò, quod in illis veritas  
 non verificatur, cum reuera maiori ex par-  
 te sint vel incerta, vel potius ridenda &  
 fabulosa, ut vel ex hoc vno loco pro com-  
 perto habendum sit, eum lib. de sterilitate  
 falso Hipp. attributum. Quare iam signa  
 singularum causarum quam breuiss: consi-  
 deremus. Vitium penis in viro vel longio-  
 ris vel breuioris, vel distorti, vel cum ali-  
 inperforati aut angustioris, quàm ut semen  
 liberè in vterum possit transmitti, pariter  
 membrum virile non possit erigi, haec omnia  
 sensibus fiunt manifesta: pariter vitia te-  
 stium in mala compositione, in soluta vni-  
 tate omnibus perspicua. Morbi autem in  
 intemperie vel simplici vel composita laten-  
 quidem, sed varijs rationibus facile pos-  
 sunt intelligi. De quibus omnibus satis tra-  
 ctant. Sed videatur Galenus in arte med.  
 c. 45. & in seq. Postremò vitium seminis ve-  
 defici-



deficientis vel vitiosi, sine multo labore potest intelligi ex præcedentibus morbis, ex præcedente victus ratione, sed præcipue ex improba intemperie partium principalium, cerebri, cordis, ventriculi, testium ac vasorum seminalium. Ex quibus facile potest intelligi, utrum fiant concoctiones nec ne, an aptum vel ineptum sit. Cause demum externæ, ex nimio coitu, ex deprauata ratione victus, & similibus, referente ægroto fiunt manifestiss: ut alijs signis non sit opus. Quare statim venio ad signa sterilitatis muliebris. Neq; enim est ut aliquid de venis post aures sectis dicatur, cum illæ non secantur, Itaq; si mulieres sint imperforatæ in quacunq; parte id fiat, præterquã quod huiusmodi vitium visu & tactu potest deprehendi, evidentissimo quoq; argumento potest probari, quod virile concubitum nequeant perferre. Sed rara. Intemperies uteri simplex & composita, & alia latentia, partim ex signis totius communibus, partim ex proprijs. Calidiorem igitur uterum demonstrant generaliter promptitudo



ad venerem, actiones celeres, iracundia, audacia, sitis, venæ amplæ, pulsus magnus, celer, lotia flava & similia: speciatim caliditas in imo ventre, menstrua pauca, crassa, biliosa, aut ex adustione nigricantia, cum dolore & acrimonia, & quandoq; mor-  
su ulcerante, inordinata, intempestiva se-  
minis excretio, quodq; & à muliere, & à vi-  
ro calidius & mordacius percipitur, adeò  
ut genitalia exulcerentur, pili in pectore &  
cruribus citò nati, multi, crassi, flavi, &c.  
Vteri frigidioris indicia communia & pro-  
pria sunt, pigritia, timor, venæ exiles, pul-  
sus parvi, menses aut suppressi aut rari, tar-  
di, crudi, albicantes, multum veneris de-  
siderium, & vno verbo, superioribus con-  
traria. Porro humidum uterum signat,  
totius corporis habitus mollior, nulla sitis,  
venus languida, menstrua tenuia, aquosa,  
alba, fluxus muliebres, aut saltē perpetua  
humiditas pudendi, in coitu viro etiam mo-  
lesta, vteri facultas retentrix admodum  
imbecilla, ut mulieres fœtum paulò gran-  
diorem nequeant perferre, facile abortiant.  
Hipp.



Hipp. 5. aph. 45. Gal. 6. loco aff. 5. Por-  
 fremò vteri sicciore indicia sunt corporis  
 tenuitas, durities, facilis ira, sitis, pauci-  
 menses, rari, pudenda sicca, mulieres coi-  
 tum appetunt, vt terra sicca rorem, &c.  
 Ex quibus sine negotio compositæ intempe-  
 ries intelligi possunt. Idem planè de testium  
 muliebrium ac reliquorum vasorum ad v-  
 terum pertinentium statuendum est, siqui-  
 dem propter vicinitatem & propter eosdem  
 vsus, necnon propter alias causas fit, vt  
 omnia hæc membra vnā ferè intemperie  
 habeant, ratione causæ. Quatenus autem  
 pertinet ad signa intemperierum cum ma-  
 teria, quas ego quidem interpretor tumo-  
 res præter naturam, inflammationes, ery-  
 sipelata, &c. De quibus sæpè diximus, non  
 est vt de ijs quicquam dicamus, siquidem  
 huiusmodi inquisitio ad alium locum, nem-  
 pe ad propriam horum morborum tracta-  
 tionem pertinet. Signa procidentia vte-  
 ri satis manifesta sunt. Sequitur dolor par-  
 tium, quibus connectitur, vt ossis sacri, &  
 similium tumor ac grauitas percipitur in



ima abdominis parte, & si fuerit insignis  
procidentia, quid rotundum forma oui  
inane, viri impedito transitu non possunt  
concumbere. His signis nonnulli addunt  
ex Auic. lotij & alui excretionem, quod  
collum vesicæ & rectum intestinum à tumo-  
re vteri, adeò comprimantur, ut neq; lotia,  
neq; excrementa quoquo modo possint exire.  
Alij præterea docent febrim quoq; tremorẽ  
conuulsionem, & alia grauiora symptoma-  
ta superuenire. Sed ego in nulla prociden-  
tia possum testari me hæc obseruasse, ut al-  
ui & vesicæ excrementa fuissent retenta,  
aut tale quid superuenisse, ut verissimum  
sit, quod ego soleo frequenter animaduerte-  
re, plurimos in hac arte plurima asserre &  
affirmare, quæ illi potius ex aliorum scri-  
ptis, quàm sua obseruatione haberent. Re-  
stat ut de solutione vnitatis vteri dicamus,  
& de vlcerum, vulnerum, & contusionum  
signis. Sed hæc alterius loci. Postremò autem  
ut hanc partem finiamus, restarent signa  
quibus vitia sanguinis & seminis demon-  
strentur. Sed quantum ad semen, cum su-  
pra



praestitutum sit ex Hipp. & Galeno illud  
 ex toto corpore, & maximè principalibus  
 partibus originem habere, hac via licet  
 qualitates seminis cognoscere, si considere-  
 mus temperiem & constitutionem partium  
 corporis vniuersi, vt de semine virilidictum  
 est. Quo ad sanguinem menstruum, de hoc  
 superiori anno dictum est. Causæ etiam  
 cōmunes externæ utriq; sexui, vt sunt ha-  
 bitus, virtus, ætas, discrepantia corporum,  
 consensus, perturbationes animi, & alia id  
 genus signa, vel ægris referentibus, vel ali-  
 is rationibus facile possunt intelligi. Cete-  
 rum pleriq; qui sterilitatis curationem insti-  
 tuunt, in eo errore videntur versari, de quo  
 Gal. veteres medicos grauiter arguit 3. lib.  
 comp. med. secundum loc. in principio, Quod  
 in discriminatim varia morborum medi-  
 camenta ab illis tradita sint, atq; in vnum  
 ordinem redacta, quæ vel maxime contra-  
 rias vires habent. Siquidem est rationi &  
 methodo consentaneum, pro varijs morbo-  
 rum causis varia quoq; morborum remedia  
 adhiberi debere. Praclaro Heriphili præ-  
 cepto,

Curatio-  
 nis indica-  
 tiones.

Q s

cepto,



Intemp.  
frig & hu-  
midæ.

cepto, præcipuè studendum, ut ante omnia  
sciatur, quæ, qualis & quanta sit morbi cau-  
sa, & ubi maxime ea dominetur, quo scilicet  
curationem unicuique convenientem faciat.  
Itaque ne nos in eundem errorem incidamus,  
secundum causarum varietatem progre-  
diemur, omissa virorum consideratione, si-  
quidem in præsentia viriles morbos non tra-  
ctamus, Et quantum ad mulieres, unam  
tantum curationem sterilitatis, ex intem-  
perie uteri humida & frigida, quæ frequen-  
tissima est, tractabimus. Reliquæ autem  
curationem ex dictis recipiunt, partim ex  
dicendis innotescunt melius, vel denique va-  
rius accidunt. Igitur indicationes curatiuæ  
intemperiei frigida & humida sunt eiusmo-  
di. Uterus calefaciendus & siccandus. Sed  
quoniam istud non licet facere nisi primum  
tollantur humores frigidi & crassi, qui in  
utero & vasis ad uterum reperiuntur, illi  
sunt educendi. Rursus verò cum sit veri-  
simile vel potius necesse, huiusmodi humores  
non solum in ijs partibus gigni, sed etiam ab  
alijs locis, potissimum ventriculo, forte  
etiam



etiam toto corpore ad illum transmitti, & ventriculi, & totius corporis ratio habenda est. A qua quidem postrema indicatione principium curationis faciendum est, ut ita commodè & tutò paretur via ceteris medicamentis, quæ ad reliquas propositas indicationes sunt necessaria.

Utrum illis liceat satisfacere, Scribit Prognost. Philosophus 2. gen. animal. 7. Eas mulieres infœcundas perseuerare, neq; ullam curationem recipere, quæ primo ortu tales fuerunt. Sed magis accuratè & verè Gal. 5. aph. 6. 2. docet natiuam vteri intemperiem, si fuerit insignis, non posse curari, quod ita vterus reddatur densior & ora angustiora, quàm ut semen & sanguis menstr. ad conceptum concurrentia, possint generari. Sin autem intemperies fuerit moderata, tunc vitium posse corrigi ac mulierem fecundam fieri potissimum, si ea viro contrario temperamento prædito copuletur. Vno verbo: Et si ego sentio sterilitatem natiuam difficilior, quàm aduentitiam curari, verumtamen nulli dubium esse debet, quod experi-



Curatio-  
nis præsi-  
dia,

periētia monstrat verissimū esse, quod quā  
plures mulieres vel natura vel superueni-  
ente morbo steriles curationem recipiant &  
fœcundæ fiant, modò facilius modò diffici-  
lius, pro varia ratione causæ, morbi, symp.  
& rerum similium. Sed ad propria præsi-  
dia veniamus. Ad purgationem vniuer-  
salem corporis, cum nullus vrgeat morbus  
licet ante omnia aluum lenire. Inter cæte-  
ra autem omnia ad hanc rem accommoda-  
ta hyera, quæ vel sola, vel cum cassia aut  
melle ros. potest accommodari. Post le-  
nitam aluum, noxi humores præparandi  
sunt reclusis meatibus, tū cæterarum  
partium, tū præcipuè vasorum vteri. Ad  
quæ multa est inuenire. Sed primum di-  
ligenter considerandum, an locum habeat  
venæ sectio. De qua re, etsi nihil certi mea  
sententia statuendum sit, prius tamen nisi  
hoc remedium prorsus quid prohibeat, Ego  
quidem censeo illud semper oportunum ac  
plurimas utilitates posse afferre, cum pro-  
pter alias, tū maximè propter eam cau-  
sam, ut ita medicamenta calidiora, quibus  
neces-



necessarium est uti, tutius & commodius possint adhiberi. Etsi non ignoro quam plurimos, qui docent præcipuam mittendi sanguinis indicationem, de sola humorum copia & qualitate accipiendum esse, statuere. Ex quo verò loco oportet sanguinem mittere, Cum hic communis vacuationis gratia mittatur, commodior non est (basilica) dextrâ, dum modò à menstruis nō offeratur impedimentum. Quantitas sit pro plenitudine, ætate, viribus. Ad medicamenta. Syrupi, Mel. ros. syr. de mencha, de beton. hyssopo, calamenth. artemis. oxy-mel. Non improbo, quod multi faciunt, persuasi auctoritate Hipp. 3. rat. vict. 39. Oxymel, vtero & mulieribus aduersari, siquidē, si simul cum alijs medicamentis administretur, & in modica quantitate, non paruas utilitates poterit asferre. Decocta sint borrago. beton. hys. origa puleg. calam, &c. quarum imitatione cuiq; facile est conseruas, confectiones parare. Facta demum coctione humoris, & præparatione corporis, ad horum expurgationem veniendum



endum est. Ac inprimis adhibita cautio-  
ne, ut ne illa fiat, quo tempore menstrua  
sunt & prodictura sunt, adeo, ut nullum im-  
pedimentum illis inferatur. Sæpius autem  
diximus, qualia nam medicamēta ad pur-  
gationem humoris pituitosi sunt accommo-  
data. Inter simpl. est Agaricus, qui  
principem videtur locum obtinere. Inter  
compos. pil. de hiera cum agarico, cochia,  
elect. diaphæn. Indum. Sed ego familiariter  
utor hyera diacolocynthidos, quam Pachij  
appellant, quæ præ cæteris repetita insignē  
prærogatiuam habet. Iam verò facta, &  
si opus fuerit, repetita vniuersi corporis  
purgatione, id reliquum est, primum, ut  
frigida & humida intemperies uteri, & re-  
liquarum partium quæ utero consentiunt,  
corrigantur. Deinde, ut illa præsidia ad-  
hibeantur, quæ quomodocumq; fecundita-  
tem possunt adiuuare. Hæc autem quam  
plurima sunt, partim interna, partim ex-  
terna, de quibus sigillatim, sed breuiter, di-  
cendum est.

Medi-



Medicamenta interna varijs modis  
 possunt parari. Conf. syr. decocta, pul. pil.  
 sed hæc omnia ferè ex ijsdem simplicibus  
 medicamentis conficiuntur, quæcunq; va-  
 lent vterum, & vasa ad eum pertinentia  
 calefacere, ficcare, & ad conceptionem di-  
 sponere, quorum sylua est copiosissima.  
 Quæ autem ego puto magis efficacia, & qui-  
 bus familiariter vtor hæc sunt ferè, Arte-  
 mis. matricaria, betonica, dictam. orig. pu-  
 leg. calamenth. sambucus, maiorana, sal-  
 uia, thymus, nepeta, mentha, satureia, sa-  
 bina, bacca lauri, iuniperi, hederæ, saluiæ,  
 flor. beto. salu. rotis mar. citri, crocus, san-  
 talum, sem: citri, cardamo. anisum, cy-  
 minum, fœnic. apium, petrosel. asparagus,  
 rhuta, &c. Rad. Zedoar. doronici, galan-  
 ga, spicanardi, pyretri, zinzib. aristol.  
 rot. rubiæ tinct. eryng. fœnic. petrosel. aspa-  
 ragus. cynamom. garyoph. lign. aloes,  
 myrrha, nux moschat. piperis omnia gene-  
 ra, ambra, macis, balsami genera. Ego ma-  
 gis illis delector, quæ à probatis autoribus  
 antiquis iam diu fuerunt proposita & com-  
 proba-



probata, ut syr. de artemis. simpl. beton.  
compositus, de calam. corticib. citri, tro-  
chisci, galliæ mosch. de myrrha, de benzoi,  
de aniso, Aiptæ Moschata, ligni aloes, de  
croco, Conseruæ flor. citri, arantij, roris  
marini, saluiæ, betonica, maiorana, melif-  
sa. Confect. vel elect. diambra, diamoschi,  
arom. rosat. arom. garyoph. diacymini,  
diagalanga, diacalamenth. diamagarit. ac  
potissimum theriaca & mithridat. quibus  
fortass. inter cætera medicamenta omnia  
composita, primum locum licet tribuisse.  
Verum præter hæc omnia demum nonnulla  
occurrunt medicamenta, quæ proximo hoc  
tempore ceperunt magnum vsum habere.  
Illa verò sunt primum potio aquarū ther-  
malium calid. quales sunt Aponitanæ de  
aquario, &c. Deinde sunt quædam decocta  
ex ligno, &c. sarsapariliæ, rad. chinæ, sas-  
safras. ac cum certum sit ea calefacientia  
ac siccantia esse, negandum non est, quin  
magnam quoq. vim habeant vterum ad foe-  
cunditatem ducendi. Sed ego censeo deco-  
ctum sassafras principem locum obtinere,  
de



de quo etiam ab ijs, qui huiusmodi medicamentorum historiam tractant illustra exempla afferuntur, & nos quoq; hac in parte præclara non semel experti sumus. Ad locum de medicamentis internis ratio victus videtur pertinere, sine qua, certum est, reliqua omnia vel nihil, vel parum prodesse. Sed non licet vno tempore omnia persequi, modo sint alimenta boni succi, facilis concoctionis, flatus expertia, & in vniuersum calefacientia & siccantia. Iam igitur ad præsidia externa progrediamur, quæ itidem multiplicia sunt, ac formis varijs possunt parari, Linimenta scil. emplastra, pessaria, suffumigia, lotiones, iniectiones, & quæ habent eandem rationem, quæ quidem omnia, etsi ex iisdem conficiuntur medicamentis, quæ iam sunt proposita, tamen non grauabimur nonnulla exempla proferre, quæ mihi faciliora & efficaciora videntur, & quibus ego familiariter vti soleo. At primum olea, quibus licet & extra, & intra, omnes vteri partes illinire ac fouere, vt sunt quæcunq; calefaciunt & siccant, gratumq;

R      spirant



spirant odorem, de spica, cinamomo, myrrha, garyoph. de nuce myristica, croco, benzoi, styrace, aniso, foeniculo, bac. lauri, iuniperi, lilijis albis, etiam aromaticati, e.g. Rec. ol. lil. alb. cum arom. ℥j de spica odorata ℥ss Nuc. mus. anisi. ā. ℥ij M. cui demum licet addere modicum Ambrae, Moschi, & similium. Inseſiones & balnea, quibus mulieres, vel toto corpore, vel vsq; ad umbilicum se immergunt, conficiuntur vel ex aquis thermalibus, aut medicatis, ut matricariae, artemisiae, calamenthae, sabinae. Recip. Artem. matric. salviae ana m ij calam. dictamni, ana ms: rad. foenic. asparag. petrosel. ana m j bacc. laur. iuniperi, anisi, cymini ana ℥ij Mis. bulliant ex aqua pro balneo. Qui in his non acquiescunt, sed malunt solidius medicamentum adhibere, possunt cerotum vel emplastrum, quae utero & toti inferiori abdominis regioni possunt apponi longiori tempore. Recip. Ladani ℥j styrac. calam. ℥ss cinamom. garyoph. ligni aloes ana ℥j spec. diamb. gallie muscatae ana ℥ss olei nard.

q. s.



q. s. cum ol. lil. alb. arom. & ceræ q. s. f. cōp.  
 Sequuntur suffumigia, quæ quidem, sicut  
 & Hipp. & Gal. possunt muliebria duce-  
 re, ita nulli dubium est, quin vterum quo-  
 que possint alterare, illius intemperiem cor-  
 rigere, ac fecunditatem iuuare. Hæc  
 autem possunt dupliciter parari: Vno mo-  
 do pluribus ex aqua decoctis simplicibus  
 medicamentis, qualia paulò ante pro insep-  
 sione fuerunt proposita, cui deinde conco-  
 cto adhuc calenti mulier ita se accommo-  
 det, vt illius euaporatione in vterum possit  
 accipere. Altero modo autem si hæc ipsa  
 medicamenta, sed imprimis aromata cali-  
 dis cineribus imposita congruo iustrumento  
 altera ex parte excipiendo longiore, altera  
 immittendo angustiore. v. g. Rec. Ar-  
 temis. matricar. ana ℥j, myrrhæ, benzoi,  
 styr. calam. ana ℥s ligni aloes ℥j Moschi,  
 Ambrae ana graua X. M. contundan-  
 tur omnia & f. puluis: vel cum oleo nard  
 f. Trochisci vel pastilli. Restant pessaria,  
 quæ pro iunioribus sunt quadam medica-  
 menta veluti glandes aut suppositoria, quæ

R 2

in



in veterum imposita longiore tempore retinentur. Conficiuntur ex iisdem ferè ex quibus suffitus, &c. v g. Rec. Artemis. dictam. Maiorana ana ℥j sem. Anisi, Ruta, citri ana ℥ss spec. Galliae Mosch. ℥j Moschi Amb. croci, ana gr. XV. contundantur omnia f. massa, Si enim mulieres ab eiusmodi medicamentis abhorreant, licet substituere sacculos ex rutha, artemis. Cynam. garyoph. sem. anisi, rad. angel. Moscho & ambra, &c. quæ tametsi non ita citò penetrant, aliquem tamen usum præstant. Atq; hætenus de medicamentis tam internis quàm externis, quæ ad corrigendam frigidam & humidam intemperiem pro sterilitate remouenda sunt accommodata. His iam adiungenda videntur ea, quæ occulta qualitate fecunditatem præstare dicuntur, ut est semen pastinacæ, testiculi vulpis, coagula, maxime leporinum, oculus Hienæ, de quo Plin. sed in his inquirendis nolo perdere tempus. Quamuis ex dictis cuiq; satis esse debet: tamen postremo loco non libet prætermittere quædã præcepta quæ



quæ ad hanc rem sunt accommodata. Quæ  
 Janè et si ex ijs, quæ dicta sunt, colligi pos-  
 sunt: tamen alia etiam notatu digna erunt  
 addenda. Primum notandum est tempus  
 ad coitum & conceptum cum primis accom-  
 modatum illud esse, quando mulieri proxi-  
 mè menstrua desierunt, tunc enim uterus  
 omni ex parte excrementis vacat, est q̃  
 tum ad semen excipiendum, retinendum,  
 fouendum aptissimus. Traditum hoc est  
 ab Hipp. lib. de nat. pueri ab initio (legi-  
 timus liber citatur à Galeno lib. 1. de sem.)  
 s. aph. 37. ab Aristotele 7. histor. animal.  
 2. 1. gen. animal. 19. Veruntamen id quo-  
 què sciendum est, nonnullas mulieres con-  
 cipere etiam fluentibus mensibus. Postea  
 verò concipere non posse, quod illius vulua  
 statim auulsione mensium comprimatur,  
 ut semen nequeat concipere, adeò, ut neces-  
 se sit, huiusmodi mulieres, si modo velint  
 concipere, non alio tempore, quàm  
 fluentibus mensibus cum viro congregi.  
 Quem locum Philosophi maximè notabi-  
 lem video neminem animaduertisse. Ex

R s

ijs



ijs colligatis Aët. malè fecisse, qui l. ultimo  
c. 26. scribit non desinente sed appetente  
muliebri fluxu opportunè: concipiendi tem-  
pus esse. Quod sanè præter id, quod repu-  
gnat omnibus illis veteribus, etiam à ra-  
tione videtur alienum, siquidem verisimile  
est, utrum hoc tempore nondum purga-  
tum impurum esse atq; ineptum. Itaq; illis  
paucis mulieribus exceptis, quibus testimo-  
nio Philosophi statim os uteri à purgatione  
occluditur, congressus viri cum muliere con-  
ceptioni congruus censendus est, quando  
mulieri in proximo menstrua purgationes  
cessarunt. De tempore duo adhuc restant  
inquirenda, nimirum quale nam tempus  
anni nec non diei ad concubitum & sobolem  
procreandum sit accommodatum. Et qua-  
tenus ad tempus anni, propè omnes consen-  
tiunt, Ver, ceteris anni, temporibus esse an-  
teponendum, quod illud omninò temperati-  
us & salubrius sit, atq; hoc potissimum tem-  
pore homines sint robustissimi ac concubitus  
melius perferre possint. Celsus 1. cap. 3.  
Venus, inquit, vere tutissima est, neq; æsta-  
te,



te, neq; autumno utilis, tolerabilior tamen per autumnum, æstate verò in totum, si fieri possit, abstinendum. Quo ad horam dubium, an post vel ante alimenta & somnũ pro fecunditate fieri debeat Sic Aët. l. 3. c. 8. Paul: l. 1. c. 35. ac fortè alij in eo conueniunt horam ad concubitum aptiorem post cibum & ante somnum, siquidem subsequens somnus laborem remittit, præterquam quod hoc tempus ad sobolem procreandam aptissimum existit, cùm propter alia, tùm quod fœmina subdormiens genituram melius retinet. Idem statuit Oribasius l. 1. de part. facil. 22. Sed mihi longè magis arridet sententia Hipp. & Galeni. Hip: enim lib. 5. epid. 6. T. 5. paucis quidem sed grauissimis verbis totam rem definit. Labor, cibus, potus, somnus, Venus omnia mediocria. Quam sententiam interpretatus Galenus 2. Tuendæ val. 2. inquit: Hip. & modum singulorum definiisse, addito ad finem Epitheto Mediocria. Et æquè ordinem: quippe sanitatis tutelam à labore auspicandam esse, quem ex-

R 4

cipere



cipere debet cibus, potus, deinde somnus  
mox venus, in ijs quibus venere vtendum  
est. Gal. itidem generaliter oportunum  
vtenda veneris tempus definit ijs verbis ca.  
86. artis med, similia videantur apud A-  
uic. qui diligenter hac de re tractat 23. pri-  
mum c. 12. 5. histor. animal. 8. post oport-  
unum tempus rationem quoq; & ordinem  
seu modum coitus oportet considerare. Et  
ante omnia quod saepe quoq; diximus mani-  
festum est mutuum viri & mulieris amo-  
rem quàm maximè ad conceptum facere.  
Contrà verò offensiones ad sterilitatem non  
leuiter conferre. Sed præterea tam vir  
quàm mulier concubitori, omnis timoris  
mœstitiæ & reliquarū animi perturbationū  
sint immunes, alioquin aut nulli foetus, aut  
illi certè eiusmodi affectibus & passionibus  
obnoxij gignuntur. Quem locum inter cæ-  
tera præclarè narrat Plut. l. 2. de tarda  
Dei vindicta ad finem, que vno verbo plu-  
ribus exemplis & argumentis concludit,  
marem & fœminam ad prolem concuben-  
tes omnium perturbationum animi, quan-  
tum



tum fieri potest debere esse immunes. Imò  
 verò conandum, vt ambo in ipso coitu mi-  
 nimè omnium ad alias cogitationes animum  
 intendant. Quod si aliter fiat, Philosophi  
 docent semen ab alijs cogitationibus abstra-  
 ctum ab animo, fœtum cum primis anima-  
 lem, terrestrem, mentis & ingenij prorsus  
 expertem efficere. Ex quò facilè est illius  
 problematis solutionem intelligere, quam-  
 bore filij stolidi à sapientibus parentibus  
 gignantur: Contrà autem homines insipi-  
 entes, liberos prudentiores soleant generare.  
 Quod præclarè facit Alex. Aphrod. sect. 4.  
 problem. 27. Eò scilicet, quod stultiores pa-  
 rentes totos animos ad voluptatem inten-  
 dant in re venerea. Ex quo fit, vt semen  
 eorum quàm plurimæ virtutis, tum ratio-  
 nalis, tum animalis particeps, similes eos,  
 qui hinc nascuntur, efficiat. At verò homi-  
 nes prudentes ac præsertim docti, semper ali-  
 quid honesti & utilis animo complectuntur,  
 vt ne in ipso quidem venereo actu, omninò  
 à rerum studio desistant. A quo quidem  
 sensu, neq; multum abest Philosophus, qui



16. sect. 12. quarens, cur proles ceterorum animalium, quàm hominis parentibus suis similem gerat naturam, sic respondet: An quod homo vago varioq; animo in coitu est, pro ut autem pater materq; in conceptu affecti fuerint, ita partus eueniunt. Cætera autem animantia omnia aut certè plurima rei tantum ei attendunt, totiq; se veneri dedunt. Sed demum nonnulla in coitu & post coitum requiruntur, quæ fœcunditatem possunt iuuare, de quibus Auic. fortè nimis liberè ac turpiter sermonem habuit, quæ scribit: Ludum mulieri prorogandum esse, tangendas esse illius mammillas, pectinen & alia id genus, quæ voluptatem seu concubitum reddere solent delectabilem. Quæ quidem, ut puto, natura homines sine alio doctore docet. Summa est, mulierem à viro omni blanditiarum genere excitandam esse ad venerem: Id verò præcipuè conandum, ut si fieri possit, uterq; eodem temporis momento semen emittat, cum certum sit utring; seminis concursus ad formandum conceptum maximam vim habere.



re. Quod si mulier omninò ut plerunq; usu venit, tardius viro soleat semen emittere optimum foret ante congressum aliquo opportuno decocto vel linimento v. g. modico moschi, aut zibeti ex oleo nard. uteri cervicem fovere, ut ipsa mulier quoq; in veneris amorem incendatur. Verùm neq; id præmittendum de coitu, quod scribit Paul. 3. c. 74. nempe coitum, qui à tergo exercetur plurimum momenti ad partus conceptionem facere. Quod ego quidem non intelligo satis, qui nequeo concipere animo quam obrem hæc concumbendi figura possit conceptiones iuvare, cum altera ex parte multæ evidentes & validæ rationes videantur demonstrare, nulla oportuniore ratione virum & mulierem concumbere posse, quàm si mulier supina, minimè prona aut obliqua iaceat. Postremò quoq; illud ad conceptum facere potest, si uterq; mas & femina non protinus absoluto opere venero, à mutuo complexu diuellantur, sed placidè aliquandiu. Mulier verò ab omni commotione corporis & animi abstineat, ac si



si fieri potest, somnum capiat. Quod quidem  
 praeceptum manifesta utitur ratione. Cete-  
 rum post haec omnia sunt nonnulla quae la-  
 tenae quadam vi & proprietate venerem  
 cohibere & fecunditatem impedire possunt  
 qualia sunt apud Plin. l. 24. c. 9. folia sali-  
 cis contrita & saepius sumpta l. 28. c. 8.  
 decoctum scinci animalis aquat. cum melle  
 sumptum, quod à dioscoride sumsit 2. c. 6  
 l. 32. c. 4. Squamae testudinum ex summa  
 parte derasa in potu exhibita lib. eod. c. 5.  
 testiculi galli adipe illiti ac pene arietino  
 alligati, si cum sanguine gallinacei lecto  
 subijciantur. Sic legimus apud Galenum  
 6. simpl. viticis semina, flores, folia, non  
 solum ore sumpta, sed etiam substrata ad  
 castitatem conferre, atq; hinc factum esse,  
 ut Athenis in sacrificijs Cereris mulieres  
 sibi totum fruticem substernerent idem Di-  
 osc. l. 1. c. 116. Inter cetera omnia Men-  
 tha quodam communi consensu solet rebus  
 veneris & conceptioni resistere, de qua est  
 antiquum & vulgatum prouerbium cuius  
 meminit Philosophus sect. 20. problem. 2.

Men-



Mentham in bello neq; edito neq; serito.  
 Cuius quidem ille causam inquirens respon-  
 det, quod huiusmodi herba membra refri-  
 geret, ideò confirmans argumento, quod  
 corrumpat semen genitale, frigus autem  
 fortitudini & audaciæ in bello aduersetur.  
 De qua tamen interpretatione mirari licet.  
 Siquidem Gal. 5. simpl. f. Diosc. 3. c. 33.  
 Auic. 2. tr. 2. c. 494. Paulus 7. & omnes  
 conueniant, mentham & calidam & siccam  
 esse, imò vero & stimulandi veneris vim  
 habere. Conciliator anxius est & verè  
 fatetur esse calidam & siccam ac venerem  
 excitare Mentham, Addit tamen: Men-  
 tham per se quidem calidam, per accidens  
 autem frigidam. Idem docet Hermolaus  
 Barbarus corollario c. 263. Demum ve-  
 rò conciliator aliam problematis solutionē  
 affert cum inquit: Potius dicendum men-  
 tham in bello, neq; edendam neq; serendam,  
 quod calefaciendo homines ad venerem in-  
 citat, propter quam milites debilitantur &  
 redduntur timidi, quam quidem respon-  
 sionem admittendam censeo. Quamobrem  
 quod



quod nequeo dissimulare, legi aliquando cū  
 stomacho Montanum veronensem, qui de  
 affectibus vterinis hunc locū tractans, eum  
 totū peruertit, scribens ad hunc modum:  
 Hac in re Aristoteles errauit in problem.  
 ubi volens reddere causam, cur milites  
 mentha vterentur in castris, dicit: quod  
 prohibet venerē, quantum ad hoc recte di-  
 citur; sed deinde addit audens reddere  
 causam, docet, esse frigidam, quod fal-  
 sum est. Hec Montanus. Quae ab Ari-  
 stotele & Conciliatore adeò sunt aliena, vi-  
 certissimum sit hunc hominē alioquin cele-  
 brē, neq; Aristotelē neq; Concilatorē legisse,  
 sed potius, quod alij quoq; hoc tempore fa-  
 ciunt, haec ex alijs transcripsisse. Haec  
 haec de sterilitate.

## CAPUT VII.

## DE MONSTRIS.

Ratio or. **I**am pridem cepimus tractar  
 conceptū & paritū hominis, quam pul-  
 cherri-



cherrimam & vtilissimam tractationem  
 nondum absolutam, nobis propositum est  
 in præsentia absoluere. Cum igitur proxi-  
 mo anno sermo habitus sit, de ijs, quæ per-  
 tinent ad priuationem & abolitam conce-  
 ptionem, nunc ex instituto nostro id ordine  
 restat, vt de ijs sermonem habeamus, quæ  
 ad deprauatum conceptum pertinent. Cæ-  
 terum cum certissimum sit naturæ institutū,  
 mulierem perpetuò hominem concipere,  
 ita statuendum est, quemlibet mulieris  
 conceptum, quicquid illa præter hominem  
 in vtero concipit, vitiosum & deprauatum  
 esse. Quod quidem etsi multis modis po-  
 test fieri, tamen non incommodè in aliquot  
 capita potest digeri, quæ totam ferè artē  
 contineant in his explicandis. Ea verò sunt  
 1. Monstra, 2. Mola, 3. Flatus, 4. Aqua,  
 quæ omnia aliquando videmus concipi &  
 coaceruari. De monstris plurima possent  
 vel historicè vel fabulosè, vel etiam Philo-  
 sophicè commemorari, quæ ad nostrum in-  
 stitutum non pertinent. Ideoq; pauca tan-  
 tum de generatione & causis. Philosophus  
 secundo



secundo Phys. 82. 4. gen. animal. docet  
 monstrum nihil aliud esse quàm peccatum  
 seu vitium naturæ deficientis à suo fine  
 propter aliquod impedimentum. Sicuti e-  
 nim in ijs quoq; contingere solet idem, qua  
 secundum artem fiunt, dum artifex suum  
 finem non assequitur, vt Grammaticus  
 quando deprauatè loquitur, & medicus,  
 quando medicamentis obest: ita in his qua  
 secundum naturam. Quod quamuis multis  
 modis soleat contingere. Verùm tamē est, vt  
 ego sentio omnia ferè errata ad morbos in  
 mala cōpositione posse referri. e. g. ad mor-  
 bum in numero vbi homo nascitur monocu-  
 lus, vel vno pede vel duobus capitib<sup>9</sup>. Quod  
 idem de morbis in magnitudine, figura &  
 reliquis demonstrari potest. Quæ doctri-  
 na manifestè colligitur ex Galeno de causis  
 morb. 7. De causis verò propter quas mon-  
 stra præter naturā generantur, non conue-  
 nit inter omnes. Gal. lib. de hist. Phil. aut  
 verius Plut. l. 5. plac. ph. 8. hæc habet:  
 Empedocles monstra nasci docet, si semen  
 multum fuerit, si paucum, si diuulsum, si  
 inane,

Causæ



inane, si motu inordinato immissum fuerit: strato vel quia additum, vel quia detractum, vel quia transpositum, vel quia inflammatum aliquid sit. Nonnulli medici quod tunc uterus distortus fuerit. Verum hæc nimis generaliter & confuse dicuntur. Quod si hanc rem ad certa naturalis conceptus principia referre velimus, de quibus iam diximus quod satis est, ita mea sententia statuendum est: Monstra contingere, vel ratione materiæ, quæ aut copia, aut qualitate, aut aliter sit vitiosa: vel ratione agentis, quem virtutem informativam seu calidum innatum, seu aliter velimus appellare in præsentia non multum laboro, qui quidem nimis exuperantem aut deficientem virtutem habeat, Vel demum propter peruersitatem uteri & vasorum, quæ ad conceptum destinata sunt. Quæ item doctrina conuenit Aristoteli, Galeno & rationi. Nam quemadmodum si hæc omnia optimè fuerint disposita materia, agens, & instrumenta seu vasa ad hanc rem requisita conceptus naturales fieri necesse est: ita

S

altera



altera ex parte, si vel omnia vel aliqua fuerint malè affecta, tunc probabile est fœtus non naturales sed monstrosos contingere. Atq; hætenus de monstris summam, quæ vix ad rem medicam pertinent, De quibus si quis plura cupit intelligere videat Aristotelem & Auerr. locis citatis, nec non Albertum 2. Ph. tr. 3. c. 3. & Ioan Philop. sub 2. Phys. qui subtilitè & diffusè in hoc argumento versati sunt.

## CAPUT VIII.

## DE MOLA.

Natura vel  
essentia.

**Q**uid sit mola non convenit inter omnes. Aët. lib. ult. c. 80. Paul. lib. 3. c. 69. docent, Molam tumorem esse scirrhum, seu scirrhi naturam referentem, qui modò uteri orificium, modò totum uterum occupat. Quibus Auic: quoq; videtur consentire, qui cap. de mola inquit: quandoq; esse duritiem quandam, quæ aliquando in tota matrice reperitur. Quorum sententia



rentia quoq; subscribunt Moschio & Cleo-  
 patra, qui de affectibus mulierum scripse-  
 runt harmonia gynæc. 7. Aristoteles au-  
 tem lib. 4. gen. animal. c. 7. docet, molam  
 non aliud esse, quàm carnem vtero mulieris  
 conceptam, qui recitat historiam cuiusdam  
 mulieris, quæ peperit carnem, quàm mo-  
 lam vocant. Cui planè consentit Galenus  
 14. usu part. 7. 14. meth. 13. qui affir-  
 mat, molam esse carnē quandam inutile &  
 informem, qui in mulierum vtero geritur.  
 Qui fortè Aristoteles & Galenus id ab Hip.  
 didicerunt, quæ in lib. de morbis mulierum  
 (pag. Basil. 336.) nec non in lib. de sterili-  
 bus, (394.) qui molam ceu septum impro-  
 bum & vitiosum appellat carnemq; esse con-  
 firmat. Ac sanè, ne in re manifesta sim lon-  
 gior, pro veritate ad mentem Hip. Galeni  
 & Aristotelis habendum est: Molam  
 vitiosum ac deprauatum conceptum esse  
 carnis inutilis atq; informis, qui naturalis  
 conceptus nescio quam similitudinem re-  
 presentat, Auic. verò, Aetius, Paul. &  
 ceteros, omnes qui ipsis consentiunt malè  
 sentire.



sentire, cum reuera vitiosus conceptus & tumor vteri longè inter se differant. Quod inter cætera mōstrat curatio manifestissimè, vt posterius videbimus. Quam quidem veritatem, neq; ipsemet Auic. Aët. Paul. potuerunt dissimulare, siquidem Auic. scribit, mulieres sentire in ventre suo motum, qui est sicuti motus Embryonis, quod permutatur dextra & sinistra, ac demum deponere frustum carnis, cuius est forma quædā, cuius species non comprehendantur. Siquidem Aët. & Paul. tametsi de aliorum sententia loquantur, inquiunt: molam esse carnem informem in tunicis vteri consistentem, quæ modo conceptus in lucem editur. Ex quo vno loco velim intelligi quantum in doctrina huiusmodi virorum sit acquiescendum, qui eodem capite & paucis interpositis lineis non verentur ea docere, quæ inter se nullo pacto possunt coherere. Notandum autem, molam carnem informē dici, non quòd ea planè omni forma careat, quam certum est variam ac diuersā, maiore tamen ex parte rotundam esse, Sed



Sed quod à forma humana sit aliena. Si quæras, qualis affectio præter naturam mola haberi debeat? respondet Galenus 14. meth. 3. Molam morbum esse in mala cõpositione, & quidem in numero redundante re toto genere præter naturam, vt est lapis in vesica, quæ Medici primo quoquo tempore, tanquam inutilia ac molesta naturæ conantur eijcere. Mola nomen accepit, vt notat Aet. lib. vlt. c. 80. à prauitate & difficultate motus. Nam sicut lapis molaris admodum grauis est ac difficulter mouetur, ita hic morbus, qui mola dicitur, instar lapidis difficulter mouetur. Non est igitur tumor vteri, sed caro informis vtero concepta, morbus in numero toto genere præter naturam. Differentiæ mola ab Auic. & practicis plures numerantur pro varia materia, ex qua originẽ habent, qui docent, alias esse sanguineas, alias pituitosas, alias biliosas, alias melancholicas, alias ventosas, alias aquosas, alias membranosas, & fortè alias, pro vt ex varijs humoribus, flatu, aqua, membranis, vel alia

S 3

mate-

Differenti



materia generantur. Alij verò alias quoq;  
differentias adiungunt, quod nimirum mo-  
la alia est inanimata, quæ omni prorsus  
sensu & motu caret, Alia animata, quæ  
sentit, mouetur aliquot horis, quandoq; vi-  
uit & varias animalis formas induit, qua-  
les sunt ranæ, aues & similia. Sed ego puto  
huiusmodi differentias inanes & superua-  
caneas esse, Siquidem A. istoteles, Hipp.  
Gal. nullam aliam molæ differentiam ag-  
noscunt, quàm carneam sicuti diximus.  
Etsi mea sententia negandum non est, hanc  
substantiam carneam varios humores, mo-  
dò vnum, modò alterum magis repræsen-  
tare. Cætera autem, quæ vtero concipiuntur  
e. g. flatus, aqua, nulla ratione ad molam  
pertinent, sed propriam tractationem re-  
quirunt. Sic quæcunq; sentiunt, mouentur  
& sunt animata, potius ad monstra, quàm  
ad molas referenda sunt. Itaq; ad differen-  
tias quæ sumuntur ex causis alijs quæ ma-  
ximas continent difficultates.

Hipp. omnium primus, Molæ causas vi-  
detur docuisse scribens 1. de morb. mulierũ.

Molæ



Mola conceptus hæc causa est, cum multi menses existant & morbosum semen exceperint, nec conceptus sit rectus, & venter plenus, veluti prægnantis. Quam eandem ferè sententiam atq; eadem verba repetit lib. de steril. suprâ citat. Ex quibus facile vnus quisq; potest intelligere duplicem huiusmodi causam existere, Sanguinem menstr. copiosum, & semen viri exiguum morbosum, &c. De priori causa conuenit inter omnes, de posteriore autem non leuis apud multos est controuersia, qui contendunt mulieres viduas, virgines sine vlllo viri concubitu posse molam concipere. Ego verò cum olim hanc litem longius agitarim, illud vnum dicam, illos omnes falli, & ab Aristotelis, Hipp. & Galeni doctrina dissentire, quicunq; putant in muliere sine semine viri molam fieri posse. Pro quo Aristoteles 4. gen. animal. 7. legatur, qui scribit, grauidas molas parere, ac narrat historiam mulieris, de qua supra. Sic Gal. 14. vsu part. 8. disputans aduersus nonnullos, qui de semine mulieris malè sentiebant

S 4



tiebant, confirmat manifestè molam sine se-  
 mine viri nunquam fieri potuisse. Quibus  
 si licet Auerr. quoq; testimonium addere  
 loco citat. 4. gen. animal. 7. molæ præci-  
 puâ causam esse, quia natura non concordat  
 inter duo semina, in qualitate & quantita-  
 te, atq; id potissimū in mulieribus accidere,  
 quando semen maris est malæ complexio-  
 nis. Quo loco nequeo dissimulare evidentiſſ:  
 Fernelij repugnantia, qui lib. 6. de part.  
 morb. & sympt. c. 5. consentiens Hipp. A-  
 ristotel. Gal. scribit efficientē molæ non so-  
 lum esse sanguinē menstruū, sed etiam semen  
 viri, quod aut corruptum, aut quouis mo-  
 do inualidum fuerit, neq; vnquā visam fu-  
 isse mulierem, sine mare molam concepisse.  
 Contrà verò lib. 7. de procreatione hominis  
 c. 1. non veretur affirmare fœminā ex se  
 ipsa sine viro molā plerunq; producere, sicuti  
 certum est, gallinas sine gallo ova emittere.  
 Quæ quidem tanti viri, tanta inconstantia,  
 quomodo possit excusari & defendi, illius  
 fautores viderint. Sed fortè maior occur-  
 rit difficultas, vtrum mola à nimio calore



an frigore ex multo sanguine generetur. Namq; Auic. F. 21. tertij, trac. 2. c. 18. præter multitudinē sanguinis, docet vehementiā caliditatis necessariā esse, in qua ille sanguis coquatur & carnis formā acquirat. Contra verò Aristoteles l. c. manifestè scribit, Molam non aliter fieri, quàm imminuta & imperfecta coctione, quam quidē certū est, ex defectu & imbecillitate caloris natui originē habere, qui scribit, &c. Sic Auerr. confirmat molæ causam non aliam esse, quàm debilitatem naturæ, corruptionem digestionis, priuationēq; vltimæ concoctionis. Ac sanè præter testimonia Aristotelis & Auer. si quis velit rem ipsā considerare, is facilè intelliget, hac in re Auic. malè sentire. Etenim si mola ex calore ortum ducit, id quidē ex calore nativo fieri non posse, quem certum est perpetuò concoctionē efficere, secundum naturæ institutū agere, atq; naturalem formā in materia subiecta introducere. Sed neq; istud à calore præter naturā fieri aliquo modo posse videtur. Nam quotiescunq; sanguis pro-

S S

prijs



prijs vasis continetur, ac præcipuè si in magna cavitatē exciderit, quales sunt ventriculus, vesica, uterus, tunc auctoribus Hipp. & Galeno 6. apb. 20. accedente calore præter naturam, necesse est illum vel suppurare, vel liuescere, vel in grumū converti, & omnino à sanguinis forma degenerare, ex quo seua & periculosa symptomata hominibus solent imminere. Quamobrē certū cuiq; esse potest, molam nullo modo calore vel naturali vel præternaturali fieri posse, atq; Avic. hac in re aduersus Aristotelem, & eius doctrinam hallucinatum fuisse contraq; ipsam rationem. Igitur Mola sunt duæ præcipuæ causæ proximæ. Altera sanguis menstruorum copiosus, crassus, frigidus: Altera semen viri, quod sit vel paucum, vel imbecillū, vel aliter malè affectū. Ita enim fit, dum semen agit quidem in sanguinē, vt illū transmutet, concoquat, fœtū perficiat, sed tamen propter imbecillitatem caloris natiui, nec non repugnantia subiectæ materiæ nequeat illum superare, ac naturalē formā introducere, fit, vt quædam succeda



cedat inquinatio & cruditas, ex qua ea  
 rudis & informis caro generatur, quæ mola  
 dicitur. De mola, antequam ad alia pro-  
 grediamur, sciendum est, Aristotelem quasdam  
 molæ proprietates & cōditiones afferre, quæ  
 nullo modo sunt prætermittendæ. Id igitur  
 primū scribit: Molam tres. 4. & plures  
 annos, quandoq; per totam vitam durare,  
 neq; ullam curationē accipere. Secundò  
 molam, quæ prodierit ex utero adeò ob-  
 durefcere, ut ferro nequeat secari. Cuius  
 rei causam, inquit, se in problemate ex-  
 plicasse, quam quidem ego nunquam memi-  
 ni me apud illum legisse. Et si quis omninò  
 cupit eiusmodi positionum aliquam respon-  
 sionem intelligere, quatenus ad primum  
 pertinet, respondet Philosophus id fieri pro-  
 pterea, quia natura videtur de vita certa-  
 re, atq; id perpetuo conari, ut rem perficiat  
 finemq; imponat generationi, ac propterea  
 quod iam inchoatum est, aut per totā vi-  
 tam, aut longo tempore durare, siquidem  
 mola (inquit ille) neq; omninò perfectam  
 nec planè alienā obtinet naturam. Quæ sanè  
 respon-



responsio, nescio, quanti sit facienda, Cui  
Gal. doceat, & satis confirmet ratio, molam  
toto genere esse præter naturam, quod nunquam  
dubium esse debet, quin natura, si posset, pri-  
mo quoquo tempore proijceret, siquidem  
facit aliquando. Quare si id liceret, ego aliter  
responderem: Nempe, molam multos annos  
& quandoque per totam vitam durare, quod  
illa ægrè & tardè mouetur. Ex quo fit, quod  
ligamenta utero annexa, quæ alioquin vali-  
dissimos & continuatos motus ad ruptionem  
requirunt, minimè possint rumpi & laxari.  
Atque hinc fortè licet ad secundum proble-  
ma respondere, Quamobrem una molam  
difficulter, plures faciliè deiciantur, quod  
multi affirmant, atque experientia demo-  
strat verissimum esse, de qua scribit Hip-  
pocrates lib. de morbis mulier. (f. 336) si caro una  
fuerit, mulierem perire, neque fieri posse,  
superstes maneat: Si verò plures fuerint,  
tam seruari, quippe est probabile id fieri  
quoniam tunc ligamenta sunt diuisa, neque  
adeò valida & firma, quin facilius rumpantur,  
fortè etiam propterea, quia alte-



De mola alternis etiam motionibus & gra-  
 tati & expulsionem possunt occasionem af-  
 ferre. Quatenus autem pertinet ad secun-  
 dam Aristotelis sententiam, molas utero  
 odeunt mirabiliter obdurescere, adeò,  
 nec ferro discindi possint, respondet ille  
 usam huiusmodi duritiei cruditatem es-  
 cum mola aliud non sit, quàm caro quæ-  
 m inquinata, minimè cocta, & quæ con-  
 uriam elixationi qualitatem acquirit.  
 Quod Auer. quoq; explicat per hæc verba:  
 huiusmodi rei causa est debilitas naturæ  
 digestionis corruptio, priuatioq; ultima  
 tionis. Postremò Aristoteles quærit,  
 amobrem mola in solis mulieribus, in cæ-  
 ris animalibus minimè generetur? Qui  
 ppondet id fieri, quia sola mulier inter cæ-  
 ra animalia morbis uteri obnoxia est ac  
 enstruis abundat, quod non possit ea con-  
 quere, sicut aliàs tractantes de menstruis  
 se diximus. Quod quidem problema, nec  
 illius responsio, à nonnullis in dubium  
 ocatur, qui contendunt non solum mulie-  
 s, sed alia quoq; animalia, & molas con-  
 cipere,



cipere, & menstruis abundare. Ac san-  
quod ad molam pertinet, si verba Aristoteli  
lis diligenter considerentur, ille & planè  
constanter affirmat, molam in solis muli-  
ribus gigni, qui, inquit, id verum esse, ne-  
quid admodum lateat. Ac tandem conclu-  
dit postremis verbis cap. molam merito  
mulieribus aut solis, aut maximè genera-  
Ex quibus non obscurè potest colligi, ceteris  
quoq; animalia præter mulieres, quando  
molas concipere. Quod verò ad men-  
attinet, ego quidem non sum nescius, quomodo  
modo hoc loco Aristoteles affirmet, sola  
mulierem inter omnia animalia menstruis  
abundare, cum 6. hist. animal. 18. aperte  
contrarium doceat, qui hæc ipsa verba  
cit. Purgatio menstr. fit quidem & ceteris  
animalibus, sed nulli æquè ac mulieri.  
iterum ferè in fine cap. indicium conceptus  
maximè in vaccis, equabusq; est, cum men-  
ses cessarunt spatio temporis bimestri, tri-  
mestri, quadrimestri, semestri, sed id pro-  
cipere difficile est. Quamobrem non  
sunt, qui menses in animalibus negant.



Hac Aristoteles. Cuius quidem euidentiss:  
 repugnantiae dissolutionem ego libenter in-  
 telligerem, qui fateor nihil mihi haecenus  
 pro ea tollenda in mentem venisse. Sed  
 fortè nimium digressi: ad signa regrediendū. *Signa.*  
 Apud Hipp. & Gal. plurima sunt, sed ea fe-  
 rè omnia non minus fœrum, quàm molā in-  
 dicant. Ego arbitror duo esse, quæ certissi-  
 ma sint signa: 1. Motus qui in mola nullus  
 est, ut scribit Hipp. cum illa non uiuat,  
 omni sensu & motu careat, ex quo mouetur  
 tantum per accidens, dum contingit mulie-  
 rem moueri, & is quidem grauitatis potius  
 quàm veri motus speciem representat. Nam  
 i. g. Si mulier ad vnum vel alterum latus  
 declinet, tunc pariter mola ad eandē par-  
 tem veluti quoddam pondus impetu quodā  
 delabitur, cum altera ex parte fœtus, qui  
 uiuit, atq; animal existit, verè moueatur,  
 si mas fuerit tertio mense, si foemina 4.  
 Quare si mulier diligenter aduertat, facilè  
 potest huiusmodi motus diuersitatem de-  
 prehendere. Alterum signum ad parien-  
 di tempus pertinet. Cum enim mulier natu-



ra instituto soleat parere mensibus 7. 8. 9. atq; etiam 10. 11. Si hoc tempore ea non pariat, tumorq; abdominis perseueret, atq; symptomata reliqua, quæ ferè naturalen fœtum solent concomitari, iam pro certo est habendum molam in vtero contineri. Hipp. inter cætera scribit magnum molæ indicium esse, quod lac in mammis non generetur, tametsi mammae turgidae fiant, quod quidem signum non ab omnibus recipitur. Cum enim frequenter fiat, ut mulieri molam concipienti menses deficient, quod ego non semel experientia didici veriss. esse, certum autem sit, quod Hipp. & Gal. docent 6 aph. 39. mensibus deficientibus mulieri aliquando lac in mammis superuenire, et illa neq; grauida est neq; peperit, fortè huiusmodi signum neq; planè certum censendum est. Itaq; duo posita signa, motus & temporis partus, videntur superare certitudine. Quibus licet addere alia, quæ mulieres hoc morbo laborantes, quàm verè grauidas solent comitari, ut cibi fastidium, facies decolor, incessus & motus difficilis quasi aliquid quæ



quid ex utero propendeat, totius corporis  
 extenuatio, & quandoq; malus habitus, ac  
 forte alia id genus, quorum facile est ratio-  
 nem reddere. In curatione Molæ Gal. 14.  
 meth. 13. unico verbo se explicat, qui il-  
 lud vnum docet, in vniuersum medicos ad Curatio-  
 huiusmodi morbi sublationem statim pro-  
 perare, quæ quidem communis est medi-  
 catio omnibus rebus, quæ toto genere  
 præter naturam sunt. Hipp. autem præ  
 cæteris omnibus, etsi breuissimè suo more,  
 tamen præclariss. videtur totam hanc cu-  
 rationem conficere, qui huiusmodi indica-  
 tiones proponit: Primam, communem totius  
 corporis vacuationem, secundā, mollitiem,  
 laxationem, apertionem vasorum, uteri &  
 ligamentorum, quibus mola alligata est.  
 Tertiam, incitamentum facultatis expul-  
 tricis. Quæ quidem omnia eò spectant, ut  
 quò citius & facilius possit, mola ex utero  
 propellatur, de quibus sigillatim dicendum  
 est, utrū liceat ijs indicationib; satis fa-  
 cere nec ne? Plurimæ omnes docent, atq;  
 experientia videtur confirmare, hanc  
 T pro-



Curatio.  
praesidia.

prouinciam semper esse difficilem, Imò vero Hipp. nos monet, mulieres hoc morbo laborantes curandas non esse, aut certè non sine praedictione. Ergo quatenus ad primam pertinet indicationem, cum morbus det inducias, ante omnia leniatur aluus & inter cetera omnia certum est, hieram principem locum obtinere, quæ potest non solum ventriculum & primas vias purgare, sed etiam quoquo modo moliri dissolutionem & faciliorem exitum iuuare. Et si permisceatur cum cassia, optimū foret hoc modo. Recip. Spec. hieræ simpl. flor. cass. recent. ana ℥j M. cum sach. f. bolus: lenita aluo mea sententia, nisi quid impediatur, non solum utile, sed etiam necessarium erit sanguinem mittere. Sed dubium est, quomodo, & ex qua parte illum mittere oporteat. Hipp. iubet ad latera in parte posteriore cucurbitulam affigere, ac plurimum sanguinis trahere, ut ita quemadmodum puto, sanguis à partibus internis ad externas extrahatur & reuellatur, quò alimentum mole subtrahatur, atq; illius ligamen



ta reddantur infirmiora, vnde facilius illa possit ex vtero deduci. Sed ego maxime probarem sectionem venæ, quæ multo efficacior & communem corporis regionem & euacuaret, & reuulsionem ac deriuationem præstaret, & omnia ea efficeret, quæ in hac curatione requiruntur. Sed ex qua parte conueniat sanguinem emittere, non conuenit inter omnes. Altomarusca. proprio, quem forte sunt imitati Mercatus & plerique recentiores practici, qui alteri ab alteris ferè omnia turpiter transcribunt docent, primum secandam venam cubiti, imò verò non solum vnā, sed etiam repetitam ex parte missionem sanguinis probant. Deinde jubent, præsertim per initia morbi, venas quoque inferiores fore incidendas. Quorum opinionem nequeo satis probare. Cum enim medicus nihil propositum habeat, quàm primo quoque tempore molam ex vtero deponere, tam certum est, quàm quod tertissimum, superioris venæ sectionem huiusmodi propositum impedire posse. Itaque prætermissa sectione venæ superioris, ego

T 2      maxi



maximè probare soles sectionem venæ inferioris, quæ quidem Galeno auctore & omnium consensu potest & menses prouocare, & vterum ab omni sorde purgare. Si ita ferat occasio, non solum ex vno pede, sed etiam ex altero, & quidem sæpius licebit sanguinem mittere. Lenita aluo, secta vena, humores quicunq; sunt in corpore crassi & tenaces, incidendi, abstergendi, attenuandi sunt, meatus per quos illi transmittuntur & trahuntur aperiendi medicamentis purgantibus. Quæ quidem & humorum & corporis præparatio, partim alimentis, partim medicamentis fieri solet, quæ utraq; molliendi & attenuandi vim debent habere. Prætermisiss autem alimentis, de quibus Gal. proprium confecit commenta: & nos quoq; sæpè diximus, medicamenta varia sunt ac plurima, inter quæ syrupi principem locum obtinent, cuius gratia talia præscribi possunt ex tempore. Recip. Oxy-mel. simpl. ℥j Decoctum betonicae, Matricariae, Menthae, pulegij ana ℥iij Misc. Et si ante syrupum exhibeantur boli & confec-tiones



Etiones tales, optimum foret, exem. grat.  
 Rec. Conserua, capill. ♀ Ziij spec. diacala-  
 menth. Zi Misc. & fiat bolus ante syrupum  
 sumendus. Item Rec. spec. diamb. diaca-  
 lam. ana Zs sachari Ziij cum vino albo f.  
 conf. in rotulis ante syrupum. Preparatis  
 humoribus ad purgationem veniendum, &  
 quidem per medicamenta validiora, qua-  
 lia sunt hiera magna, hiera Logadij, diaco-  
 locynthidis, &c. quæ quidem hac in re ma-  
 gnam habent prerogatiuam. Rec. Elect.  
 diaphan. hieræ, diacol. ana Ziij mell. ros.  
 sol. Ziij, decoct. beton. art. ana q. s. Mis.  
 fiat potio. Quam quidem purgationem, & si  
 opus fuerit repetita detur, ego censeo in  
 deiicienda mola magnam vim habere.  
 Nam præterquam quod purgantia medi-  
 camenta, ac potissimum validiora, habent  
 peculiarem vim deiiciendi foetum, Aristo-  
 teles quoq; videtur nobis id insinuare, qui  
 scribit 4. gen. animal. 7. quandam mulie-  
 rem tres aut quatuor molas gestasse, donec  
 superueniente demum dysenteria illa mo-  
 lam pepererit, ac libera euaserit. Quasi hinc  
 T 3                      liceat



liceat colligere, mulieres laborantes mola,  
 ex dysenteria & qualibet purgatione per  
 aluum sanari aliquando posse, facta uni-  
 uersi corporis purgatione. Id postremò re-  
 stat, vt adhibeantur præsidia illa, quæ pos-  
 sint mollire, laxare, & aperire omnia vasa  
 & ligamenta, quibus mola alligata est,  
 nec non iuuare & excitare facultatem ex-  
 pultricem, vt molestum illud onus deponat.  
 Hæc autem plurima sunt, partim interna,  
 partim externa. Externa sunt fomenta,  
 balnea, linimenta, emplastra, &c. Recip.  
 Artemisiæ, chamomil. anethi. rad. alth.  
 maluæ, ana Mj sem. lin. fœn. græci  
 anisi, fœnic. ana ℥j f. decoctio in aqua  
 com. in qua mulieres sedeant vsq; ad umbi-  
 licum, aut saltem pectus, & reliquæ vteri  
 partes foveantur. Si præsto essent aquæ  
 thermæ calidiores, quales sunt Aponita-  
 næ, forent præstantissimæ. A fomento vel  
 balneo licet adhibere linimenta, quibus  
 omnes partes & internæ & externæ perfun-  
 denda & inungenda sunt. Rec. Succo Al-  
 theæ ℥ij adipis anserini, gall. ana ℥j ol.  
 amygd.



amyg. de lil. alb. ana ℥ss M. ad ignem. Interna sunt diacalam. Trochisci de myrrha, & vno verbo, quæcunq; menses & secundas prouocant, fatumq; mortuum excludunt. De quibus, quoniã posterius in difficultate partus sumus diligenter sermonẽ habituri, non est, vt in præsentia immoremur. Sed tamen non est prætermittendum remediũ, quod nonnulli maximè probant, & tanquã secretum retinent, ad deijciendam molam. Illud autem est fel bouinum, si per os ad ℥j accipiatur, Quod si tandẽ contingat huiusmodi omnia præsidia frustra adhiberi, sunt, qui audeant opera Chirurgica & ferro molam detrahere. Quod ego quidem censeo tunc solum licitum esse, cum mola ab vtero & vteri ligamentis laxata & diuulsa fuerit, adeo, vt ad ostium vteri possit declinare. In quo casu, si natura nequeat illam expellere, collocata muliere in cõmuni sede ad partus accommodata, deductisq; illius obscuris partibus, ferrum & instrumentum ad comprehendendum in vterum immittunt, quo molam comprehensam ex vtero detrahere



tentant. (Instrumentum pedem gryphium nominant.) Sed ego puto operationem, quam nunquam vidi, plenam esse periculi & difficultatis. Haecenus de Mola. Nunc de alijs, quæ vtero contineri possunt, verba sunt faciendæ.

## CAPUT IX.

DE INFLATIONE  
UTERI.

Essentia &  
causa.

**Q**Vandoq; euenit, ut flatus in vtero colligantur, quæ distendentes inferiore partē abdominis, naturalis conceptus speciem referunt, qui hunc ferè exitū habent, ut mulier, quæ se gravidam multos menses existimabat, iamq; omnia puerperia habebat in promptu, tandem modò citius, modò tardius nihil nisi sonoros flatus excernat. Ex quo dissoluto ventris tumore, non nulli solent joculari, illā crepitum peperisse, sicuti cuidam mulieri in hac ciuitate hoc anno contigit. Generationem flatus præcla-



præclarè inter cæteros Gal. tradidit 3. sym.  
 Caus. c. 3. per hæc verba : Flatuum gene-  
 ratio est in ijs locis, qui in ventre sunt, suc-  
 cis quibusdam pituitosis vel alimentis à de-  
 ficiente calore in halitum solutis, quippe sin-  
 cera frigiditas prorsus halitum non facit,  
 quod scilicet ea non attenuat, neque  
 conficit, neq; alimentum dissoluit. Fortis  
 autem calor cum longo interuallo nutri-  
 mentum superet amplius quàm pro ge-  
 nerando halitu, id attenuat, nisi tandem  
 id flatuosum sit natura: quod idem, Gale-  
 nus inquit, in rebus externis fieri videmus.  
 Siquidem cæli constitutio tùm frigidissima  
 tùm calidissima aërem purum efficit. Me-  
 dia verò constitutiones nebulas pariunt.  
 Ex quibus, de Galeni sententia constat fla-  
 tus generari ex debili & imbecillo calore,  
 qui alimenta & succos non potest exactè  
 concoquere & superare. Nec verò dubium  
 esse debet, quin flatus hac eadem quoq; ra-  
 tione in vtero generentur, quod quidem  
 duobus potissimum modis fieri debet: vno  
 modo, propter imbecillitatē calorem vteri,

T s

quoties-



quotiescunq; ille refrigeratur, vt non possit  
propriū alimentum & humores in eo con-  
tentos conficere, sicut frequenter solet eueni-  
re tempore purgationis menstruae vel puer-  
perij: Atq; eo magis, si partus fuerit diffici-  
lis & laboriosus, siquidem hoc tempore, vt  
docet Galenus 14. de usu part. 13. ceruix  
uteri aperta & recta est, vt frigidior aër  
facile possit ad eam penetrare, cum alijs  
temporibus quasdam habeat rugas &  
quosdam anfractus, qui ab omni frigoris  
iniuria illum possunt tueri. Altero autem  
modo flatus in utero colliguntur pro con-  
sensu aliarum partium, præcipue verò je-  
coris, ventriculi, intestinorum, quotiescunq;  
huiusmodi partes, vel propter frigidiorē  
intemperiem, vel propter deprauatam vi-  
tus rationem, vel propter aliam causam  
plurimis flatibus redundant, qui facile de-  
inceps cum alijs partibus, tum maxime u-  
tero communicantur. Nescio quid sibi ve-  
lint Paul. 3. c. 70. & Aet. ult: c. 78. qui  
docent, utrum flatibus repleri, sanguine  
intus in grumos concreto. Namq; sanguinis  
grumus



grumus, 'præterquam quod potius causa retinendi quàm efficiendi flatus censenda est, mea quidem sententia alia symptomata, & quidem grauiora quàm flatus posset efficere, sicut aliàs diximus. Sed illud non est prætermittendum, quod itidem Paulus & Aetius docent, huiusmodi flatus quandoq; in vteri cavitare concludi, quandoq; autē in angustis vteri meatibus, adeoq; vteri substantia contineri. Signa inflationis vteri præclarè describuntur ab Hipp. lib. de nat. mulierum, (pag. 301.) si inflati fuerint vteri & venter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & caue faciei partes, color iniucundus fit, menses non fiunt, genitura hoc tempore non fit, mulier anhelat & anxia mœret, & cum surrexerit aut progressa fuerit, rectæ cervicis spiratio ipsam tenet, & quod ederet aut biberit ipsam molestat, & magis ægrè tristatur priusquàm ederet, sæpè verò etiā suffocatur. Quæ ferè eadem sententia, ab illo repetita est 2. de morbis mulierum (p. 368.)

Signa autem à recentioribus tradita ferè  
sunt

Signal



sunt huiusmodi: Imus venter tumet, tenditur, dolore urgetur, digito percussus tanquam tympani sonum edit, caput, thorax, ventriculus, lūbi, pectus, & reliquae partes corporis propè omnes vtero consentientes, aut dolore aut alio symptomate malè afficiuntur. Signa demum quae nos doceant, vtrum flatus in caua parte, an in meatibus & substantia vteri contineatur, ex ijs possunt colligi. Namq; si illi contineantur in caua parte, maior apparet tumor, maiorq; ad tactum tympani sonus, rugitus quandoq; in vtero percipiuntur, sicuti laborantibus intestinis quandoq; euenit. Flatus quandoq; per vterum, seu pudendum cum crepitu excernuntur. Sin autem flatus substantia atq; angustis meatibus vteri cludantur, neq; tantus tumor, neq; tantus sonus, neq; rugitus, neq; crepitus sentiuntur: Sed & dolores fiunt vehementiores, & malum curatu difficilius euadit. Quod si quis verum quoq; cupit intelligere, vtrum vterus morbo proprio, an per consensum aliarum partium laboret, is ante omnia



omnia debet considerare, quomodo partes  
principes, exemp. grat. Iecur, ventricu-  
lus, &c. se habeant. Namq; si illæ frigidiorē  
liqua intemperie sint malè affectæ, ut  
anguinem crudiorē & flatus conficiant,  
atq; non sine ratione coniiciendum est, ab  
his partibus flatum ad vterum transmitti.  
In autem illa nullo morbo laborent, & pro-  
pè fungantur suo munere, tunc pro certo  
abendum est, vterum flatus gignere ac  
proprio morbo laborare. Sed propero ad  
urationem.

Curationem præ cæteris omnibus Hip. <sup>Curatio-</sup>  
videtur præclarè præscripsisse. Cum mu- <sup>nis indica-</sup>  
ier, inquit, sic habuerit, pharmacum de- <sup>tiones.</sup>  
rsum purgans bibendum dato, & calida  
uato, & fomentum adhibeto, & quæ se-  
uuntur. Ex quibus licet colligere illas in-  
dicationes, quæ ad totam huiusmodi ratio-  
nem sunt accommodatæ. Cum enim flatus  
in vtero contineantur, illi sunt discutiendi.  
Sed quoniam istud non licet facere, dum  
ermanet materia, ex qua illi fiunt, quæ nō  
olum in vtero, sed etiam in toto corpore  
potest



Curatio-  
nis praesid.

potest redundare, idcirco haec primum  
purganda est. Quoniam verò frustra no-  
xia materia purgaretur, flatusq; dissolue-  
rentur, nisi prouideretur, ne deinceps gene-  
rentur, postrema sequitur indicatio, quae in  
morborum curatione & sublatione con-  
sistit. Ita q; in curanda inflatione vteri tres  
praecipue sese offerunt indicationes, commu-  
nis totius corporis & vteri purgatio: flatus  
dissolutio, intemperierum & morborum  
vel vteri, vel aliarum consentientium pur-  
gatio. Et quantum ad primam pertinet  
cum maiori ex parte materia, ex qua fla-  
tus in vtero generantur, sit frigida & pi-  
uitosa, haec primum preparanda, & dein-  
de purganda est. Leniatur aluus per hie-  
ram simpl. pillulas aleph. Mel. ros. solut. sin-  
preparantia mel. ros. colatum, syr. de men-  
tha, de beton. de artem. neq; mea sententi-  
ab Oxymelle abstinendum, etsi nonnul-  
aliter sentiant. Decocta sint sem. anisori  
foeniculi, artem. puleg. calam. Sint purgan-  
tia, elect. diaph. indum. hiera logad. b-  
nedic. Nicol. hiera diacolocynth. Trochi-

Alha-



Alhandal cum hiera simpl. (quibus Tro-  
 chiscis pro dyacol. ego vtor) De quibus o-  
 mnibus medicamentis, & eorum exemplis,  
 non semel diximus. Paul. & Aët. mentio-  
 nem faciunt sectionis venæ. Pleriq; omnes  
 docent, hoc remedium in morbo frigido &  
 redundantia humorum frigidorum non  
 conuenire, de qua difficultate sæpè diximus.  
 Vos in hac deliberatione perpetuò attendatis  
 scopos principes, quibus conuenientibus ne  
 timeatis sanguinem mittere. Vno autem  
 vel pluribus deficientibus, à sanguinis mis-  
 sione abstineatis. Verùm ad huiusmodi in-  
 dicationem nullo modo sunt prætermitten-  
 da clysteria, quæ conficiantur ex decocto  
 chamomeli, artem. anethi, ruthæ, bac. lau-  
 ri. sem. anisi, fœnic. cum. vel ex oleo, in quo  
 hæc ipsa prius ebullierint, vt Galenus do-  
 cet, quæ sanè præclarissimam operam præ-  
 stant. Purgato corpore vniuerso, restat,  
 vt ad purgationem & alterationem vteri  
 veniamus, dissolutionemq; flatuum, quod  
 plurima, partim interna, partim ex-  
 terna medicamenta possunt efficere, vbi  
 sunt



sunt confectioes, quas vocant arom. ros.  
diacinam. dianisum, diagalanga, dia-  
calamentum, diaspoleticum, diatrion pi-  
per. elect. de baccis lauri, & quæ cæteris  
omnibus sunt efficaciora, magna antidota  
theriaca, & mythridat. Sunt decocta  
Origani, pulegij, calament. vel alia id ge-  
nus, modo vnum, modò alterum, vt cina-  
mom. rad. Angelica, sem. anis. garyoph.  
per Alembicum destillat. & varias aquas  
conficiunt quæ certe non sunt negligenda.  
Sunt, Syrupi, conseruæ, sunt alia medica-  
mentorum formæ, quas licet cuiq; compara-  
re sibi, ac suo arbitrato modò vnus modò al-  
teris vti, de quibus satis. Medicamenta au-  
tem externa sunt balnea, fomenta, inunctio-  
nes, clysteria vterina, quibus antiqui vte-  
bantur, vt colligitur ex Galeno s. meth. c.  
5. 7. 11. de compos. m. s. l. c. 8. Instru-  
mentum (μντρυχόν) describitur ab A-  
uic. 21. tertij tract. 2. c. 13. Sunt demum  
pessaria, & alia id genus, quæ quidem ex  
ijs, quæ hætenus diximus, facile confici &  
parari possunt, præterquam quod alijs locis  
de



de ijs omnibus non semel mentionem fecimus. Porro hæc omnia, vt antè diximus, possunt nō solum flatus dissoluere, sed etiam vterum purgare, & eius intemperiem corrigere. Quod si tandem hæc frustra adhibeantur, malumq̃ perseueret adhuc: id sciendum, balnea naturalia calida, vt Aponitana & potione, & iniectione, pro stillicidio & omnibus modis, fortè inter cætera omnia principem locum obtinere. Postremò de inflatione vteri consentientibus alijs corporis partibus, non est, vt quicquam dicamus, siquidem certum est, totam hanc curationem pendere ex curatione partium laborantium, quæ singulæ propriam tractationem desiderant.

## CAPVT X.

DE HYDROPE  
VTERI.

**N**ulli dubium esse debet, quin  
sicut flatus, ita etiam aqua in vtero  
Essenti.  
mulie-



mulieris colligatur, quod Hipp. Aet. Avic.  
 & omnes testantur, atq; experientia confir-  
 mat verissimum esse. Namq; plurim.  
 confirmant se in anatome vel copiosissimam  
 aquam in utero collectam vidisse. Et in-  
 ter ceteros est mirabilis historia Vesali-  
 lib. 5. c. 9. de fabrica corporis humani (de  
 liene) de quadam muliere Augustana tex-  
 trice, in cuius utero ille reperit serosam a-  
 quam supra 60. mensuras Augustanas,  
 (quæ singulae pendunt tres libras) nullibi  
 interim circa intestina praesente aqua, aut  
 laxo in pedibus manibusq; tumore, aut  
 etiam viscerum, aut alterius cuiusdam or-  
 gani sese alioquin offerente vitio, (alibi  
 180. libr. repertæ) Huiusmodi morbum  
 Aetius libro ultimo c. 97. hydropem uteri.  
 Avic. 21. tertij, tract. 4. c. 25. aquam in  
 matrice appellant. Sicuti verò nemo  
 dubitat, utrum aqua in mulieris utero pos-  
 sit colligi nec ne: Ita contrà dubium est  
 de loco, utrum scil huiusmodi aqua in  
 cavitate, an substantia & tunicis uteri  
 colligatur & contineatur. Etsi autem plæ-  
 rig

Lous aff.



riq; omnes tanquam manifestum recipiunt, aquam in cauitate gigni & concludi, sicuti in hydrope quoque contingit: tamen altera ex parte istud vel difficile, vel nullo modo videtur fieri posse. Cum enim os ipsius vteri præterquam tempore conceptus satis pateat, verisimile, aut potius necessarium est, huiusmodi aquam sui copia, aut mala qualitate naturam stimulare, atq; exitum sibi querere, ex quo aqua facile & assidue fluente, neq; tumor vteri, neq; alia symptomata, de quibus statim sermonem habebimus, videtur posse consistere.

Hæc res apud Hipp. & Galenum, & alios veteres non est satis explicata. Solus Aëtius videtur difficultatem vidisse, qui scribit: Corpuscula quædam vesicæ fellis similima in vtero generari, in quibus aquosus humor colligitur. Quam quidem opinionem video à plerisque omnibus probari & recipi. Et inter ceteros Mauritius Cordæus Gallus, vir doctissimus, qui edidit com. in lib. 1. Hipp. de morbis mulierum, qui refert historiam mulieris laborantis hy-

V 2                      drope



drope vteri, in cuius cadauere sunt reper-  
tae plurimae vesiculae, non solum in vtero, sed  
etiam ceteris omnibus cavitatibus, corde,  
pericardio, ventriculo, intestinis, renibus,  
vesica, & reliquis id genus, in quibus vesicae  
pendulae conspiciebantur, aqua citrina ple-  
nae, & sine omni foetore, etiam post 20. di-  
em, quas plures quam 80. fuisse. De huius-  
modi vesicis aqua plenis Aretaeus mentio-  
nem facit lib. 2. de affectibus vteri cap. 1.  
qui scribit ad hunc modum: Alia quaedam  
hydropici morbi species agnoscitur talis: in  
ea visiculae quaedam pusillae, crebrae, humo-  
ris plene, in loco ubi Ascites fieri solet exci-  
tantur. Caeterum quod humore multo refer-  
tae sint, illud indicio est, si abdomen perfo-  
raueris, parum admodum humoris effun-  
des. Haecque species haud levis est. Vnde e-  
nim id genus vesiculae eruperint, via non fa-  
cile reperitur. Alij namque affirmant, huius-  
modi ampullas intestina transisse: Ego  
vero id nunquam vidi, ideoque scribendo  
non affirmo. Nam siue ex intestino colo, si-  
ue ex ventre ferantur, qualis sit ipsarum  
genera-



generationis modus, quid dicam, nihil certi habeo. Hæc Aretæus, Sed Galenus etiam 7. Aph. comment. 55. quasdam vesicas aquæ plenas commemorat, quæ in jecore h. e. membrana id ipsum ambiente, solent generari, & in jugulatis animalibus aliquando conspiciuntur. Ex quo loco fortasse licet Aetij & Aretæi opinionem confirmare, ac fateri vesiculas aqua plenas, sicuti fit in jecore, ita etiam in utero & alijs partibus posse fieri. Cæterum utcumq; se res habeat, redeundo ad hydropem uteri, etsi nolo pertinaciter negare, aquam potius in vesiculis quàm in cavitate uteri colligi & contineri, tamen non id puto perpetuo fieri, sed fortè multo crebrius in cavitate eandem concludi. Quod si quis obijciat, huiusmodi aquam aperto ore uteri facile posse foràs erumpere, quod nos quoq; paulò ante notauimus, ad hoc respondeatis cum Galeno 14. de usu part. c. 3. ad finem: collum uteri tantum eo tempore patens esse, cum semen introfertur, vel Embryo extra producitur, alio quocumq; tempore illud nonnullas rugas, plexus

V 3      & con-



& contorsiones habere, quæ multum habent  
 momenti, ut ne, quæ continentur in utero,  
 refrigerentur. Sed illud addo, refrigerato  
 utero, quod statim docebimus fieri, huius  
 frigiditatis propriū est densare & constrin-  
 gere, sicut caliditatis laxare & aperire, ad-  
 modum probabile ac fortè necessarium esse,  
 ut os quoq; uteri adhuc magis densetur &  
 constringatur, adeò, ut aqua non ita facile  
 erumpere possit foras. Hanc rem volui pau-  
 lò longius tractare, quod nemo hactenus sa-  
 tis nodum explicarit. Sed ad reliqua. Qua-  
 tus  
 tenus pertinet ad causas huius affectus, Ae-  
 tius tantum unam videtur posuisse, quan-  
 do menses longo tempore fuerunt suppressi  
 & imprægnatio impedita. Sed ego puto  
 ita magis verè esse habendum, aquam in u-  
 tero propter eandem causam generari, pro-  
 pter quam illa eadem in hydropè commu-  
 nificari solet, nimirum propter intemperiem  
 frigidam, cum partium principalium, præ-  
 cipuè verò jecoris, tum speciatim, uteri ac  
 reliquorum locorum, in quibus diximus su-  
 pra aquam nonnunquam gigni & colligi.  
 Qua-



Quaecunq; igitur possunt siue in vtero, siue in  
 core, ac toto corpore frigidam intempe-  
 riem excitare, qualia sunt aër ambiens,  
 vitus ratio, potiones, balnea, & alia id-  
 enus, quæ refrigerandi facultate prædita  
 unt: Hæc omnia possunt vteri hydropem  
 efficere, hac quidem parte vel proprio mor-  
 o, vel per consensum laborante, inter quæ  
 nihilominus Aetio concedendum est, dia-  
 urnam mensium suppressionem principem  
 cum obtinere, nisi quis velit immoderatas  
 mensium purgationes, abortum, partum  
 difficilem, ac reliquos vteri labores adiun-  
 ere, quæ facile possunt huiusmodi frigidam  
 intemperiem efficere. Quas quidem causas  
 Hipp. breuiss: complexus est lib. 1. de mor-  
 is mulierum (pag. 330.) Hic morbus, in-  
 uit, ex abortu fit, sed etiam ex alijs causis,  
 um menses fuerint occultati. In quibus  
 auctis verbis, ut puto, omnes causæ huius  
 morbi partim internæ, partim externæ  
 comprehenduntur.

Signa Hydropis vteri non minus accu-  
 ratè quàm causæ ab Hipp. tradita sunt. Signa.  
 V 4 Inquit



Inquit enim, si aqua intercusin vteris nascitur, menses pauciores, & pravi fiunt. & ante tempus deficiunt, & imus ventris intumescit, & mammae solidae molles fiunt, & lac malum, & putat se in ventre habere, & ex ijs cognosces, quod aqua intercusin est. Sed & in vterorum osculo significationem de se praebet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet. De quibus signis sermonem etiam habet. 2. de morbis mulierum. Recentiores multa alia signa adiungunt, quae facile omnia ad signa Hipp. adiungi, vel referri possunt. Verum cum hic morbus, quandoque communem & verum hydropem, quandoque naturalem conceptum videatur representare: libet ea signa quoque colligere, quibus positum huiusmodi affectus alteros ab alteris distinguere. Primum igitur signa, quae hydropem vteri à vero & communi hydrope possumus distinguere, ferè nulla sunt precipua. In hydrope vterino paulò ante ex Hippo posito, tumor est minor, & magis inferiore quàm superiore abdominis parte conspicitur.



citur. Iecur vt plurimum vel parum, vel  
 nihil laborat, vterus morbo aliquo, vel pro-  
 prio vel per consensum malè afficitur. In  
 altero autem communi hydrope tumor est  
 maior, magisq; in superiore, quàm in inferio-  
 re parte apparet, vterus vel leuiter, vel  
 nullo modo laborat, jecur malè afficitur ne-  
 cessariò. Quibus quidem signis, si reliqua  
 adjungantur, quæ huiusmodi morbos solent  
 indicare, faciliè vt puto cuiq; licebit,  
 alterum ab altero discernere. Signa au-  
 tem quæ naturalem fœtum à concepta aqua  
 possunt distinguere, fortè facilius & euiden-  
 tius colligi possunt. Sed primùm vos scire  
 velim, quod suprà quoq; diximus, continge-  
 re aliquando, vt mulieres credantur gra-  
 uidæ, quæ temporis progressu depræhen-  
 duntur, vel flatus vel aqua, vel quid simi-  
 le concepisse, nec non vice versa, vt quæ  
 minimè grauidæ censebantur, sed aliqua  
 vteri morbo laborare, tandem hominē pa-  
 riant. Etenim Vincentiæ fuit nobilis ma-  
 trona, quàm obstetrices & medici pro com-  
 perto habebant minimè vtero concepisse,  
 V s quod



quod nullo superiore tempore fuisset graui-  
da, ac ferè semper infirma fuisset valetu-  
dine. Res autem hunc euentum habuit, vt  
vrgentibus doloribus, quos vterinos, vel in-  
testinales opinabantur ac propterea impo-  
sitis nonnullis clysteribus, illa hoc ipso tem-  
pore filiam peperit, quæ etiamnum viuit,  
& plurimos filios progeniuit. Itaq; ne huius-  
modi illusio vos aliquando capiat, diligen-  
ter in hoc vitium incumbendum est. Istud  
plurimi profitentur, se intelligere ac præ-  
dicere ex lotio. Sed isti sunt impostores non  
medici, quod spero me propria tractatione  
de vrinis vobis esse apertè monstraturum.  
Porro hæc signa, quæ legitimũ fœtum à re-  
liquis falsis conceptibus possunt secernere,  
mea sententia nulla certiore ratione haberi  
possunt, quàm si considerentur, quæ præces-  
serunt, & quæ præsentì tempore apparent,  
exemp. grat. Si nullo præcedente aut sequen-  
te morbo & symptomate, menstruæ purga-  
tiones retineantur, si mulier à nonnullis ci-  
bis abhorreat, aliena appetat, terram, ex-  
tinctos carbones, & alia quædam id genus  
aliquan-



aliquando euomat. Hæc ferè sunt certissima signa mulierem vtero concepisse. De quibus signis Hip. s. aphor. 61. & Gal. 5. loc. affec. in fine. Altera autem ex parte, si mulier superiore tempore fuerit malè affecta, si menses retineantur, si superueniat tumor inferiore abdominis parte & alia symptomata, de quibus iam diximus, ex his licet conijcere mulierem, quid præter naturam potius, quàm naturalem fœtum concepisse. Sed Galenus præterea aliud signum commemorat, qui iubet obstetricem vteri cervicem tangere & diligenter considerare, num aliqua adsit durities nec ne. Si non citrà duritiem cervix clausa fuerit, impregnationis indicium est: Si verò cum duritie os cervicis vteri clausum fuerit, malum quoddam in vtero esse indicat. Verùm, ut dixi, hæc sunt admodum coniecturalia, & quandoq; vel optimos medicos fallunt.

Curationem hydropis vteri licet colligere ex Hip. lib. 5. c. de nat. mulierum, qui hæc habet: Cum mulier sic habuerit, calida



Indicatio-  
nes.

da lauare oportet, & dolorem sedare  
pharmacum deorsum purgans bibendum  
dare, &c. Facile autem est, si quis id ve-  
lit hanc rem ad indicationem & methodum  
referre, hunc in modum. Aqua redunda  
in vtero, itaq; illa detrahenda est. Hoc  
non licet facere sine praecedenti corporis  
uniuersali euacuatione. Quare antequam  
aqua de vtero detrahatur, oportet totum  
corporis rationem & prouidentiam habere.  
Sed quoniam frustra aqua de vtero detra-  
hitur, quotiescunq; illa rursus potest colli-  
gi: postremo est prospiciendum, ne illa in  
posterum amplius possit generari, & vte-  
rum occupare. Quamobrem praecipuae  
indicationes curandi hydropis vteri, illae  
sunt:

Prognost.

Prima, purgatio uniuersi corporis, se-  
cunda purgatio aquae in corpore contentae.  
Tertia curatio morborum, à quibus aqua  
originem habet. Vtrum liceat huiusmodi  
indicationibus satis facere nec ne, sciendum  
est, morbum difficilem & periculosum, &  
qui saepe numero ad verum hydropem & in-  
teritum



ritum mulieres adducit. Sed singulas  
 indicationes & præsidia breuiter perpenda-  
 us. Quatenus ad primam indicationem  
 tinet, recentiores propè omnes probant  
 Auic. sectionem venæ inferioris, qui  
 ea sententia falluntur, siquidem verifi-  
 cabile fortè & necessarium est, non solum in  
 utero, sed etiam in toto corpore humores re-  
 undare crudiores & frigidiores, cum qui-  
 us vix licet sperare vires posse consistere,  
 qd id remedium perferre. Vnde Gale-  
 nus docet 4. de rat. vict. comm. III. in hy-  
 dropse quidem anasarca, sanguinè detra-  
 hendum conuenire interdum, cum scil. morbus  
 cepit ex retentione hæmorrhoidum, vel  
 menstruorum, vel ex alia causa, quæ ple-  
 thoricam affectionem afferat, hydropem ve-  
 tympanitem & Ascitem, neminem per  
 sanguinis missionem sanare ausum fuisse.  
 atq; prætermissa detractio sanguinis,  
 Hip. medicamentis purgantibus agen-  
 dum est, quæ humores frigidos & pituito-  
 sos, præcipuè verò aquam possint detrahe-  
 re. Ad leniendam aluum hiera, &c. est  
 præ-

Præsidia,



praestantissima. Humores ac meatus corporis  
 preparantur, cum melle ros. syr. de be-  
 ton. de arthem. decocto hyssopi, origani, pu-  
 leg. calam. Ad purgationem sunt ac-  
 commodata, Agaricus, Turbith, Elato-  
 rium, succus ireos. Et diaphan. &c. a-  
 quibus saepe. Sic clysteria ex iisdem medi-  
 camentis facta non sunt praetermittenda.  
 Purgato corpore uniuerso, altera succedunt  
 indicatio purgandi aquam ex utero, quod  
 multis modis & praesidijs fieri potest. Primum  
 diuretica medicamenta, quae venarum  
 lotium prouocant, semina fœnic. dauci, pe-  
 trosel. gentianæ, rubæ, trind. &c. optima  
 sunt, docente Galeno s. Meth. 3. Eluere im-  
 quæ utero continentur, vel per aluum, vel  
 per lotium opportunis. deriuari. Deinceps  
 sunt balnea vel artificiosa, vel naturalia  
 quæ calefaciendi, siccandi, & detergen-  
 vim habeant, in quib⁹ vel mulier ad umbilicum  
 cum vsq. sedeat, quale balneum foret  
 decocto fol. & bacc. laur. cardam. cucum-  
 asin. fol. ebuli, Mercurialis, Arthem-  
 Thym. puleg. calam. & similia. Sur-  
 lin.



linimenta ex ol. laurino, lil. alb. de con-  
 le anis. oleum resolutiuum: sunt emplastra  
 ex rad. & fol. ebuli, cucum. asinino, fari-  
 na lupinorum, stercore bouino. Sed empla-  
 strum de baccis lauri hac in re videtur ha-  
 bere insignem prærogatiuam. Verum inter  
 cætera medicamenta imposita & supposita  
 ipsi utero, quæ valeant de ipso aquam tra-  
 here & deducere, præclarissimam operam  
 præstant, qualia potissimum sunt pessaria,  
 quæ ex em. grat. ex succo Mercurialis, cy-  
 lamine, esula, nigella, colocynthide, elle-  
 oro & similibus conficiuntur. Nonnulli  
 præstantur ʒss helleb. albi lana exceptam &  
 utero impositam, protinus plurimam aquam  
 detrahente. Sed ego cæteris omnibus effi-  
 cius puto pessarium, quod ex Elaterio &  
 contusis caricis facile paratur. Quo quidem  
 non sine magno fructu memini aliquando in  
 cuiusmodi casu me vsum fuisse. Itaque his  
 indicationibus aqua ex utero solet purgari. Ad  
 postremam indicationem, quæ nescio quam  
 breui à plerisque prætermittatur, sunt ac-  
 commodata illa præsidia, quæ possunt uteri  
 intem-



intemperiem corrigere. Talia sunt exter-  
na balnea, fomenta, linimenta, suffitus, In-  
terna, Trochisci, conseruae, confect. anti-  
dota, & vno verbo, quae possunt vterum ca-  
lescere & siccare. De quibus non semel  
diximus, vt superuacaneum videatur illi  
eadem repetere. Sequitur de abortu.

## CAPVT XI.

## ABORTVS.

Essentia.

**S**cribit Aristoteles 7. histor. ani-  
mal. c. 4. Caetera animalia omnia sin-  
gulari ac simplici modo partum suum per-  
ficere. Siquidem vnum pariendi tempus om-  
nibus statutum est. Nonnulla breuior  
nonnulla longiore tempore. De qua ite-  
re Aristoteles 10. sect. probl. 11. soli homini  
varium pariendi tempus datum fuisse  
Namq; mulieres, & 7. Mense & 8. & 9.  
parere possunt, quandoq; nonnulla & 10.  
Quam doctrinam Aristoteles, vt opinor, ac-  
cepit ab Hipp. qui scribit ad hunc modum  
lib. a.



b. de Septimestri partu (in Basil. pag. 62.)

Mulieres quodam vitio præditæ sunt, semper dicunt ac testantur, nasci partus septimestres & octimestres, & nonimestres & decimestres, & undecimestres. Non ignoro nonnullos & veteres & recentiores fuisse, qui ostendunt non solum septimo, sed etiam sexto & quinto mense, pariter non solum primo, sed & vsq; ad decimum quartum posterioribus mensibus humanos fœtus & quidem vitales posse produci, quæ disputatio ad meum institutum non pertinet, de qua consiliator differentia 49. Illud enim mihi est satis, partum mulieris, quotiescunq; ille ante congruum & constitutum naturæ tempus deijcitur, qualecunq; tandem id fuerit, intempestiuum ortum, abortionem, vel abortum, siue aborsum nominari. Hip. sua lingua 5. epid. s. 1. comment. 2. in princip.  $\epsilon\pi\omicron\phi\theta\omicron\pi\acute{\alpha}\nu$ , id est, deperditionem vocat Gal. in commenta: imperfectam fœtus emissionem interpretatur. Veruntamen id mihi libet addere ex Aristotele 7. hister animal. c. 3. tunc tantummodo abortum dicendum

X

cendum



cendum esse, postquam conceptus integre factus est, quod septima euenit die. Eo verò foetus, qui ante diem 7. deijciuntur potius effluxiones, quàm abortus nominandos esse, siquidem certum est, ante hoc tempus 7. dierum, ne foetum quidem, neq. Embryonem, sed solum semen in vtero contineri. Quod quidem puto itidem Philosophum accepisse ab Hipp. qui scribit libro de carnibus (p. 60. circa medium) vitam hominis 7. dierum esse, ac genituram vtero exceptam, in septimo die habere, quaecumq. corpus habere debet. Atq. hinc fieri, ut transacta die 7. mulieres abortientes deijciant veluti carunculam. (Testatur se vidisse auctor) quæ in aqua coniecta, si diligenter consideretur, satis demonstrat, & oculorum regiones, & aures, & manus, & manuum digitos, & crura, & pedes, & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum, quod in effluxione Aristotelis ante 7. diem fieri nullomodo potest. Ex quo idem fortè Philosophus eam legem constituit in 7. pol. c. 26. Si viro & mulieri



mulieri matrimonio copulatis nascantur  
 lures liberi, quàm definitum sit, abortum  
 ætui inferendum esse, prius quàm sensus &  
 vita illi inseratur. Quid enim ille, inquit,  
 iurum ac religiosum sit, quid non sensu ac vi-  
 ta circumscriptum ac definitum erit.  
 Huiusmodi affectus, quem iure inter sym-  
 ptomata exeat mutata licet reponere,  
 est longè maximi momenti, ac si quis ali-  
 us capitalis hostis naturæ, cum principa-  
 lem illius operationem, generationem homi-  
 nis impediatur ac demoliatur. Vnde cum mu-  
 lieres admodum frequenter abortiant, adeò  
 ut nonnulli censeant plures abortus, quàm  
 legitimos foetus fieri, facile est intelligere,  
 Medicos quicumq; in tanto discrimine natu-  
 ræ possunt succurrere & auxilium ferre,  
 præ cæteris omnibus de natura ac tota Re-  
 publica benèmereri. Quare in tractationem  
 tam utilem ac necessariam oportet nos di-  
 ligenter incumbere.

Causæ abortus, de quibus omnes tra-  
 ctant, sed admodum confusè, mea senten-  
 tia, commodè in duas internas & externas

Causæ.

X 2

distri-



distribui possunt. Externæ ex omnibus sex rebus non naturalibus possunt colligi, quas certum est, ut docet Galenus c. 85. art. Med. necessario nostra corpora alterare & immutare. Ac primum ratione Aëris potest abortus contingere, si ille vel calidior, vel frigidior, vel humidior, vel siccior fuerit. Ex quo aëris vitio facile est intelligere, fœtus posse alterationem suscipere ac periclitari. Vnde in regionibus vehementer calidis, vehementer frigidis, mulieres facilimè & frequentissimè solent abortire. Sic si anni tempora fuerint inconstantia, neque suam seruent naturam, abortum solent efficere. De quibus est Hip. 3. aph. 12. Si hyems australis & pluuialis fuerit: ver autem siccum & aquilonium, mulieres, quibus partus in ver incidit, ex quacunque causa abortiunt. Siquidem ut Galen. explicat in commento: Corpora humida ac mollia reddita raraque per hyemem, ad internas partes aeris frigiditatem facile admittunt. Vnde infantes, qui longo tempore aëris caliditati assueuerunt, iniuriam superuenien-



inuenientis frigoris nequeunt perferre. Quare  
 subinde calcitrantes & sine ordine se mo-  
 uentes, vteri ligamenta disrumpunt, & im-  
 fortunè deiiciuntur. Quam quidem Hipp.  
 sententiam Aristoteles quoq; iuterpretatus  
 est, & amplificauit 1. sect. problem. 9. Ad  
 aërem mali quoq; odores possunt referri, ex  
 quibus vterus malè afficitur, contrahitur,  
 ac foetum deponit. Et ita nonnulli referunt,  
 mulieres ex malo illo odore extinctæ lucer-  
 næ abortum fecisse. Vnde apud Plinium  
 memorabilis illa est exclamatio lib. 7. c. 7.  
 Miseret atq; pudet æstimantē, quā sit fri-  
 uola animalium superbissimi origo, cum  
 plerunq; abortus causa fiat odor à lucerna  
 extincta. Secundò sunt Alimenta, & po-  
 tiones, quæ possunt non solū generaliter  
 sanguinem improbum generare, ac foetum  
 malum nutrire, sed etiam speciatim abor-  
 tum promouere, si illa fuerint calefaciendi,  
 incidendi, extenuandi facultate prædita,  
 & quæ inprimis solent menses prouocare,  
 qualia sunt aromata omnia, petroselinum,  
 fœniculum, asparagi, saturcia, nepeta, ius

X 3

cicerum



cicerum rubeorum, vina generosa, & i-  
genus alia. Sic altera ex parte nimirum  
parca & restricta victus ratio, potest abor-  
tum facere, quod ita congruo deficiente ali-  
mento, foetus infirmetur & corrumpatur.  
Quod est Galeni s. aph. tom. 31. ad quen-  
modum nonnullae mulieres assiduis ieiunijs  
se macerantes, sua sponte ad eiusmodi cala-  
mitatem deducuntur.

Tertiò succedit Motus & quies. Ad mo-  
tum referenda omnis exercitatio immode-  
rata & violenta, curru, equo, saltu, cho-  
rea, cursu, eleuatione ponderum, casus et-  
iam ab alto, percussio, contusio, cum alia-  
rum partium, tum maxime dorsi & uteri,  
& quae habent eandem rationem. Nam ut  
scribit Galenus 4. aph. comment. 1. Foetus  
cum utero eandem habent proportionem,  
quam fructus cum plantis. Nam sicut fru-  
ctus in prima generatione debilioribus pe-  
diculis continentur, & iam perfecti ferè sua  
sponte decidunt, adeò, ut utriq; ex vehe-  
mentiore aliquo vento facile concidant: ita  
foetus primis potissimum ac postremis mensi-  
bus



bus, ex quo libet violento motu ruptis ligamentis, intempestiuè deijciuntur.

Quartò, est Somnus & vigilia. Quod verumq; 2. aph. 3. si modum excefferit, malum est. Nam sicut somnus immoderatus non solum in capite, sed etiam in cæteris corporis partibus, & consequenter in vtero, facile potest magnam excrementorum copiam coaceruare: Ita immoderata vigilia & nimiam siccitatem, & virium resolutionem & alia multa pericula solent asserre, adeò, vt certum cuiq; esse possit, mulieres quoq; ex immoderato somno & vigilia in abortum iucurrere. In tractatione causarum abortus quinto loco sunt Excretiones & retentiones, quæ inter cætera omnia maximè ad abortum possunt facere. Ac primū quatenus ad excretiones pertinet, est sanguinis missio ex vena, de qua est apud Hip. aph. 5. part. 31. Mulier grauida sanguine ex vena misso abortit, ac præcipuè, si fœtus grandior fuerit, quod tamen decretum multi hoc tempore non recipiunt, qui contendunt tantum abesse, vt missio sanguinis abortū  
X 4 faciat



faciat, ut magis sæpè numero abortũ possit  
præcauere. De qua controuersia duo verba  
dicam in curatione. Quod verò de sectio-  
ne venæ ab Hipp. dictum est, idem mea sen-  
tentia de omni sanguinis missione vel pro-  
fusione, ex quacunq; parte corporis ille pro-  
fluat, naribus, hæmorrhoidibus, & simili-  
bus, præceteris tamen omnibus ex utero,  
statuendum est. De qua uteri purgatione  
Hipp. & Gal. in 5. aph. 60. nec non Ari-  
stoteles 7. histor. animal. c. 2. mentionem  
faciunt. Deinde sunt purgationes per al-  
uum, de quibus itidem Hipp. 5. aph. 35.  
Mulieri grauidæ, si aluus plurimum pro-  
fluat periculum est, ne abortiat. Quam-  
quidem purgationem & fluxionem alui ego  
interpretor non solùm, quæ sponte fit, sed et-  
iam ac muleo magis, quæ perficitur à pur-  
gantibus medicamentis, quod certum est  
non solùm soluta aluo, sed etiam excitata  
in signi corporis commotione & perturbatio-  
ne abortum posse facere. Atq; hinc factum  
est, ut Hipp. grauidis mulieribus inter-  
dixerit medicamentis purgantibus, præter-  
quam



quam si materia turgeat, quæ tamen non illis concedit omnitempore, sed tantum in 4. mense ad 7. vsq. Etsi Galenus 1. Epid. section. 3. comment. 30. tertium quoque mensem voluit addere, qui interpretans hunc ipsum aph. scribit: fœtum trimestrem & quadrimestrem præter cæteros iniurijs resistere. Si immoderati vomitus, sudores, vno verbo, ex quacunq; parte, quæcunq; immoderata euacuatio fiat, abortus causa censenda est, quod hac ratione congruo & necessario alimento priuetur, neq; solum superflue euacuationes, sed altera quoq; ex parte immoderate retentiones abortus causæ statuendæ sunt, quæ quidem vnum possint esse multiplices, ac multis modis fieri, manifestum est præ cæteris omnibus retentionem mensium hac in re principalem locum obtinere. Postremò etiam sunt Alterationes animi de quibus non est longius agendum, siquidem nemo est, qui non quotidie experiatur illas in nobis mirabilia ac penè incredibilia efficere. Itaque nulli debet mirum videri, si mulieres

X s

quoq;



quoque ex nimio timore, terrore, dolore, tristitia, voluptate, letitia, ira, indignatione ac reliquis animi perturbationibus in abortum incurrant. Atque hactenus de externis causis, ad quas, ni fallor, reliquæ omnes si quæ à nobis sunt prætermisæ, facile possunt referri.

Causæ autem internæ rursus dupliciter constitui possunt, vel ex parte mulieris, vel ex parte fœtus. Ac primum quatenus a muliere, est corporis habitus vel crassior, vel extenuatior quàm conueniat, de quo Hippocrates 5. aph. 45. Quæcunque præter naturam extenuata, vtero abortiunt priusquam crescant, id est, priusquam reficiantur et ad mediocrem corporis habitum redeant. Quo in loco mihi libet vos admonere, Galenum verborum aphorismi, præter naturam extenuatam, præter naturam extenuatam, duplicem interpretationem proponere. Alteram, quæ fuit Numidiani Medici celeberrimi & Quinti auditoris, nempe ut mulier grauida præter se ipsius naturam sit extenuata. Alteram, ut extenuatio sit insignis & præter modum, ut ea verba magnum quendam excessum signi-



significant. Volente Hip. nobis insinuare  
 mulieres non mediocriter, sed vehementer  
 extenuatas abortire. Quam vtramq; inter-  
 pretationem ille inquit, non carere repre-  
 hensione, etsi in sequenti comment. 46. po-  
 steriorem magis probare videtur. Hip. autem  
 in lib. de superfœtatione (pag. 68. circa me-  
 dium) de conceptu mulieris verba faciens  
 priorem interpretationem amplectitur, qui  
 scribit ad hunc modum: Mulier quæ præ-  
 ter naturam crassa est & pinguis, non con-  
 cipit hoc tempore. Quæ verò ex natura ta-  
 lis est, horum gratia concipit, si non aliud  
 quicquam eam impediat. Quæ sanè inter-  
 pretatio magis videtur rationi consentire.  
 Etenim si mulier fuerit suapte natura, vel  
 extenuata, vel crassa, nihil ferè prohibet,  
 quin illa possit fœtum concipere & absolue-  
 re, quod frequenti experientia comproba-  
 tum est verissimum esse. Contra verò si ex-  
 tenuatio vel obesitas præter mulieris natu-  
 ram fuerit, longè verior & evidentior cau-  
 sa reddi potest, quam ob rem illa neq; con-  
 cipiat, neq; ad maturitatem fœtū producat.

Deinde



Deinde est insignis plenitudo vel cacochymia, quacumque ratione fuerit coaceruata ex qua quidem humorum copia & viti certum est, foetum suffocari, corrumpi, ne possit ad perfectionem peruenire. Præterea sunt morbi omnes, siue communes toti corpori ut febris, siue proprii alicuius partis ut ventriculi, jecoris & similium. Sed præ cæteris omnibus sunt morbi ipsius uteri, de quibus Hipp. 5. aphorif. 30. mulierem gravidam capi ab aliquo morbo acuto, lethalem esse. Nam expositore Galeno in commentis & vehementia morbi, & ea tenui victuratione, quæ alioquin necessario instituerenda est, certum foetui, vel interitus vel abortus periculum videtur imminere. Si mulieres morbis diuturnis laborantes, vel aliter valetudinariae, aut difficilè, aut nullo modo possunt foetum benè & ad maturitatem usque conservare. De propriis vero uteri morbis est idem Hipp. 5. aph. 43, Si mulieri gravida fiat in utero Erysipelas, si lethale. Galenus autem in comment. fateatur Erysipelate in utero existente, foetum mor



iori ex necessitate, & dignum esse in-  
 quitione, vtrum vtero inflammatione labo-  
 ante, foetus aliquando viuere possit. ¶ Con-  
 tituit igitur magnam differentiam inter  
 erysipelas & inflammationem) Sed aduer-  
 sus hanc Hip. & Galeni sententiam ex eo-  
 dem Hip. videmur colligere, neq; Erysi-  
 pelas in vtero grauidæ esse prorsus lethale,  
 ut in libro de nat. mulier. (pag. 290. cir-  
 ca medium) huiusmodi mulieribus & vi-  
 us rationem, à qua foetus non corrumpa-  
 er, & alui lenitionem instituit, nihil alio-  
 quin adhibiturus, si morbus planè foret le-  
 thalis. Vtūq; autem sit, mea sententia  
 est Erysipelas, quo fortasse tanquam exem-  
 plo vsus est Hipp. & inflammatio, & re-  
 qui tumores, & omnes morbi vterum oc-  
 cupantes tempore conceptus, summa cum  
 ratione præcipui abortus causæ statuendi  
 sunt. Ratio est manifestissima. Imò ve-  
 dè apud Auic. & reliquos autores propè o-  
 mnes, tanquā abortus causæ monstrantur  
 morbi, non solum tumores, vlcera, & cæteri  
 in mala compositione & soluta vnitæ, sed  
 etiam



etiam intemperies, adeò, ut ex qua libet  
 vteri intemperie simplici, composita, cum  
 & sine materia, abortus possit originem ha-  
 re.. Quod quidem maximè conuenit ra-  
 tioni, ac posset demonstrari, si id quam fa-  
 cile esset ac foret necessarium. Præter hæc  
 alia etiam causa est, quam indicat Hippo-  
 eodem s. aphorij. 44. & 55. de extenuati-  
 Quæcunq; tenues sunt, aut neq; plus iustè  
 abortiunt sine manifesta occasione tertio  
 mense, his vteri acetabula plena mucore  
 sunt, neq; possunt propter pondus fœtus  
 continere, sed rumpuntur. Quæ quidem  
 causa etsi ad superiores facile potest referri,  
 tamen nullo modo fuit prætermittenda  
 quod videatur peculiarem quandam abor-  
 tus differentiam complecti, quæ certam  
 quoq; cognitionem & prouidentiam requi-  
 rit. Res autem ita se habet. Si contingat  
 mulierem moderato corporis habitu prædi-  
 tam secundo aut tertio mense abortire, nu-  
 la præcedente manifesta occasione ex plur-  
 bus quæ supra fuere propositæ: tunc scien-  
 dum est, quod cotylidones seu acetabula



d est, ora vasorum, quæ ad vterum per-  
 veniunt, esse plena mucoris, id est, lenti &  
 vituosi humoris, ex quo illa redduntur la-  
 ta, mollia & imbecilla, adeo, vt rumpan-  
 tur necessario, atq; nequeant fœtum contine-  
 re. Demum verò Hipp. docet abortum  
 fieri propter vitium vteri, per hæc verba,  
 lib. 1. de morbis mulierum (pag. 320. cir-  
 ca medium) sed & ipsi vteri naturas ha-  
 bent, quibus abortum faciant, cum sint fla-  
 uosi, densi, magni, parui, & alij his simi-  
 lia. De flatibus vteri Auic. quoq; memi-  
 nit. Etsi dixerunt quidam, inquit, quod  
 sit plurimum abortus ex ventositate, & ve-  
 ritas est iste sermo, quos quidem flatus, mea  
 sententia, propter multas evidentes rationes  
 negandū non est, posse abortum facere.  
 Sed dubium est de magnitudine & paruita-  
 te vteri, propter quæ vitia nonnulli contem-  
 nunt, abortū nullo modo fieri posse. Sed  
 notandum præter locum Hip. supra citatū  
 de morbis mulierum, in lib. quoq; de super-  
 ætatione (pag. 68. in fine) eandem senten-  
 tiam haberi, nimirum, propter nimiam  
 parui-



paruitatem vteri quandoq; abortus fieri. Cum ijs autem quæ aliter sentiunt est clariss: Mercurial. qui pro sua opinione adfert huiusmodi rationes. I. Quod Galen. Auic. Albertus & alij scriptores nullum de huiusmodi causis, nimirum magnitudine & paruitate vteri, verbum fecerint. II. Quoniam clarissime, sicut explicatum est à Galeno & Auenzoare, vterus à naturali fabricatus est, ut semper vsq; ad perfectionem partus possit extendi. III. Quoniam angustia vteri potest quidem augmentum & magnitudinem fœtus, sed non vitam auferre, quod nonnullis exemplis catulorum comprobatur Aristotelis autoritate & Rasis, & Rabi, qui docent illos vasis angustis conclusos paruos quidem euadere, sed vitam seruare. Ad Hipp. verò respondet Mercurialis lib. de sterilitate & superfœtatione, in quibus hæc tradita sunt à discipulis Hipp. non ab ipso Hipp. editos fuisse, atq; illos propterea tanquam legitimos recipiendos esse. Ego verò aliter censeo, quoniam puto vterum naturam vsq;



vsq; adeò magnum vel paruum fieri posse,  
 vt ille propterea nequeat fœtum diutius re-  
 tinere. Et quoniam Mercuria: potiss: de  
 paruitate disputat, mihi quidem minimè  
 à ratione alienum videtur, fœtum vtero  
 angusto conclusum, & propter loci angusti-  
 am, & propter parua & debilia ligamen-  
 ta, & propter exiguitatem alimenti, &  
 fortè propter alias causas non posse perfici,  
 & vsq; ad partus integritatem deduci. Sed  
 ad Mercurialis argumenta respondendum  
 est. Et primò, quod neq; Galenus, neq; A-  
 uic. neq; Albert. neq; cæteri scriptores de  
 huiusmodi causis mentionem faciant, præ-  
 termisissis Alberto, & huius familiæ homini-  
 bus, quibus ego parùm studeo & faueo.  
 Equidem scio Auicennam manifestè vtran-  
 què causam, & magnitudinem, & paruita-  
 tem vteri commemorare, qui hæc habet in  
 ca. 8. Abortum fieri propter causam ma-  
 tricis de amplitudine oris eius, & parui-  
 tate adunionis eius, & quæ sequuntur. Sed  
 fortè neq; à Galeno fuerunt prætermisissæ, qui  
 3. fac. nat. c. 12. de facultate expultrice

Y

verba



verba faciens & modum explicans, quo illa  
ad agendum excitatur, ac veluti exempla  
accipiens facultatis expultricis ventriculi,  
vesicae, uteri, speciatim docet: utrum  
partim in partu naturali, partim in abor-  
tu propter tres causas ad expellendum fœ-  
tum excitari, qui scribit ad hunc modum:  
Offensionis triplex est causa, aut nimia  
moles, aut pondus aliquod, aut morsus.  
Moles, ubi uterus amplius extendi non to-  
lerat: pondus, cum supra vires eius sit, quod  
continet: Morsus, ubi vel humores, qui  
prius in membranis continebantur, in ute-  
ro sunt effusi, vel etiam totus partus corru-  
ptus & putris, tunicam uteri irritat &  
mordet. Hæc Galenus: Ex quibus ni fal-  
lor, licet aperte colligere, illum hoc quoque  
paruitatis vitium uteri non ignorasse. Se-  
cundo, etsi libenter fateor utrum fuisse  
à natura fabricatum, ut ille commodè us-  
què ad partum posset dilatari ac fœtum fo-  
uere: tamen neque id mihi negandum est,  
mulierem quandoque usque adeò angusto utero  
posse conformari, ut ille tam & tam diu  
possit



possit extendi, quàm & quàm diu naturalis  
 fœtus requirit. Quod si nonnullis contingit  
 in primo ortu sortiri quasdam corporis par-  
 tes ita angustas, vt illæ propterea morbo  
 secundum magnitudinem laborent, sicuti  
 de ventriculo, vesica, hepate scribit Gale-  
 nus se vidisse in hominibus atq; obseruasse  
 arte Medica c. 71. 72. 73. quid prohibet  
 quin idem nobis liceat de vtero affirmare.

Tertio nolo id contendere, vtrum an-  
 gustia vteri possit augmentum quidem &  
 magnitudinem fœtus, non itidem vitam  
 auferre, quod fortè alicui vel difficile, vel  
 nullo modo fieri posse videbitur. Sed illud  
 addo, fœtum in angusto vtero non solum  
 propter defectum alimenti, sed etiam pro-  
 pter incommoditatem loci, propter exili-  
 tatem & debilitatē ligamentorum, & fortè  
 propter alias causas posse abortire. Postre-  
 mò neq; id ago in præsentia, vtrum libri de  
 steril. & superfœtatione sint Hipp. legitimi  
 nec ne? Sed illud scio, quem locum paulò  
 ante notavi, hoc ipsum quoq; legi in lib. de  
 morbis mulierum, cuius quidem libri tan-  
 X 2 quam



quam Hip. legitimi meminit Galenus 4. aph. c. 2. s. aph. comment. 36. & 45. Et haec de internis causis abortus ex parte mulieris. Quatenus autem pertinet ad internas causas ex parte foetus, Avic. unam tantum videtur posuisse, nempe propter illius mortem, propter aliquam causarum mortis eius. Etenim tunc natura insurgit, foetumque tanquam rem non modo inutilem, sed etiam perniciosam conatur quam primum expellere. Verum quid prohibet, quo minus non liceat alias quoque non minus evidentes causas adiungere, quales praecipue mihi succurrunt, infirma foetus valetudo ac debilitas, siue ea primum natura, siue posterius aliquo morbo contracta fuerit, foetus nimia moles, vel multitudo, ac potissimum in mulieribus, quae pusillo sint corpore ac teneris annis concipiunt. Namque si quis haec consideret, is forte facile fatebitur, nec huiusmodi causas fuisse praetermittendas, atque ex illis quoque abortum fieri posse. Tales ergo sunt causae abortus, partim externae partim internae, tam ex parte mulieris,



is, quàm ex parte fœtus, De quibus lon-  
 gius agendum non est. Sed præter has cau-  
 sas sunt etiam aliæ, quæ apud mulieres ab-  
 ortû producere aptæ sunt, vt: si in rebus  
 non naturalibus, vel aliàs intemperanter vi-  
 uat, fœtum corrumpet. Nam & cibus cor-  
 ruptionis causa est, & potus multus. Sed  
 & ipsi vteri naturas habent, quibus abor-  
 tum faciant, cum sint flatuosi, densi, magni  
 parui, & his similia. Si mulier in vtero  
 habens, ventrem aut lumbos doleat, formi-  
 dare oportet, ne fœtum per abortum edat,  
 Sunt etiam quæ fœtus corrumpant, si acre  
 aliquid, aut amarum ederit, aut biberit  
 præter consuetudinem, dum adhuc paruus  
 est puerulus. Sic scribit Galenus s. aph.  
 com. 45. Mulieres abortire sine manifesta  
 occasione febre vehemente, & alui fluxione,  
 vel profluvio sanguinis, vel Erysipelate in  
 ipso vtero constituto, vel saltu gravidæ mu-  
 lieris vehementiore, vel clamore, vel mœ-  
 rore, vel ira, vel timore, vel victu parcio-  
 re, vel tali aliqua actione, seu passione.  
 Quibus quidem causis alias quoq; adiungit

T 3

3. Epid.



3. Epid. s. 2. com. 8. Timorem propter alicuius horrendæ rei inspectionem, vehementem dolorem, insignem crudelitatem, alimenta medicamentosa, vel medicamenta omninò abortiua, sanguinis missionem ex vulnere, hæmorrhoidibus, utero, qui quidem duo Galeni loci si coniungantur, fortè causas abortus præcipuas vel omnes continent, quæcunq; à nobis diuersa dispositione propositæ sunt. Hactenus de causis abortus, de quibus neq; id mihi libet silentio præterire, nonnullas reperiri mulieres, quibus vel propter robur naturæ, vel propter firmitatem seminis muliereis, vel propter alias causas fetus tam arctè & solidè alligatur, ut non solum ex nulla externa causa non abortiant, sed etiam multis administratis rationibus purgantibus medicamentis, sectione venæ, & alijs id genus, quæ abortum solent excitare, à quibus improbi medici quandoq; in gratiam alicuius nolunt abstinere, nunquam possunt abortire, quod experientia confirmat verissimum esse, (Nouit auctor mulierem quæ  
inte-



integram libr. assumpsit argenti viui vt abortiret, sed frustra) Signa abortus descriuntur ab Aetio l. vlt. c. 19. aquosa primum uacuatio, deinde saniosa & cruenta, aut peluti lotura carniū: Tum purus sanguis, deinde grumi, ac demum foetus. Quae quidem signa sicut ex vna parte sunt manifestissima & certissima: ita ex altera nullam propè afferunt utilitatem, quia vel proximè imminentem vel praesentem abortum significant, quando non licet mulieri subsidium aliquod afferre. Itaq; medicus alia signa diligenter debet attendere, quae mulieri ante solent abortum significare, vt opportunè possit imminenti periculo prospicere. Haec autem plurima sunt. Ac primum est Hip. s. aph. 37. Si mulieri grauidæ mammae repète extenuentur, abortit. Ac rursum s. aph. 38. Mulieri grauidæ geminos ferenti, si altera mamma extenuetur, alterum abortit, & si dextra marem, si sinistra foeminam. Ratio autem propter quam mammae extenuatae futurum abortum portendunt, explicatur à Galeno in comment.

Y 4

Sed



Sed accuratius 14. vsu part. 8. qui docet, mammillas contrarijs affectibus necessariò comprehendì, repleri quidem lacte antequàm tempus in fœtus imbecillitate, graciles autem fieri in vteri penuria : Siquidem tunc oportet existimare fœtum validum esse, alimentum autem copiosum non habere, ac propterea plurimum quidem ex communibus vteri venis sanguinem trahere, & in hoc mammillas graciles fieri, paulò autem post abortire, Ex parte deficiente alimentò, cum fœtus alimentũ appetens calcitret, moueatur, stare loco nesciat, tandemq; ligamenta quibus ligatur, perfringat, & ante tempus egrediatur. Deinde sunt aliqua quædam signa, quæ item generaliter abortum solent antecedere: Dolor dorſi & laterum, quod vterus ijs partibus copulatus sit, & ligatus, fœtus si viuit, vix mouetur, grauitas concipitur circa pudenda, ipso fœtu ad partes infernas ferè propendente. Lumbi & coxæ grauitatem insolitam habent, & non nisi cum labore mouentur. Sed ante omnia sedulò animaduertendum est, an præ-



præcesserit aliqua ex causis siue externis  
 siue internis, quæ abortum possunt inferre,  
 de quib<sup>9</sup> satis diximus. Namq<sup>3</sup> si huiusmo-  
 di causæ & signa simul jungantur, vel o-  
 mnia, vel aliqua, tunc quasi certam fidem  
 facere possunt abortum secuturum esse.  
 Neq<sup>3</sup> verò est vt longius quæramus & re-  
 feramus signa, quæ singulas causas possunt  
 demonstrare. Externæ faciliè omnibus fi-  
 unt manifestæ. Internæ ex cognitione sin-  
 gulorum morborum, vel vteri, vel alia-  
 rum consentientium partium possunt colli-  
 gi. Quæ quidem signa ex proprijs locis la-  
 borantibus petenda sunt. Veruntamen non  
 sunt postremo loco prætermittenda signa,  
 quæ demonstrant mortuum fœtum, vel saltē  
 imbecillum esse, cum sint longè maximi mo-  
 menti & ad rem præsentem faciant. Ea  
 tradita sunt ab Hip. his verbis lib. de super-  
 fœtat. circa principium, Cum puer mortuus  
 fuerit, cum alijs signis id coniectare licet,  
 tū præcipere, vt aliquando mulier in dex-  
 tro latere jaceat, aliquando in sinistrum  
 transmutet. Puer enim in vtero translabi-

Y s

tur



tur eò, quò mulier se vertit, velut lapis vel aliud quippiam, si mortuus fuerit, & pedinem frigidum mulier habet. Et iterum in primo de morbis mulierum (pag. 321.) Quibus mulieribus grauidis circa septimum vel octauum mensem de repente mammarum & ventris plenitudo collabatur, & vbera gracilescent, ijs & lac non appareat: his dicendum est puerum aut mortuum esse, aut viuere & debilem esse. His autem cum recentioribus licet adungere animi deliquia, syncopes, conuulsiones, dolores, sudores frigidos, nauseam, vomitum, & vno verbo omnia symptomata, quaecumque ductis in consensum principibus partibus, ex. grat. corde, cerebro, ventriculo, solent oriri. Quae quidem experientia confirmat, vel omnia, vel plura, foetum mortuum coniectare. Haecenus de natura, de causis, de signis ab-

Curatio-  
nis indica-  
tiones &  
praesidia.

ortus. Itaque id restat vt de illius curatione aut potius ac verius praeseruatione, sermonem habeamus. Quatenus ad motum & quietem, sicut ex omni parte mulieres probant, ab omni exercitatione & saltu quoque abstine-



bstinere, à quibus certum ferè abortus pe-  
 riculum videtur imminere: ita ex altera  
 multi iubent mulierem in omni quiete per-  
 manere, vt nullo vnquam tempore ne pa-  
 rum quidem & leuiter moueatur. Quod  
 anè consilium ego nunquam potui probare  
 quidem vix aliter videtur fieri posse, quin  
 in tanto ocio multæ generentur cruditates  
 & excrementa, quæ & foetui, & mulieri  
 lurima ac graui pericula possunt inferre.  
 De qua re videatis Philosophum 7. pol. c.  
 6. qui omninò cupiens prouidere, ne mu-  
 lieres vtero gerentes nimio otio & desidia se  
 dedant, scribit in hunc modum: Oportet  
 mulieres grauidas suorum corporum curam  
 habere, ne desidia sese dedant. Atq; hoc fa-  
 cilè assequetur scriptor legum, si eis iter ali-  
 quod quotidianum ad cultum Deorum in-  
 unxerit ac mandârit. Itaq; in mulieribus  
 grauidis ego quidem omnes violentos motus  
 improbo: Sed neq; perpetuum otium ac  
 quietem probo, qui censeo moderatas exerci-  
 tationes oportune factas, & foetui, & matrî  
 multis modis posse prodesse. Sic reliquis  
 externis



externis causis prospiciendum est, ex quibus mihi libet tantummodo de sanguinis missione & purgantibus medicamentis verba facere pauca, quod supra pollicitus, cum saep numero utrumque praesidium in consultationem veniat, ac maximas difficultates contineat.

Iam diu agitata est controuersia inter Medicos, utrum liceat aliquando mulierem grauidam ad praecauendum abortum venarum incidere, & inter ceteros Altomarus de huiusmodi argumento integrum libellum conscripsit, qui acerrime contendit, id nunquam licitum esse. Alij vero aliter sentiunt. De qua quidem cum nolim longius agere, sufficiat in praesentia meam sententiam proferre, in qua partim ratione, partim longiore experientia usque ad hunc diem con-  
gor persistere. (alius locus Aristotelis 4 gen. anim. 6. in quo Philosophus tantum facit vitam grauidam, ut velit illas propter hanc potissimum causam & difficilius uterogere & difficilius parere) In sectione

ven



enae & purgatione mulierum grauidarum  
 ea est sententia: In grauidis quaecunq;  
 el propter nimiam congestam humorum  
 lenitudinem, vel propter morbum acutum,  
 nginam, pleuritidem, febrem continuam,  
 rsimiles, facile possunt abortũ facere, mis-  
 onem sanguinis secta vena, tanquam re-  
 medium necessarium recipiendum esse. Cum  
 nim periculum fortè certissimum non so-  
 um abortus, sed etiam mortis & fœtui &  
 natri videatur imminere, præcipuè verò  
 n morbis periculosis, ac fortassis tota salutis  
 bes in hoc solo remedio sit reposita. Equi-  
 lem censeo, ex consilio Cor. Celsi, cuius  
 Galenus meminit, aliquando satius esse  
 udxilium anceps experiri, quàm nullum.  
 Sed illud addo, hoc præsidium, non solum si-  
 ne periculo, sed etiam cum maxima utili-  
 tate administrari, qui verè vobis possum  
 testari, nonnullas mulieres, quæ ex nimia  
 aggregata sanguinis copia frequenter ab-  
 ortiebant, neq; vlla ratione vsq; ad legi-  
 timum pariendi tempus poterant conceptũ  
 cōtinere, hoc singulari consilio plurimos de-  
 incept



inceps filios, & quidem vitales feliciter peperisse, plurimas autem varijs morbis acutis laborantes, non solum primis, sed etiam postremis mensibus à morte, abortu, & omni periculo liberatas euasisse. Atq; inter ceteras, quod maxima notatione & admiratione dignum est, ego memini me aliquando tribus mulieribus, iam non unam semper vterum gerentibus venam secuisse: Primam, quæ feбри pestilenti laborabat. Alteram, quæ grauissima destillatione ad thoracem malè afficiebatur, Tertiæ, cui propter idum & contusionem maxima in oculo fuerat inflammatio excitata, quæ omnes superstites fuerunt ac filios pepererunt, quæ etiam nunc viuunt. Quod si quis nobis obijciat Aphor. Hipp. docentem: Mulierem gravidam misso sanguine ex vena abortire varij interpretes varia proferunt, vt Hippocratis auctoritatem tueantur, quàm labefactum piaculum est. Plurimæ omnes aiunt illam integram & vsitam suo tempore venæ sectionem intellexisse. Alij huiusmodi res medicas non perpetuam veritatem continere

Al



lij aliter docent. Ego verò puto Hipp.  
 non generaliter, absolutè atq; omninò sectio-  
 nem venæ mulieribus gravidis interdixi-  
 sse, sed potius voluisse medicos reddere cau-  
 ti, ut ne temerè & sine magna considera-  
 tione audeant gravidis venam incidere. Id  
 quod mihi videor, partim ex forma huius-  
 modi orationis & verborum, partim ex ra-  
 tione posse colligere. Namq; Hipp. non sim-  
 pliciter, sed cum comparatione loquitur:  
 Mulieres secta venæ eò magis abortire,  
 quo fœtus grandior fuerit. Quod si in gra-  
 vidis nullus superesset locus sectioni venæ,  
 et tunc nihil erit opus hac comparatione. At  
 verò, sicuti vulgare est apud Grammati-  
 cos, cum comparativum supponat positi-  
 vum, hinc licet colligere, quandoq; gravidis  
 secare venam. Etenim si maius im-  
 minet periculum abortus, quo fœtus est  
 maior, ac propterea magis à venæ sectione  
 abstinendum est, vel contrà minus pericu-  
 lum immineat cum fœtus est minor, mi-  
 nusq; à venæ sectione cavendum sit, fa-  
 ciendum necesse est. Sed ratione quoq; licet  
 hoc



boc ipsum confirmare : siquidem causa propter quam, Galeno etiam interprete Hipp. prohibet sectionem venæ, illa est quia veretur ne alimentum fœtui subtrahatur. Quod si mulier fuerit, vel admodum succi plena, vel plura accipiat facile & bene nutrienda alimenta, vel sanguis parum ce detrahatur, adeò, ut sperandum, sit minime alimentum fœtui esse defuturum : iam nihil amplius videtur obstare, quo minus sanguis detrahi possit. Itaq; de Apuleio Hipp. hæc nostra est sententia, quam retinebimus donec melior occurrat.

Postremo loco nonnulli quaerunt, utra evacuatio in gravidis, an per sectionem venæ, an per medicamenta purgantia, sit magis periculosa? Ego verò quicquid alii respondeant unico verbo ita sentio: sectionem venæ, si opportunè ac non sine iudicio adhibeatur, nullum periculum, sæpè numeratam insignem utilitatem: Contra purgantia medicamenta nullam unquam utilitatem insignia pericula semper afferre. Quam quidem rem inter ceteros Auerr. prælarè mihi videtur.



videtur definiſſe, 7. coll. 4. qui hæc habet:  
 Dicit Hip. Mulier prægnans non debet phle-  
 botomari, niſi quando Embryonis virtus  
 fuerit fortis, id eſt, à quarto menſe uſquẽ  
 ad ſeptimum, ſi humores fuerint impuri, &  
 pharmaciam concedit tunc. Ego autem di-  
 co, quod phlebotomia quando ad eſt reple-  
 tio, qua Embryo non indiget, non eſt mala,  
 ſed pharmaciam non credo ad bonum finem  
 peruenire: imò neceſſariò lædit Embryonẽ,  
 eò quod in ſe ſubſtantiam habet veneno-  
 ſam, & fortassis faciet malos humores flue-  
 re ad Embryonem, vt ipſum lædant, & quæ  
 ſequuntur.

Poſtremò autem neq; id prætermitten-  
 dum eſt, vt mulieres grauidæ, quantum  
 fieri poteſt, ab omnibus perturbationibus  
 animi ſibi caueant. Mirum enim quàm fre-  
 quenter & facile propter huiusmodi cauſas  
 contingat illas abortire. Itaq; ſi occasio  
 & tempus ferat tonitrua, fulmina, corru-  
 ſcationes, terræmotus, decet illas admonere,  
 vt ne ex improuiſo huiusmodi ſtrepitus &  
 terrores præſentiant. Idem de bōbardis, tubis

Z

G



& omni violento strepitu dicendum est.  
 Sic ab omni horrendo spectaculo abstineant.  
 exemp. grat. mortis violentæ, rixarum,  
 vulnerum, vno verbo, ab omni metu, hor-  
 rore, timore, dolore, ira, & qualibet insigni  
 perturbatione debet carere. Sed ad inter-  
 nas causas. Et primum ex parte mulieris  
 de quibus certè non omnibus, sed nonnullis  
 maioris momenti sermonem habebimus,  
 sicuti de causis externis dictum est. Cum  
 autem hæc ratio curandi mulieres suo ipsa-  
 rum vitio propensas, ut abortum faciant,  
 dupliciter possit considerari; vel antequam  
 utero gerant, vel postquam gravidae factæ  
 sint. Illud ego quidem generaliter sentio  
 longè commodiorem, & tutiorem medendi  
 rationem esse, quando mulier nondum con-  
 cepit, cum altera ex parte post conceptum,  
 aut difficilè, aut fortè nullo modo ea possint  
 remedia adhiberi, quæ vel corpori uniuers-  
 o vel alicui parti, potissimum verò ipsi u-  
 tero valeant prospicere. Namq; exem. grat.  
 Si mulier habeat corporis habitum præter  
 modum, vel plenum, vel extenuatum, si  
 aliqua



liqua laboret intemperie, vel alio mor-  
 o capitis, ventriculi, jecoris, & omni-  
 m maxime vteri, vnde abortus videatur  
 imminere: quando fieri potest, vt medi-  
 cus, vel de communi corporis vacuatione  
 alioquin necessaria, vel de cæteris accom-  
 modatis præsidijis quicquam probè statuere  
 possit? Non ignoro Auic. 21. tertij, tr. 2.  
 ap. 10. 11. in hora quoq; imprægnationis  
 larima agere (quando est grauida) adeò  
 ut neq; abstineat ab hiera Galeni, à pilulis  
 ætidis, à clysteribus mundificantibus ma-  
 tricem, &c. Quæ sententia nullo modo mihi  
 videtur recipienda, qui censeo hoc tempo-  
 re, hæc non solum importunè administrari,  
 sed etiam summam pernitiem & fœtui &  
 mulieri posse afferre. Verum enimvero,  
 cum tempus ante vteri gestationem altero  
 possit conceptum longè oportunius videri  
 possit, tum neq; alterum prorsus negligen-  
 dum est. Iam igitur aliquid de medica-  
 mentis præcauentibus abortum ratione cau-  
 sarum dicamus, omisissis superfluis. Quoniam  
 si velimus circa omnes causas externas ver-



sari, de quibus supra diximus: res foret  
longissima. Ideo unicam tantum causam  
tractabo, atq; illius curationem tradam,  
quando uteri acetabula sunt plena mucori.  
hoc est, pituitosi ac lenti humoris, quæ po-  
tissimum ab Hipp. posita est, & propter  
quam plerunq; mulieres solent abortum fa-  
cere. Nam quantum pertinet ad corporis  
habitum, plenitudinem, cacochymiam, in-  
temperiem, & reliquos morbos, cum reli-  
quarum partium, tum potissimum uteri, &  
reliquas causas si quæ sunt id genus  
illud unum mihi sufficiat dixisse, curatio-  
nem horum morborum & symptoma-  
tum ex proprijs fontibus petendam esse.  
De quibus maiori ex parte in publicis le-  
ctionibus diximus, neq; pertinet hic longius  
de ea re agere. Si igitur contingat mu-  
lierem abortire, quod uteri vasa sint hu-  
midiora ac plena humoribus frigidis ac pi-  
tuitosis, Hipp. præclare tradit signa, quibus  
liceat huiusmodi affectum cognoscere  
nec non rationem, qua possimus illum cu-  
rare, qui scribit ad hunc modum de natu-  
ra mu-



mul. (p. 292. in princ.) & primo de morb. mulierum, (pag. 339.) Si acetabula pituita plena fuerint, corrumpetur fœtus, ubi ortior factus fuerit. Cognosces autem hoc nodo: humidum fit & viscosum ac mucosum defluit, &c. Qui statim curationem ubiungit per purgationem primùm vniuersi corporis, deinde vteri, ac demum per medicamenta, quæ possint vterum calefacere, siccare & corroborare. A quidē Hip. Aëtius inter ceteros, hanc ipsam curandi rationem accepit, qui hæc habet lib. vlt. c. 21. Has mulieres oportet curare per medicamenta pituitam ducentia, totū corpus vacuando, & quæ sequuntur, &c. Nos itaque horum vestigia persequentes, hac ipsa methodo hanc curationem totam instituemus. Et primùm ad totius corporis vacuationem, redundantes vitiosi humores primū preparandi, mox purgandi sunt. Id quod in gratiam juniorum commodè ijs medicamentis fieri posse videtur. Ante omnia licet aluum lenire, quæ ex aloë conficiuntur, qualia sunt hiera simpl pill. aleph.

Z 3

cum



cum melle ros. sol. manna, mox instituenda sunt medicamenta, quæ attenuandi incidendi, abstergendi facultate sunt prædita, ut syr. beton. hyssop, &c. cum oxymel. & decoctis pulegij. Demum purgandum El. Indæ, diaphæn. hiera pachij, ex Agar. Turb. &c. biduum vel triduum à lenitione alui nullo modo est prætermittenda sectio venæ, si modò conueniant principes scopi. Quod quidem remedium multis modis confert. Vena autem incidenda, vel incubito, vel in cruribus, pro ut vna vel altera indicatio, aut reuellendi, aut deriuandi videbitur postulare. Sed tamen id perpetuò cauendo, ne menstruis purgationibus aliquod impedimentum inferatur. Quod si vobis vnica purgatio non videatur satis esse, licet illam repetere, interim adhibitis concoquentibus & præparantibus medicamentis, quæ prioribus sunt efficaciora, ex. gr. syr. de artem. & similibus. Purgato corpore vniuerso, ad purgationem vteri veniendum est, quod pessaria præ cæteris omnibus medicamentis commodè præstant, quæ  
confi-



conficiantur ex colocynthide vel Trochis.  
 Alhand. Turbith, agarico, hiera, & simili-  
 bus, quæ ad pituitam trabendâ sunt accom-  
 modata. Demum verò ad illa præsidia ve-  
 niendum est, quæ possunt vterum cale-  
 facere, siccare, roborare, in quo certum est,  
 totius curationis summâ consistere. Huius-  
 modi autem præsidia plurima sunt, partim  
 interna, partim externa. Interna qui-  
 dem, conseruæ Maioranæ, melissæ, florum  
 rosmarini, betonicæ, saluiæ, flor. lauendu-  
 læ, flor. garyophyllorum. conf. diacymini, di-  
 ambra, diacalamenth. dianis. diamarg.  
 cal. elect. de gemmis. Sed his omnibus, ve-  
 buto, magna antidota Theriac. & Myth.  
 sunt longè efficaciora. Cæterum medici hoc  
 tempore pro huiusmodi indicatione præ cæ-  
 teris omnibus præsidijs duobus vti solent, ut  
 sunt: aquæ medicatæ calidiores potissimum  
 sulphuræ & nitrosæ, ut Aponitanæ & A-  
 quarianæ. Deinde sunt decocta ligni chinæ,  
 sarsæ, sassafra, sed maximè omnium de-  
 coctum chinæ, quæ sanè duo præsidia, si cum  
 ratione & opportunè adhibeantur præclaris-  
 simam



simam saepè numero operam solent præstare. Externa autem sunt lotiones, iniectiones, linimenta, suffumigia, pessaria, quæ uno verbo ex ijs medicamentis sunt conficienda, quæ calefaciendi, siccandi facultate sunt prædita: Artemis. menth. camomil. origano. calamenth. cynamom. garyoph. myrrha, styrace & similibus, de quibus semel atq; iterum diximus. Sed neq; demum illud prætermittendum est, aquas medicatas calidiores non solum potione, sed etiam balneo atq; iniectione fortè inter cætera omnia externa præsidia principem locum obtinere. Atq; hætenus de ratione tractandi mulieres antequam utero concipiant, ne deinceps in abortum incurrant. Ratio autem præservandi mulieres iam gravidas ab abortu, potissimū versatur circa causas à quibus abortus videtur imminere. Itaq; ab omnibus externis periculis & occasionibus de quibus iam diximus, sedulò cauendum est. Et inter cætera, quod nunc mihi in mentem venit, mulier gravis accommodata vestimenta gerat, ac maximè omnino abhor-



abhorreat commune illud munimentum,  
 quod ex tabulis ligneis fortè etiam fer-  
 reis durissimum conficitur, ac mulieres ad  
 corporis venustatem, ad vsq; pudenda ge-  
 stare solent. Quo quidem abusu præ cæ-  
 teris omnibus Venetæ delectantur. Etenim  
 vix potest aliter fieri, quin uterus præter  
 modum comprimatur, foetus non solum debi-  
 to incremento priuetur, sed etiam veluti per  
 quandam compressionem importunè deijcia-  
 tur. Si aliqui urgent morbi, vel veteres,  
 vel superuenientes, si fieri potest, optima  
 in primis victus ratione & leuioribus qui-  
 busdam præsidijis decet illos curare, cum alia  
 omnia remedia potissimum purgantia me-  
 dicamenta & sectio venæ sint suspecta, vt  
 supra diximus, nec sine magno periculo  
 possint administrari. Itaq; si alius fuerit  
 adstricta, communibus clysteribus ex iure,  
 saccharo, oleo, vel leuissimo aliquo medica-  
 mento agendum est, ac præ cæteris omni-  
 bus cum Cassia, quam Actuarius medicinã  
 prægnantium vocat. Si verò morbi fuerint  
 acuti & vehementiores, cum vndiq; & foetui,

Z s

&amp;



& matri periculum immineat, iam liceat  
medicis ad valentiora praesidia deuenire, &  
mea sententia potissimum ad venae sectionē,  
de qua satis dictum est. Veruntamen illud  
generaliter perpetuò memoria tenendum  
est, multo fidentius ac minore periculo mu-  
lieres grauidas tractari medijs mensibus à  
quarto vsq; ad septimum, quo tempore pur-  
gantia illis quoq; concedit Hip. si materia  
turgeat, quàm primis & postremis, quo v-  
troq; tempore, quantum fieri potest, ab o-  
mni medicatione & motione abstinendum  
est. Quod si demum grauidæ mulieri  
periculum abortus proximè videatur im-  
minere, & quasi instare, vt iam ligamenta  
incipiant rumpi, atq; vel aquosa, vel cru-  
enta ex vtero fluere, plariq; omnes varijs  
praesidijs partim internis, partim externis  
solent opem ferre. Inter medicamenta  
interna duo sunt praecipua & in vulgari v-  
su, Alterum sunt corallia rubra in puluerē  
reducta, Alterum est granum illud tin-  
ctorium cuius Dios. lib. 4. c. 43. & Galen.  
7. s. m. meminerunt: vulgò Kermes dicitur,  
quod



quod in ovo sorbili exhibent addito thuris  
 pauco, vel mastiche, quæ sanè optima sunt.  
 Sed præterea sunt nonnulla, quæ ab occulta  
 proprietate videntur præseruare, vt pul-  
 uis cancrorum fluuiialium, coagulum lepo-  
 ris, cinis corij erinacei terrestris, puluis  
 Erinacei marini. De quibus Aet. lib. vlt. c.  
 21. & plurimi mentionem faciunt. Inter  
 externa sunt linimenta, emplastra, cerata,  
 quæ insigni adstringendi facultate prædita  
 sunt, ac dorso imposita creduntur posse la-  
 xata solidare. Ac duo pariter sunt in com-  
 muni usu: Alterum est vnguentum de  
 cort. castanearum, Montagnanæ senioris.  
 Alterum est vnguentum comitissæ Vari-  
 gnanæ, quod ab illo descriptum est lib. 16.  
 suæ pract. c. 14. & miris laudibus celebra-  
 tur. Horum imitatione possunt fieri lini-  
 menta ex ol. cydon. mast. myrtillorum, bo-  
 lo Armeno, corallijs, & similibus, de qui-  
 bus longius agendum non est. Sed præte-  
 rea quoq; nonnulla quæ exterius adhibita,  
 & varijs partibus suspensa possunt abortum  
 impedire Aetites, lapis in vtero aut corde  
 aut



aut intestinis ceruarum repertus, granum  
tritici intra panem repertum, lapis Sardo-  
nius, de quibus Aet. & alij. Verum postre-  
mo hoc loco illud praeceptum addo, in quo  
multi errant circa administrationem prae-  
sidiorum externorum, quae insigni adstrin-  
gendi facultate praedita sunt, admodum  
caute & prudenter agendum. Namque  
importune adhibeantur, quo tempore iam  
propè de foetu actum est, possunt naturam  
impedire, & pericula asferre plurima.

## CAPUT XII.

## DE DIFFICILI

## PART V.

Essentia,

**S**I uteri fabricam memoria repe-  
ramus & consideremus, quomodo fieri  
possit, ut illud os, pars tam angusta usque  
adeò aperiatur, ut possit foetibus facilem ex-  
itum praebere: mirari possumus usu part. I.  
7. intelligere non possumus. Etsi verò pro-  
pter hanc & alias causas nulla mulier sine  
dolor



dolore & difficultate pariat, quæ pœna pro-  
 pter crimen violatæ obedientiæ a Deo pri-  
 mæ matri constituta est, nobis in præsentia  
 statutum est, eam tantum partus difficul-  
 tatem tractare, quæ est præter naturam,  
 ob quam sæpè mulieres & fœtus maximis  
 periculis subiciuntur, quod non euenit re-  
 liquis auimantibus, teste Philosopho 7. hi-  
 stor animal. 9. Quomodo fiat partus na-  
 turalis declarat Galenus 3. nat. fac. 12. 2.  
 sympt. caus. 3. qui docet, huiusmodi opus  
 esse naturalis facultatis & expultricis vteri:  
 cuius sanè expultricis irritationis Galenus  
 triplicem causam affert, nimiam molem,  
 aut pondus, aut morsum. Igitur quemad-  
 modum si vterus molestia excitatus con-  
 gruo tempore fœtum expellit, negotium na-  
 turale est, atq; ad facultatem naturalem  
 expultricem huius partis attinet: Ita alte-  
 ra ex parte, si fœtus congruo tempore non  
 possit deponi, hoc præter naturam est, atq;  
 inter symptomata exeuntia immutata de-  
 bet reponi, quando id retinetur, quod ne-  
 quaquam retineri debuisset. Necesse tamen  
 prius



**Causa.** prius est huius causas cognoscere, quæ omnes ad tria præcipua capita referuntur, nempe ad mulierem, ad foetum, ad res externas. Itaque ex parte mulieris redditur partus difficilis, si illa fuerit imbecilla scribente Galeno s. aph. 55. ad bonum & facilem partum robur mulieris necessario requiri. Quam quidem imbecillitatem cum *Ætio. l. ult. c. 22.* licet interpretari, vel corporis, vel animi, vel utriusque, ut si mulier aliquo morbo laboret, vel diuturno, vel difficili, si nimium defatigata, si largiore & parciore quiete usa fuerit, si nimio angore, ira, timore, pudore, mæstitia afficiatur. Vnde primùm parturientes solent difficiliiores partus edere, & quæ rarius pariunt magis dolent, ex *Hipp. lib. de nat. foet. (p. 46. in medio)* Præterea partus fit difficilis propter imbecillitatem, si mulier nimium tenera aut prouecta ætate concipiat, adeò ut in partu nequeat viriliter agere. Hac omnia imbecillem possunt mulierem reddere & animo & corpore, & ita difficultatem adferre. Præterea ratione vul-

ua,



, si os vteri nimis exiguum vel angu-  
 tum fuerit, id quod multis modis contin-  
 git. Primum naturali magnitudine aut  
 perpetuitate vteri, statura corporis, vel æ-  
 tate, vel quomodocunq; brevis & imbecillis,  
 ubi verisimile, vterum quoq; corporis par-  
 tibus respondere. Redditur etiam os vteri  
 angustum aliquo morbo, vel primo ortu  
 vel posterius genito, vt si illud sit vel obli-  
 quum vel distortum, si aliqua membrana,  
 varuncula, inflammatio, abscessus vel ali-  
 quis tumor illi adnatus fuerit, si propter  
 inguiorem corporis habitum, vel aliud  
 proximum impedimentum v. g. lapidem,  
 vel lotium retentum in vesica, duriora alui  
 excrementa, tumescentes hæmorrhoidas os  
 vteri comprimentes, vt commodè nequeat  
 dilatari. Ad quæ duo capita cætera omnia  
 ad mulierem pertinentia faciliè possunt re-  
 ferri. Ex parte fœtus redditur difficilis.  
 Primum si forma & situ vel non naturali,  
 vel non multum naturæ familiari exitum  
 querat, Pro quo sciendum ex Galeno 15.  
 suæ part. 7. formam naturalem prodeuntis  
 fœtus



fœtus esse, ut primum capite distentis brachijs ad genua in lucem veniat. Cæteras formas, exem. grat. Si obliquus, aut transversus, aut pedibus paret egredi, si alterum crus vel altera manus ante caput prius demittatur, non sine utriusq; periculo, & rariores esse. De quibus inter cæteros tractat Eucharis quidam Rhodio Medicus, ut puto Germanus, diffusè & accuratè cum figuris pictis venetijs anno 36. Cæterum Gal. hanc sententiam de partu naturali primum capite prodeunte accepit ab Hippocrati i. de morbis mulierum (pag. 322. circa medium) sic scribit: Si partus tempus iam adfuerit ac dolor perseveret, & a multum tempus mulier puerum edere non possit, omnino obliquus aut in pedes procidit, Utile autem est in caput procidere, &c. Sicut enim si quis in vas olearium angustioris oris nucleum immittat, nec fas est illud obliquum extrahere, sic sanè etiam mulieri accidit. Quam ferè eandem sententiam habetis lib. de nat. pueri (pag. 13. i. prin.) Quam sententiam credo Aristotelem accepisse.



accepisse ab Hip. 7. histor. animal. 8. omnes  
 partus secundum naturam in caput fieri,  
 contra naturam in pedes, &c. Cur autem  
 præcipue in caput fiat, docet Philosophus 4.  
 gen. animal. 9. istud commune esse omnibus  
 animalibus, ac fieri propterea, quod partē  
 supra vmbilicum maiorem habeant, quàm  
 inferiorem, & ponderosiores, ut tanquam  
 in statera pendentes eò vergant, quò tra-  
 huntur: quàm ille ab Hip. accepit ac suo  
 more dissimulauit, ex loco citato verbote-  
 nus. Secundò fit difficilis ratione fœtus, si  
 illi plures fuerint, cum simul vno tempore  
 collo vteri illabantur, atq; alter alteri sit  
 impedimento, quo minus singuli possint fa-  
 cile produci. Namq; sciendum est ex Phi-  
 losopho 7. histor. animal. 4. quod reliquis  
 animalib⁹ pariendi tēpus certū, soli homini  
 incertū à natura constitutū est: Ita etiā quod  
 pertinet ad partū numerosum, cetera anima-  
 lia nonnulla singulos tantum, nonnulla plu-  
 res fœtus suapte natura parere consueuisse,  
 solū genus humanum esse in ancipiti, quod  
 singule mulieres singulos ut plurimum  
 Aa pari-



pariant: Sed quandoq; etiam, ut praesertim  
in Aegypto, duos vel tres, etiam quatuor  
& plures generent, ut Philosophus referat  
quandam 4. partub. viginti foetus edidisse.  
Vnde & illud ex eodem Philosopho notan-  
dum, quod in reliquis animantibus diuersi  
sexus foetus simul nutriantur, seruenturq;  
melius, quam vnus sexus: In homine hoc  
rarius accidit, ut diuersi sexus foetus simul  
conseruentur, quod ratio & experientia  
edocuit. Praeterea foetus partus difficulta-  
tem adfert, si fuerit foemina, si praeter na-  
turae institutum fuerit maior aut minor to-  
to vel parte aliqua ac potissimum capite,  
si fuerit monstruosus vel biceps, si morbosus  
ac male affectus, omnino vero maxime,  
si mortuus fuerit. Contra vero, si foetus fue-  
rit mas, moderatus & naturalis ac bona va-  
letudine praeditus. Huc potest etiam re-  
ferri consideratio membranarum, quibus  
foetus inuoluitur. Nam si propter vel ni-  
miam earum crassitiem, & soliditatem  
congruo tempore non rumpantur, vel  
propter earum tenuitatem & exilitatem  
citius



ius laxentur quàm oporteat: tunc neces-  
 sario partus difficilis succedit, siquidem ni-  
 uiusmodi membranae rumpantur, foetus  
 illo modo potest extra uterum prodire,  
 ut contra, si nimis tempestiue laxentur,  
 quo casu insignis humiditatis copia ex-  
 ero profluit, adhuc maior pariendi ac-  
 cidit difficultas: Siquidem docet Galenus  
 de usu part. c. 5. huiusmodi humores ad  
 virtus facilitatem mirum in modum con-  
 rre, siquidem verisimile & necessarium  
 est, collum uteri hac ratione mollius &  
 nplius fieri, ex quo deinde foetus multo  
 cilius egreditur, quàm si deficiente humo-  
 eadem partes angustiores reddantur. Po-  
 remò redditur difficilis ratione extrinse-  
 rum causarum, qualis præcipue est aer,  
 si quidem, si fuerit præter modum cali-  
 us & frigidus, hac in re plurimū momenti  
 ebet: siquidem nimius calor vires dissol-  
 it, maior verò frigiditas adstringit mea-  
 us. Vnde etiam notauit Auic. mulieres  
 ymedifficilius parturire, quod idem de re-  
 ionibus frigidis statuendum est, mea sen-

Aa 3      rentia,



tentia. Ad res externas potissimum refer-  
solent, lotiones, balnea, &c. quæ abste-  
gendi facultatem habeant, sed multo ma-  
gis si desint bonæ obstetrices, quæ Philo-  
phus inter cætera 7. histor. animal. cap. 1  
vult esse ingeniosas, perspicaces ac intelli-  
gentes. Pariter si etiam commoda eius tor-  
mina & cætera omnia desint, quæ ad fa-  
cilitatem partus necessario requiruntur.  
Itaq; hæ sunt omnes causæ, quæ partum di-  
ficile possunt reddere, ad quas, ni fallor, cæ-  
teræ omnes, si quæ sunt à nobis prætermisse  
sine difficultate referri poterunt.

Signa.

Signa quæ facilem & difficilem partum  
possunt prædicere, plurima sunt. Aristote-  
les hæc habet 7. histor. animal c. 9. Mulie-  
res quibus aluum tormina vehementer ex-  
ercent, ocysimè pariunt, quæ lumbos dolent  
vix pariunt, quæ imum ventrem, expeditius  
pariunt. Cuius quidem rationem rea-  
di posse puto, quod quæ mulieres circa dor-  
sum & lumbos dolent, signum sit ligamenta  
esse firmiora, & quæ non ita facile possunt  
disrumpi. Quæ autem circa ventrem, a  
mul-



multo magis circa pubē dolore afficiuntur,  
 num sit iam rupta esse ligamenta & fœtū  
 exitū properare. Quod profecto signū  
 ipsa & experientia confirmat esse veris-  
 sīmū, si mulier fuerit adueta difficiles par-  
 tes edere, si fuerit admodū tenera ætate, pu-  
 lo corpore, si vel natura vel præter natu-  
 ram fuerit imbecilla, si fœtus fuerit gran-  
 or, vel non vnicus, quod potissimum ex  
 modico ventre solet cognosci, si fuerit im-  
 cillus & malè affectus, quod præcipuè ex  
 ardo motu cognoscitur, si fuerit mortuus,  
 quibus signis iam supra diximus. Demū  
 exteriora desint oportunè præparata. Ex  
 omnibus licet colligere partum fore dif-  
 ciliore. Quod si res contrario modo se habe-  
 t, sperandū est, partū fore faciliore. Cete-  
 rum neq; id est ignorandū, à partus difficulta-  
 te multa, & graua pericula, & mulieri &  
 fœtui imminere. Auc. 21. tertij tract. 2. c.  
 2. scribit, si partus fuerit difficilis 4. die-  
 bus, tūm fœtū mori necessariū. Ex quo per-  
 uadet medicos sollicitos esse de vita matris,  
 neq; in vita fœtus occupari. Imò verò stu-

Aa 3

dendum



dendum, ut ille quomodocumq; extrahatur. Et praeterea ex insigni illo conatu muliere quadoq; incurrunt in malā tussim, sputum sanguinis, & quod frequentius contingit, in apertione peritonaei, unde hernia intestinal corripuntur. Addūt nonnulli frangialiquādo ossa illarū partium, & totā partē infernam ab ano vsq; ad pudendum laxari & ulcerari, Sed haec omninò, si vera sunt, rarius contingunt. Itaq; venio ad curationē.

Curatio.

Totam curationē difficilis partus mihi videor in duas partes praecipuè posse dividere: Quarum altera cōmunia quaedam praecpta & remedia complectatur, quae generaliter ad omnem partus difficultatē sunt accommodata: Altera singulas causas consideret, & unicuiq; propria remedia adhibeat. Quae rursus utraq; pars in duo tempora commodè potest distribui, Primum antequam mulier ad pariendi actum perueniat, Secundum, quando mulier in campum descendit ac mox foetum esse paritura. Itaq; primum consideremus quaecūq; generaliter ad omnem partus difficultatem

priorē

Generalis  
ante partū.



riore tempore ante partum videtur perti-  
nere. Tota autem hac res in probò vsu &  
regimine sex rerũ non naturalium consistit.  
Quamobrẽ mulieres vtero gerentes, omnem  
eris excessum potissimum verò frigidiorẽ  
aueant, qui multis modis multa incommo-  
la & pericula potest inferre. Vnde ma-  
ximè expedit in aère temperato, vel etiam  
a ulò calidiore illas versari. Victus ratio  
sit alimentorum boni succi, facilis coctionis,  
quæ potius ad quandam humiditatem & co-  
biam, quàm siccitatem & inopiam vergat.  
Qualia forent carnes optimæ, capones, gal-  
linæ, vituli, hædi, iura pinguis & similia,  
quæ emolliendi, non tamen aperiendi vim  
habeant: moueantur moderatè, nullo mo-  
do prorsus quiescant, vt aliàs declaravi-  
mus. Imò verò transacta prima parte no-  
ni mensis etiam quoquo modo licet illas ve-  
hementius moueri ambulatione, curru, as-  
censu, & descensu scalarum. Vnum fami-  
liare & vulgare est apud omnes, vt mu-  
lieres hoc tempore dissoluant fila, quod opti-  
mum est, cum ita partes dorsi & ligamen-



ta leuiter & blandè laxentur, vt postea facilius oportuno tempore laxentur, ac rum-  
pantur: Somni sint longiores, ex quibus  
constat corpora nostra molliora & laxiora  
reddi. Sicuti contrà vigiliæ solent eadem  
ficcare & densare. Caueant omnem re-  
pletionem & quotidie tum duriora alui ex-  
crementa, tum reliqua omnia purgentur,  
vel natura, vel leni aliqua euacuatione. Coit<sup>us</sup>  
qui fortè ad hunc locū potest referri, non o-  
mni ex parte prætermittatur, scribente  
Aristotele 7. histor. animal. ca. 4. eas mu-  
lieres, quæ paulò ante partum concumbunt  
facilius parere consueuisse, quod naturæ pe-  
ritis facile potest concedi. Mulier demum  
paritura caueat ab omni perturbatione ani-  
mi, timore, mœrore, ira, solitudinibus.  
Itaq; sint omnia læta, sit bono animo, benè  
speret, quod certè experientia demonstrat  
ad partum reddendum faciliorem magnū  
momentum habere. Cæterum neq; vsus  
quorundam remediorum ante partum im-  
portunus est censendus, quæ potissimum eò  
spectent, vt omnes partes vteri ac meatus  
hume-



tumefiant ac laxentur, quale foret decoctū  
 ex rad. Alth. Maluæ Artemis. fœn. græci.  
 em. lin. vel si illud vultis esse efficacius, ex  
 bacis vel folijs lauri, dictam. calam. & si-  
 milibus, quo partes infernæ lauentur & fo-  
 ueantur, quale foret linimentum ex oleo  
 Amygd. dul. cham. & similibus, quo licet  
 totam vteri regionem, & intra & extra in-  
 ungere ac fouere. Multi solent probare e-  
 potionem ex oleo communi, amygd. dul.  
 le m. lini. Quod sanè constat posse & omnes  
 muliebres locos mollire, & partū facilem  
 reddere. Verum in his & cæteris præsi-  
 dijs, quæ ore assumuntur, ego censeo admodum  
 cautè incedendum esse, atq; id præcipuè ca-  
 uendum, vt ne aliqua noxa inferatur ipsi  
 ventriculo, sicut ego sentio olei potionem  
 posse inferre. Atq; hæc quidem sunt præ-  
 mittenda, quò ad præparationem, quo fœtus  
 scilicet edatur. Quod si iam fœtus sit eden- In partu  
 dus, ipseq; partus instet & vrgeat, opus est  
 medicamenta quædam præparata in pròptu  
 habere, quorum beneficio non parùm præ-  
 gnans & parturiens adiuuari possit, ita ta-  
 Aa s men



men, ut minimè mittatur ea, quæ ars ipsa  
 recta q̃ methodus præmittenda esse suadet,  
 Cuius mihi iam longo usu & ratione ex-  
 plorata medicamenta sunt usitata. ex.gr.  
 Recip. dictam. Cret. Aristol. rot. long. pu-  
 legij ana ℥s Cinam. Croci ana gr. Xij. con-  
 tundantur omnia subtilissimè f. puluis, qui  
 exhibeatur cum vino vel cum aliquo deco-  
 cto oportuno, exem. grat. cicerum rubeorū,  
 pulegij, petroselini. Hoc loco mirandum  
 est, quomodo Mercatus, Mercurialis, &  
 alij vtantur cortice cassiæ fistulæ ad par-  
 tum, de quo errore inter cæteros agit Leoni-  
 cenus l. 4. de Plinij & aliorum med. errori-  
 bus c. 2. Sic conueniunt linimenta, pessaria,  
 suffumigia, & quæcunq̃ ad prouocanda mē-  
 strua prolata sunt. Sic etiam nonnulla,  
 quæ latente quadam ratione, & occulta, ut  
 aiunt, proprietate possunt partum reddere  
 faciliorem, ut si mulier teneat raagnetē in  
 manu sinistra, si femori apponatur lapis Ae-  
 eites, si fiat suffumigium ex ungula asini, si  
 dextro cruri alligetur coralliū, radix origa-  
 ni, cyclam., cor gallinæ & similia, In quib⁹  
 referen-



referendis nolo tempus perdere, cum liceat cuiq; apud varios auctores consequi. Ego verò aut parùm aut nihil soleo illis fidẽ adhibere. Sed Hipp. vnum cõmemorat præsidium, quod nullo modo est pratermittendum, etsi neminem video illius meminisse. Est autem sectio venæ inferioris, Scribit in hunc modum I. de morb. mul. (pag. 340. ad finem) Si verò prægnaans multo tempore cohibeatur & parere non possit, sed diebus plurib<sup>9</sup> ex partus dolore laboret, sin autem iuuenis & in vigore & multo sanguine referta, secare oportet venas in malleolis & sanguinem detrahare viriũ respectu habito, quod quidem remediũ ego sentio rationi, ac probæ medendi methodo conuenire ac præstantissimũ esse. Sed distinctius ad singulas causas veniamus, quæ triplici ex ordine fuerunt dispositæ, nempe, vel ratione mulieris, fœtus, & rerum externarũ. Si igitur difficilis sit partus ratione mulieris, quod sit illa imbecilla vel corpore, vel animo, omnibus modis iuuanda animo & corpore consolanda, refocillãda. Quamobrẽ alimẽta

Particula-  
res.



& potiones faciles & optimi nutrimenti sunt offerenda, quibus spiritus & vires possint reuocari, iura optima, oua sorbilia, panis imbutus vino oderato, aut succo granatorum. Omnis timor, omnis verecundia se moueatur, & quantum fieri potest, robur illis addendum, ut discant res patienter ferre spiritum cohibere, & ad infernas partes pel-  
lere. Quo tempore minimè sunt prohibenda ne clament, quod imperitæ obstetrices face-  
re solent, cum expediat illas clamare omni conatu, si os uteri nimium angustum fuerit inuestiganda illius causa, illudq; omni in-  
genio laxandū, aperiendum. Si claudatur propter excrementa retenta alui vel lotij, hæc molliter educantur, si propter tumorem & dolorem hæmorrhoidum, ijs etiam oportuna remedia adhibenda. Quod si difficul-  
tas partus exoriatur ratione fœtus, quod maiore ex parte solet euenire, primum si il-  
le non exeat forma naturali, de qua iam di-  
ximus, Hip. nos docet in lib. de nat. pueri ut rursus intromittatur delapso capite ela-  
tis pedibus, ut si fieri potest, secundū natu-  
ram



ram exeat in caput. In quo sanè experientia & ratione constat maximum periculū contineri. Quod si demum fœtus mortuus fuerit, omni studio conandū est illum quam primum educere, ne sœua symptomata aut mors subsequantur. Et huius rei remedia sunt tam interna, quàm externa, imò ea omnia quæ de mensib<sup>9</sup> mouendis diximus, vt lotiones, fomenta, confectiones, conseruæ pul. pil. decoct. &c. quod si omnia frustra fiant, ad manus operationē est accedendū, excisionē, &c. Quam rem præter Hip. prius nemo tradidit 1. de morb. mul. (pag. 336.) Quicumq<sup>3</sup> fœtus manus aut crus protendunt optimum foret extrudere & ambas partes in caput vertere. Si vero hoc fieri non possit, secare oportet h. m. Sed hæc operatio est plena periculi, cuius rei in mea praxi p̄ 40. annos tantū tres vidi, quæ tamen omnes p̄rierunt. Sed necessitate cogente, antequā operationem aggrediatur, ex præcepto Aetij lib. vlt. ca. 23. diligenter animaduertat, quomodo mulier se habeat. Nam si illa fuerit vehementer imbecilla, quod plerunq<sup>3</sup> ferè



ferè fit, abstinendum, ne mors errori impu-  
tetur, deploratos prognosticis relinquendo.  
Ad factum ipsæ quoq; pertinent membrane,  
quæ si propter crassitiẽ non possint rumpi  
quibusdã leniorib<sup>9</sup> frictionib<sup>9</sup> & linimentis  
agendum cõf, exemp. grat. ol. amygd.  
d. lil. alb. cham. quæ possint illas laxare &  
extenuare. Deinde si ante congruũ tẽpus  
laxentur, & profluant illæ humiditates, quas  
Galen. docet ad facilitatẽ partus facere,  
tunc omnes vteri partes internæ & externæ  
omnibus modis potissimum à larga olei ad-  
ministratiõne sunt perfundendæ, & sic mol-  
liendæ, humectandæ, ac laxandæ. Postremò  
extrinseca omnia, aër, cubiculum, obstetri-  
ces, sint commodè preparata, de quibus  
longum esset dicere.

## CAPUT XIII.

## DE PVERPERIO.

Naturalis  
partus,

**P**Artum vel facilem vel diffi-  
cilem sequitur puerperium, nempe illud  
tempus, quo mulier recens peperit siue marẽ  
siue fœminam quæ propterea puerpera dici-  
tur,



r, de qua nobis postremo loco dicendū est.  
 si enim nonnullæ sint, quæ ferè nihil labo-  
 rant, sed statim redeunt ad suas operatio-  
 nes, tamen coguntur vt plurimū decumbe-  
 re propter imbecillitatem viriū, id quod illis  
 venit, partim propter laborem pariendi,  
 partim propter insignem euacuationem ex-  
 cernimentorū. Nam quamuis educantur ex-  
 cernimenta, nihilominus simul cum illis  
 multi spiritus excernūtur, viresq; reddūtur  
 imbecilles, vt exempla suppuratorum &  
 dropicorum demonstrant Hip. & Gale-  
 nus 6. aph. 26. Huiusmodi autem vacua-  
 tiones in puerperis græcè λόχα, à Gaza pur-  
 gamenta, apud Aristotelem dicuntur, quæ  
 eundem à Galeno de sententia Erasistrati,  
 veterum medicorum l. d. atrabile c. 8. 3.  
 Epid. sect. 3. comm. 73. non simpliciter  
 euacuationes & purgationes dici debent, sic-  
 ut alteræ, quæ à purgantibus medicamen-  
 tis dicuntur, Quandoquidē excernitur hoc  
 tempore sanguinis pars deterrima, vt sta-  
 tim declarabitur. Puerperæ igitur nisi quid  
 præter naturā illis superueniat, inter cor-  
 pora



pora conualescentia reponenda sunt, ac potissimum congrua victus ratione nutrienda atq; restituenda. In quo alioqui plures & gravissimi errores solent committi, cum sola obstetrices & mulieres imperent, ac praedicent medicis hac in re nullam fidem & obedientiam praestanda esse. Quare primum non solum semel & bis, sed ter, quater saepius & quidem copiose nunquam desinunt puerperas replere & nutrire, quibus familiare est proverbium: Vnde egreditur puellus fore opus ut ingrediatur porcellus. Deinde plurimae solent adhibere pullos columbinos, capones veteres, cum cinam: Garyoph. v. na etiam grandia & generosa. Quae quidem victus ratio quam sit improba & periculosa notius est, quam ut debeat pluribus demonstrari. Itaque congruentem victus rationem instituat, quae quantitate sit moderata, ut parum vel nihil à sua consuetudine recedat. Qualitate autem alimenta sint boni succi, facilis coctionis, paucorum excrementorum, flatus expertia, neque ita calefaciendi v. praedita, ut pulli gallinacei vel galli castrat



rati iuniores, oua recentia, panis ex iure  
 reparatus, &c. Primis quatuor aut septē  
 diebus abstineant à vino. Huius loco nihil  
 prestantius iure pulli gallinacei potest  
 cogitari, deinceps vinum album tenuē,  
 minimè generosum, & parcè. Cum autem,  
 ut modò diximus, huiusmodi mulieres sint  
 imbecilliores, alimenta commodè possunt &  
 debent partiri, qua ratione certum est me-  
 iorē coctionē fieri. Memini me legisse apud  
 Athenæ: l. 9. Dipnosophist. quoddam me-  
 dicamentū & nutriendo corpori accommo-  
 datum, quorū quidē institutum & consuetu-  
 dinē non satis intelligo, qui scio apud Gale-  
 nū & omnes probatos autores Brassicam  
 multis nominibus improbum esse alimentū.  
 Et hæc de naturali partu. Sin autē par-  
 tus fuerit laboriosus, vel quid præter natu-  
 ram illi coniungatur, tunc longè maiori di-  
 ligentia & cautione oportet victū institue-  
 re. In quocasu scribit Moschio Græcus  
 autor harm. Gynæc. 16. puerperas biduo  
 à cibo abstinendas esse, vt hinc liceat magis  
 errorē eorum arguere, qui tam copiosam  
 victus rationē solent probare. Ceterū cum

Præterna-  
 turalis &  
 laboriosus

Bb

pluri-



Retentio  
secundina-  
rum.

plurimi affectus praeternaturam soleant pu-  
erperis superuenire, de quib<sup>9</sup> in praesentia  
non pertinet ad meum institutum sermonē  
habere: Illud vnum sciatis, omnia prope-  
modum mala in huiusmodi mulierib<sup>9</sup> alia  
nulla de causa fieri, quā ob vitiū purga-  
tionis, quae à natura post partum instituta  
est. Quod quidem vitium potest esse mul-  
tiplēx. Namq<sup>3</sup> primū illae retinentur mem-  
branae, quae foetum toto conceptus tempore  
vestiunt ac fouent, quae δευτέρου græcis seu  
secundae dicuntur, quasi secundus aliquis sit  
partus, qui foetui in lucem egredienti suc-  
cedat. Quo loco obiter notandus est error  
omnium propè anatomicorum vno excepto  
Vesalio l. 5. c. 17. qui docet secundinā non  
aliud esse, quā vnā ex membranis foetū  
vestientibus, quae χωελον appellatur, cum  
reuera vniuersa ea moles & compactio mē-  
branarū, quae post editum foetū deijciuntur  
minimē vnica mēbrana χωελον vel secun-  
dina dici debeat, vt perspicue colligitur ex  
Galeno 5. aph. comm. 35. & de venae sect.  
aduersus Erasistratū c. 5. Et ex Aristot. 2.  
de gen. anim. c. 7. qui scribit, secundas &  
mem-



membranas inter foetum atq; vterū positas  
 se. Deinde quoq; menses vel planè re-  
 tentur, vel parcè fluunt, vel immodera-  
 te & deprauatè deijciuntur, quæ omnia  
 compomata magna incōmoda secum affe-  
 runt. Sed potissimum & m̃xima ex parte  
 verperæ laborant, si illis menses vel pror-  
 retineantur, vel debiliter fluant, quod  
 declarè à Galeno traditum est 1. Epide.  
 l. 3. com. 3. qui scribit suppressionē men-  
 suum perpetuò offendere, non tamen per-  
 de, ac si à partu opprimantur, quod hæc  
 rentio hoc tempore non modo abundantia,  
 sed etiā insignem horum prauitatē pariat,  
 quandoquidem foetus gratia nutrimenti  
 meliorem sanguinem ad se alliciens relin-  
 quit deteriore, ex quo prægnantes replen-  
 tur prauis humoribus, quos deinde natura  
 partum euacuare consuevit. Itaq; in  
 verperis hunc perpetuò scopū ob oculos ha-  
 bere debetis, vt illis menstrua probè procedant,  
 quandoquidem ex vna parte his oportune  
 fluentibus, illæ omnium morborū & pericu-  
 rōserè fiunt immunes, ex altera autem  
 retentis & parcè fluentibus vix aliter fieri

Mensium  
 vitia

Bb 2

potes



potest, quin plurimis & quidem grauissimis morbis subijciantur. Quæ quidem ab Hip. recensentur 1. de morbis mulierum (pag. 323.) cum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, contingit ipsam febricitare & horrorem habere, & ventrem magnum esse, & quæ sequuntur. Et lib. de nat. puer. (pag. 47.) si non purgetur mulier purgationibus partus, morbus magnus eam corripit, & in periculum vitæ incurret, nisi cito curetur, & quis conuenientem purgationem inducat. Si quærat aliquis, quotnam diebus & quàm diu menstrua purgationes à partu debeant procedere? Ad hanc respondet Hip. lib. de nat. puer. (p. 47.) puerperas parturientes fœminâ 42. diebus, parturientes autem masculû 30. diebus opus habere, qui hanc quoque rationem adiungit: Illud fieri, quod huiusmodi purgatio respondeat generationi, & primæ conformationi fœtus, quam idem Hip. affirmat in fœm. totidem 42. diebus, in masc. 30. diebus contingere. Quod si rursus quærat, quamobrè masculus prius, fœmina posterius conformetur in utero:

cum



am potiss: extra contrà eueniat, vt fœmina  
 ius, mas tardius ad sui perfectionem per-  
 niat? Itidem respondet, id propterea fieri,  
 oniam fœmina frigidior est atq; ex  
 igidiore semine generetur, Mas contrà ca-  
 dior atq; ex calidiore semine concipitur,  
 erba hæc sunt: Quod autem fœmina poste-  
 ius conformatur, causa hæc est, quod ge-  
 itura fœminea humidior & debilior est,  
 uàm masculi. Et iuxta hanc rationem ne-  
 esse est posterius conformari fœminā, quàm  
 asculum. Atq; propterea etiam purgatio  
 iuturnior est in fœmina quàm masculo.  
 Quam quidem Hip. rationem Aristoteles &  
 Galenus mihi videntur mirabiliter illustra-  
 e. Namq; Aristoteles 4. de gen. animal. 6.  
 uarens, cur fœminæ similiter atq; mares nō  
 erficiantur in genere hominum, cum in-  
 ra parientem fœmina longiore tempore  
 onficiatur quàm mas, vbi verò in lucem  
 venerint, celerius fœminæ, quàm mares cō-  
 ficiantur, quibus pubes, vigor & senectus ci-  
 tius obueniunt quàm maribus? Respondet  
 istud fieri, quia fœminæ sunt natura debilio-  
 res & frigidiore, adeò vt sexum fœmineū,

Bb 3

quasi



quasi lesionem naturalem & detrimentum  
quoddam non vcreatur appellare. Itaque ille  
inquit, fœminæ int<sup>o</sup> tardè præ sua frigidityte  
discernuntur, huiusmodi enim discreti  
concoctio quædam est, calor autem conco  
quit, & quod calidius concoctu facilius est  
sed foris propter suam debilitatem citò ad  
ætatis florem senectutemq; perueniunt. Ete  
nim omnia minora vt in artis operibus, si  
in natura citius ad finem deueniunt Gal  
idem 2. de sem. c. 4. & 5. facta cōparatione  
luti liquidioris, quod nullam impressionem  
aut fixationem recipit: docet idem continge  
re in semine & sanguine menstruo frigidioribus  
& liquidioribus, ex quibus anima  
formari non potest, nisi illa prius modera  
tam duritiem & consistentiam acquirant,  
quæ ad formationem membrorum sit accō  
modata. Cum autem fœmina ex semine &  
sanguine liquidiore, tenuiore, frigidiorēq;  
efficiatur, satis cuiq; potest constare, illā  
tardius, quàm marē, qui ex materia cras  
siore, solidiore, calidiorēq; procreatur in v  
tero conformari. At verò extra vterū aliter  
se res haberet, mulierq; citius mare perfici  
tur, partim quod mulieri coniuncta est ma-



eria humidior, quod facile possit extendi,  
 partim quod imperfecta concoctio, quæ  
 ad perfectionem fœminæ necessaria est, citi-  
 us acquiritur, quàm perfecta. Sed positis his  
 rationib⁹ Hip. Aristotelis, Galeni, nobis li-  
 ceat alias duas rationes adiungere, minimè  
 ut puto, negligendas, quæ tamen ex eisdẽ,  
 præcipuè verò ex Galeno colligi possunt. Al-  
 tera sumitur ex natura & conditione loci, in  
 quo fœtus generatur, siquidẽ ut scribit Hip.  
 s. aph. 48. Mares etiam plurimum dextra,  
 fœminæ sinistra vteri parte generantur.  
 Certum verò est dextra sinistris esse calidio-  
 ra, vnde cum fateantur omnes conformatio-  
 nẽ caloris esse opus, nulli debet mirum vi-  
 deri, si in calidiore loco conceptus fiat citius  
 quàm in frigidiore. Altera colligi potest  
 ex copia & qualitate excrementorũ. Cum .n.  
 sit verisimile ac fortè necessariũ, & plura &  
 deteriora excrementa in fœmina, quàm in  
 mare coaceruari, iure naturã longius quoq;  
 tempus purgationis parui fœmineo quàm  
 masculino destinasse. Etsi autem ad purga-  
 tionẽ puerperarũ de sententia Hip. 42. dies  
 in fœminis, 30. in masculis constituti sunt,

Bb 4

tamen



tamen sciendū est, hunc terminū quā longissimum esse, atq; ab eodē Hip. limitari in partu fœminino dieb<sup>9</sup> 25. in masculino diebus 20. Qui hæc habet 1. de morb. mulier. (p. 337.) post partum plerunq; sanæ mulieri contingit, ut post puellæ partum in 42. diebus diuturniss. purgatio fiat, Extra periculū autem est, et si 25. dieb. purgentur, Post masculi verò partum purgatio fit diuturnior in 30. dieb<sup>9</sup>. Extra periculū est etiā quæ in 20. dieb. contingit. Cui quidem limitationi ferè subscribit experientia, cum mulieres in partu magna ex parte dies circiter 20. aut 25. soleant menstruas purgationes habere. Quod si quis demum quantitatē huiusmodi purgationis curiosius cupit intelligere, ad hunc pariter respondet Hip. 1. de morbis mulier. (p. 337.) scribens: Sanæ mulieri puerperij purgamenta sufficienter prodire primū sesqui hemina mensura, aut paulò plura: post ad huc pauciora iuxta hanc rationem, donec tandem cessent. Hemina autem pendit circiter 3 x apud Græcos, ut tota huiusmodi purgatio ad 20. circiter 3 ascendere possit, quod alio-

qui



ui mirum debet videri, cum certū cuiq; esse  
 possit mulieres in præsentia longè copiosio-  
 res puerperij purgationes habere, nisi fortè  
 dicamus, id fieri quod nostro tempore, quo  
 mulieres non sunt adeò temperantes in victu,  
 & longè maiori otio deditæ, quàm fuerint  
 veteres, fortè purgationes quoq; sint copio-  
 siores, tametsi, vt puto, de hac re nihil certi  
 latui possit, cum rationi sit consentaneum,  
 & experientia satis confirmet, mulieres pro  
 varietate ætatis, habitus corporis, tempera-  
 menti & rerum similiū, modò plures, modò  
 pauciores purgationes habere, quod idē cen-  
 seo de diebus huic purgationi destinatis sta-  
 tuendum esse. Sed ad rē nostrā. Cum puer-  
 peræ propter eā potiss: causam plurimis &  
 grauiss: morbis corripiantur, quod vel secun-  
 dinæ retineantur, vel menses malè fluant,  
 danda est omnis opera, vt vtraq; huiusmodi  
 purgentur probè, atq; ex instituto naturæ  
 procedāt, siquidē hæc vel sola vel certè præ-  
 cipua est causa & ratio, quamobrem mu-  
 lieres ab omni periculo & præseruari & cu-  
 rari possint. Sed antequā de huiusmodi vtro-  
 què symptomate agamus, non est præter-  
 mitten-

B. h. s

mitten-



mittenda questio. alioqui vulgaris, sed dignissima cognitione, *Vtrū in puerpera laborante febris vel aliquo morbo acuto computatio dierum criticorū à die partus, an à die morbi fieri debeat, quæ videtur admodum difficilis Gal. 3. prognost. 20. Hip. & Gal. generaliter docent dies cōputandos esse à die partus, minimè à die morbi, qui hæc habēt: Hip. pari modo iudicationes fiunt (3. prog. 10.) Gal. principiū numerationis tibi fiat, nō quo die ceperint febricitare, sed quo pepererint. In quibusdā igitur circa secundā aut tertiam diem incipiunt à partu, ex quo multi iudicant futurā iudicationē. Sed res non ita se habet, sed ex quo pepererint numerationem dierum fieri oportet & Hip. & Gal. (ex quibus numerationē criticorū faciendā à die partus non morbi) Contra verò 1. Epid. 1. 3. ægrot. 4. in vxore Philini in Thaso, quæ die 14. cæpit febricitare Hip. & Gal. hoc ipso die minimè à die partus videntur huiusmodi supputationem fecisse. Nec ratio ab hac sententia videtur aliena. Nam sicut in vniuersum principiū & omnia tempora morborū determinantur potissi-*



potissimum ex cruditate & coctione humo-  
rum, minimè his, quæ solent morbum præ-  
cedere: ita idem planè de puerperis statuen-  
dum esse videtur. Ac propterea minimè ex  
partu, quo tempore nulla est ægritudo, nul-  
laq; est materia morbum efficiens, sed ex  
ipso principio morbi supputationem facien-  
dã esse. Præterea sicut Gal. docet generali-  
ter 1. de diebus crit. c. 6. principiũ morbi  
minimè esse accipiendũ, quando ægrotaturi  
vigilant, cibos fastidiunt, capite grauan-  
tur, & alia id genus quàm plurima patiun-  
tur. Eadem planè ratione statuendum vi-  
detur, neq; in puerperis huiusmodi principiũ  
ex partu sumendũ esse, etiam si illæ fuerint  
quoque modo malè affectæ, sicut reuera sunt  
malè affecti, qui vigilant, cibos fastidiunt.  
His si placet addamus testimonium Auic.  
qui huiusmodi sententiam confirmat mani-  
festè inquiens: 2. quarti Tr. 2. c. 1. in fine,  
Et si mulier peperit, deinde accidat ei febris,  
tunc fiat cõputatio ex febre, nõ ex partu. Ex  
illo enim est error, & quæ sequuntur. Ad hãc  
dubitationẽ conciliator differentia 106. &  
omnes medici ferè videtur duplicem respon-  
sionem



tionem afferre: Alteram, in partu facili ac naturali dies criticos à principio morbi, contra verò in partu difficili ac non naturali à partu fore numerandos: Alteram, in morbis longè distantibus à partu, supputationem à principio morbi in morbis proximioribus à partu faciendam esse. Nec rationes desunt pro confirmatione utriusque responsionis. Nam què ex vna parte in partu difficili & laborioso, & in morbo qui proximè partum sequitur, verisimile, vel potius necessarium est, morbum in ipsum partum, tanquam præcipuam causam esse referendum. Ex altera autem parte in partu difficili & naturali, nec non in morbis longè à partu distantibus, omnis ratio colligit, illos non ex partu, sed ex alijs causis originem habere. Quam quidem utramque responsionem historia uxoris Philini confirmat, siquidem primum partus fuit naturalis, in quo mulier ex præscripto naturæ purgata est, & reliqua rectè habebant. Deinde febris cum rigore longè à partu die 14. sequuta est, ut propterea summa cum ratione dies critici non à partu, sed à principio morbi & ab Hip. & à Gal. numerati fuerint.



int. At verò huiusmodi quoque responsiones,  
 accuratè considerentur, mihi videntur ne-  
 cio quas difficultates continere. Nam ipse  
 et Hip. in vna vel altera puerpera, quæ  
 abuerunt partus non naturales, statimq; à  
 partu 2. aut 3. die febricitarunt, videtur  
 non ab ipso partu, sed à morbo dies criticos  
 numerare, qualis fuit 1. Epid. sect. 3. agr.  
 1. vxor Dromeadae, quæ filiam eni-  
 ca erat, de qua Hip. hæc habet: Postridiè  
 ius diei, quo riguerat, aluū commodè red-  
 idit, &c. Tertio die circa meridiem rigu-  
 t, quarto dolor hypochondrij remissus est.  
 Adeò, ut certum sit, hic dies numerari non  
 à partu, sed à die quo rigor & febris acuta  
 mulierem inuasit. Qualis fuit mulier quæ-  
 lam 3. Epid. s. 3. agr. 2. quæ apud frigi-  
 lam aqua in Thaso egrotabat, de qua Hip.  
 hæc habet: Postquā filiā peperisset nec esset  
 urgata, tertia die à partu febre correpta  
 acuta, &c. à quo die factò principio de-  
 inceps omnes dies criticos numerat, vsq; ad  
 10. in quo obiit. Imò verò, quod certè ma-  
 cime notatione & admiratione dignum est,  
 nec ipsa mulier multò ante partum febre  
 decu-



decubuerat, cibumq; fastidierat, ut omnis ratio colligat, vel à feбри ante partū, vel saltē ab ipso partu eiusmodi supputationē dierum fieri debuisse. Qualis demum fuit vxor Epicratis, quæ laborabat apud Archegetē de qua hæc scripta sunt: Instante iam partu, rigore correpta est, non incaluit, &c. 3. die filiam peperit, &c. quæ item historia est maximè notabilis, siquidem etsi mulier ante partum rigore correpta est, quod Gal. quoq; interprete comm. crudorum & prauorum humorū indicium habendū est, tamen non à die rigoris, non à die partus, sed à die febris dies critici numerati sunt. Itaq; huiusmodi historiae planè demonstrant, dies criticos nonnunquam numerari ex Hip. à prima die febris, minimè à die partus. Etiam si hic fuerit non naturalis, etiam si febris 2. vel 3. die post partū sit subsecuta. Ex quo apparet neutram responsionem satis posse hanc repugnantiam apparentem dissoluere. Quamobrem nonnulli tertiam quandā responsionem excogitârunt, qui docent duas criticorum dierū computationes, alterā à partu, alteram à feбри efficiendas esse: quæ



uā quidem, mea sententia, duabus prio-  
 ribus longè absurdior & falsior censenda.  
 ¶ Nam præterquam quod Hip. & Gal.  
 percipere vnicam tantum computationem re-  
 piunt à partu, imò verò Gal. vt vidimus,  
 orū opinionem conuellit, qui docebant al-  
 terā computationem à febre faciendā esse,  
 et hinc multa sequantur absurda necesse  
 est. Etenim fingamus mulierem peperisse  
 die lunæ, ac proximo die Martis in feb. in-  
 didisse, quam putemus die vndecima cri-  
 sis habituram fuisse, ex altera quidem cō-  
 putatione à febre iudiciū fiet in 11. ex altera  
 autē à partu in 13. Quod sanè totam dierū  
 criticorum & crismus naturam disciplināq;  
 Galeno traditam peruertit. Quid igitur  
 dicendum est? Ego verò id primum repe-  
 o, hunc nodum mihi adeò difficilem vide-  
 ri, vt non facile dissolui possit, qui non eru-  
 resco ingenuè fateri, me hætenus nihil po-  
 uisse, vel de alijs audire, vel de me ipso ex-  
 cogitare, in quo prorsus acquiescam. Dicā  
 amen liberè quid mihi in mentem venerit,  
 et minus quàm cætera displiceat. Duo sunt  
 expedienda: Alterum, quidnam reuera  
 fatuen-



statuendū sit, vtrum in puerperis à die partus, an à die morbi liceat computationē fieri: Alterum quomodo Hip. qui videtur à se ipso dissentire, sibi ipsi possit conciliari. Quod primum attinet, equidem cum Hip. & Galeno censeo, principium dierum criticorū à partu fore accipiendum, sicuti in prognosticis docet, tanquam certa & vera causa, ex qua febres vel alij morbi originē habuerint, quandoquidem in partu, cui succedunt morbi, vix aliter videtur fieri posse, quin vel secundinae vel menstruae purgationes malè succedāt, & mulier sit malè affecta. In quo casu non verebor affirmare, tunc mulierem aegrotare vno vel pluribus, fortè omnibus morbi generibus, intemperie, mala compositione, soluta vnitate, Quibus deinde & febres, & inflammationes, & alij plures morbi possunt succedere, ut propterea summa cum ratione à die partus computatio fieri debeat, quod multis quotidianis exemplis facile potest confirmari. Nam quemadmodū, si quis exem. grat. incipiat laborare Erysipelate, aut capite vulneratus sit die Lunae, cui deinceps proximè Saturni



Saturni febris superueniat, nemo est, ve-  
 ruto, qui non libenter à priore die Lune cō-  
 putationem faciat. Ita si mulieri parturi-  
 enti alij deinceps succedant morbi, minimè  
 videtur alienū à ratione, si quis non à pri-  
 mo die morborum, sed à die partus compu-  
 tationem faceret. Quod autem ad alterum  
 caput, quomodo Hip. possit sibi ipsi concilia-  
 ri, qui, ut vidimus, in nonnullis puerperis  
 minimè à partu, sed à morbo dierum criti-  
 corum numerationem facit, contra quam  
 docuerit in prognosticis: Ego responderem  
 cum Galeno 1. de diebus criticis cap. 3.  
 qui disputans aduersus nonnullos, qui pro-  
 pter varias auctorum dissensiones, vniuer-  
 sam de diebus criticis doctrinam euertebāt,  
 inquit: huiusmodi rationem nullum mo-  
 mentum habere, Cum auctores propter va-  
 rias causas de vna atq; eadē re soleant va-  
 rijs locis variè sentire, quod ipsi quoq; Hip.  
 euenisse certum est. Quæ Galeni verba,  
 si vera sunt, satis demonstrant longe maiore  
 fidem sententijs Hip. aph. & prognost. adhi-  
 bendam esse, quàm libris Epidemiorū, in  
 quibus multa potius observationis, quàm  
 Cc doctrinæ



doctrinae gratia ab eo tradita sunt. Quam  
quidem responsionem odoratus est Fr. Va-  
lesius l. X. contr. 4. qui inquit, Hipp. scri-  
psisse historiam earum mulierum, de quibus  
suprà diximus, non ut praeceptor, sed ut ob-  
servator, qui enarrabat tantum historias,  
& captabat experimenta, quo sententias  
postmodum in aph. & prognost. reponeret.  
Cum autem ex ijs quae haecenus disputaui-  
mus facile sit omnes obiectiones dissolvere  
non est ut singulas rursus inutiliter repeta-  
mus. Ad institutum igitur, secundinae re-  
tentionem aggredimur. De qua ante omnia  
sciendum, huiusmodi symptoma inter cæ-  
tera omnia, quae puerperis solent continge-  
re, esse quam maximè difficile & periculo-  
sum, adeò, ut mihi haecenus licuit observa-  
re, mulieres maxima ex parte, & quiden  
celerrimè ante diem 4. ad interitum dedu-  
cantur. Itaque omni studio in illius euacua-  
tione incumbendum est. Ut verò iunior  
hanc rem melius intelligant, scire debent  
fœtum natura in lucem proferri nudum  
atque omnibus mēbranis & vestimentis spec-  
tulatam, quae intra uterum illū vestire & fo-



ere soleant, vt propterea totum illud in-  
 volucrum, quod secundinas diximus appel-  
 lari, necessario intus remaneat. Quod qui-  
 lem cum nullū deinceps vsum possit affer-  
 re, ex naturæ instituto statim post fœtum  
 olet emitti. Itaq; si detineatur, præter na-  
 turā detinetur. Neq; ego in eo multum la-  
 boro, vtrum huiusmodi affectionem inter  
 morbos in numero aucto, an inter sympto-  
 mata exeuntium mutatorum velimus nume-  
 rare, qui id satis habeo, in quo omnes conue-  
 niunt, hæc spoliaquā primū fore detra-  
 henda causæ. Quamobrem secundinæ deti-  
 neantur, mihi videntur posse constitui, Pri-  
 ma, quod illæ vel fundo vel alteri parti ipsi-  
 us vteri hareant adhuc. Secunda, licet non  
 hareant, quod circa aliquā vteri partē, in-  
 star cuiusdam globi sint conuolutæ, neq; ad  
 exitū inclinent. Tertia, quod os vteri clau-  
 sum sit. Postrema, quod mulier sit imbecil-  
 lior, quā vt illas deponere possit. Quæ qui-  
 dem causæ singulæ propriā curandi rationē  
 desiderant. Itaq; si secundinæ sint vtero al-  
 ligatæ, vel circa vterū conuolutæ, mea sen-  
 tentia, manualis operatio cæteris omnib; præ-  
 sidjis

Causæ rea-  
 tent secun-  
 dinæ.

Curatio.



fidijs, quæ plurima intra & extra possunt ad-  
 hiberi, efficacior censenda est. Quamobrem  
 obstetrix inuncta manu oleo amygd. dul.  
 aut lil. alb. aut vng. Dialth. atq; in vterum  
 immissa, quærat secundinas apprehendere  
 ac blande educere, quo loco, si secundinæ vte-  
 ro adhuc hæreant, debent obstetrices dili-  
 genter cauere, ne ipsas recto tramite statim  
 ac violenter velint detrahere, quæ potius  
 sensim nullaq; adhibita violentia, in obliquum  
 atq; ad latera modò in dextram, modò in si-  
 nistram partem mouendæ sunt, donec laxè-  
 tur & commode possint educi: Cum si aliter  
 fiat, nec secundinæ obediunt trahenti, sed vi-  
 trahantur, periculū immineat, ne inflam-  
 matio concitetur, & quod est deterius, ne  
 simul cum secundinis ipse quoq; vterus pro-  
 cidat. Veruntamen, neq; interea præter-  
 mittendæ sunt præsidia, quæ hoc ipsum præ-  
 stare possunt: Inter quæ testimonio Hippo-  
 crates insignè obtinet prærogatiua  
 aph. 49. Exemplum: Recip. Castor. elect.  
 pip. alb. nigr. ana ℥i Elleb. alb. ℥i M. f.  
 puluis. Sic illa quoq; utiliter adhibentur,  
 partim ore accepta, partim exterius acco-  
 modata



modata & administrata, quæcunq; ad men-  
 ses sunt accommodata, de quibus suis locis  
 diximus, quæ ad hunc locum sunt transfe-  
 renda. Sed sunt nonnulla quæ ad secundinas  
 eiiciendas creduntur peculiare quoddam vim  
 obtinere, qualia sunt: Chrysocolle argen-  
 tiorum, Borax vulgò stercus accipitris,  
 mellis ab angue deposita, exuuia seu sene-  
 ta anguis in puluerem redacta, vel separa-  
 tim, vel commista pondere ℥j ex vino aut  
 mulsa solet propinari. Exem. grat. Recip.  
 Cinam. croci ana ℥j Boracis ℥iij ex aqua  
 Artemisiæ. Nonnulli probant maxime li-  
 xiuum cum oleo. Proximis diebus cum es-  
 sem Tarvisij, nobilis quoddam matrona as-  
 sumpto oleo amygd. d. ad ℥viij siue fuerit  
 medicamentum, siue fuerit casu, protinus  
 secundinam deposuit. Sunt alia propemo-  
 dum infinita, quæ facile possunt apud vete-  
 res & recentiores haberi. Nolo tamen silen-  
 tio præterire quoddam remedium, quod à  
 nonnullis quàm maxime celebratur, & est  
 pulvis testiculorū equi, de quo remedio cla-  
 riss. Gesnerus hæc habet lib. 1. Epist. Med.  
 (pag. 27. Tigur.) de polline testium equi

Cc 3

sicca-



siccatorum ad secundinas pellendas ex iure  
bibendum datur, quantum trib. digitis ca-  
pitur. Atq; hæc aperto ore vteri gerenda  
sunt, Sin autem illud conuiere compertū  
fuerit, tunc omni studio conandum est, ut  
aperiatur fomentis, linimentis, perfusioni-  
bus ex oleis ac medicamentis, quæ laxandi  
vim atq; dilatandi habet, de quibus sæpè di-  
ximus, quæ quidem partim ad superiorem  
ventrem, partim ad pudenda licet appone-  
re. Quod si demum secundina propter nimi-  
os labores partus & imbecillitatem puer-  
peræ detineatur, nec possit expelli, manife-  
stum est illi fore succurrendum cibo & po-  
tu, quæ sint facilima coctionis, atq; optimi &  
celeberrimi nutrimenti, qualia sunt iura ex  
vitellis ouorū recentium, optima iura ca-  
ponis, vinum album, tenuè, odoratum, &  
cetera id genus, quæ sunt manifestiora, quæ  
ut debeant longius cōmemorari. Ceterum si  
hæc omnia frustra fiant, inquit Aët. lib. ult.  
c. 24. perturbari non oportet, intra paucos  
enim dies putre facta in sanie dissoluta ex-  
cidet. Quod quidem etsi pleriq; omnes reci-  
piant, qui sine delectu solent ex alijs propo-  
nere



nere omnia, ego non satis intelligo quomodo  
 fieri possit, siquidem, vt dixi initio, quate-  
 nus longiore experientia licuit mihi obser-  
 uare, statim circa primos dies puerperæ gra-  
 uissimis symptomatibus corripiantur, syncope,  
 tremoribus, sudoribus frigidis, vigilijs, de-  
 lirio, adeò, vt nullam viderim, quæ non  
 ante diē quartum obierit. Hoc autem po-  
 stremo loco mihi licet alterius remedij me-  
 minisse, quod etsi ab omnibus prætermis-  
 sum est, tamen ego censeo, & quandoq; ex per-  
 tus sum, inter cetera omnia efficacissimum  
 esse. Illud verò est sectio venæ, quam qui-  
 dem in vno vel altero pede re urgente, si  
 modò puerpera viribus valeat, nulla ra-  
 tione prætermittendam, cum non solum ad  
 euacuandam secundinam, sed etiam ad a-  
 lios vsus possit magnam vtilitatem afferre.  
 Dictum est puerperas ob varia mensium  
 vitia fore obnoxias morbis, & propterea  
 omni studio prohibendum, vt illi oportunè  
 effluant, de qua quidem re, non est, vt in  
 præsentia longius agamus, quandoquidem  
 quæ suprà diximus, de ratione euocandi  
 menses generaliter, omnia huc possunt ac de-



bent ad hunc locum transferri: Veruntamen cum ex vna parte certum sit, in prouocatione mensium sectionem venae principem locum obtinere, Ex altera autem eiusmodi praesidium apud nonnullos quibusdam difficultatibus inuoluatur, mihi libet hac in re hoc caput quam breuiter examinare. Primum itaque est vulgaris quaedam opinio, praecipue vero apud mulieres, piaculum esse puerperis venam secare, quae cum nulla vel ratione, vel alicuius probati viri autoritate nitatur, esse reiicienda. Itaque vos si id ferat occasio, dummodò conueniant 3. principes scopi, ne timeatis vestris puerperis, & semel & bis & saepius venam incidere. Quod quidem saepius soleo administrare, atque expertus sum non solum tutum, sed etiam longè efficacissimum esse, non solum in prouocandis mensibus, sed etiam curandis morbis, quaecumque à partu solent superuenire mulieribus. Caeterum de huiusmodi praesidio nonnullae occurrunt difficultates, quae nullo modo sunt praetermittendae. Ac primum si accidat, ut mulier à partu corripiatur aliqua febre, pleuritide, vel alio morbo acuto, ut si  
neces



neceſſe ad ſanguinis miſſionem deuenire, iā  
 quæritur, ex quanam parte, an inferiore  
 cruris, an ſuperiore brachij liceat venam ſe-  
 care? Eſi enim multi docent in cruribus ve-  
 nam perpetuò ſecandam eſſe, tamen neq; de-  
 ſunt viri doctiſſimi & celeberrimi nominis,  
 qui aliter ſentiunt ac docent, vrgente mor-  
 bo venam in cubito aperiendam eſſe, ex qui-  
 bus duo præcipuè mihi nominādi ſunt. Alter  
 eſt Lud. Mercatus 4. de affect. mul: c. 11.  
 qui hæc habet: Verum in ijs omnibus inflam-  
 mationibus, &c. Alter eſt Francis. Valle-  
 riola obſeruat: 10. Medecinalium, qui re-  
 fert hiftoriam Helenæ Senekeria florentis  
 ætatis & primiparæ, quæ altero die à partu  
 acutiſ: pleuritide correpta eſt. Cui, acce-  
 dente etiam conſilio alterius medici Lud.  
 Laurentij, ſecta fuit vena interna dextri  
 brachij, ſanguis emiſſus ad ℥vj quo quidem  
 inprimis remedio idem teſtatur Valleriola  
 ægotantem integrè curatam eſſe cum ad-  
 miratione magna. Fortè verò ſunt alij quo-  
 què, qui hanc ſententiam ac medendi ratio-  
 nē probant. Ego verò cenſeo huiusmodi opi-  
 nionē à Galeni doctrina, & à ratione alienā

Cc 5

eſſe



esse, ac multa pericula secum afferre. Cum enim ex una parte Galenus doceat, ac fateantur omnes, congruam mensiū fluxionem esse veluti clauū nauis, præcipuamq; fortè solam rationem, qua puerperæ possint plerisq; malis & periculis curari & præseruari: Ex altera autem idem Galenus docet lib: de sanguinis missione l. 1. sectionem venæ superioris muliebres purgationes reuellere consueuisse: satis cuiq; potest constare, venas in cruribus perpetuò fore incidendas, vt quæ valeant trahere ad vterū ac menstruā purgationem iuuare. Alteras verò contra in cubito non solum importunè, sed etiam perniciosè aperiri, vt quæ possint reuellere ab utero, menstruā purgationē impedire, vniuersam curationē peruertere, ac certissimū periculum afferre. Notum est Oraculum Hip. Quæ ducere oportet eò ducere, quò maximè natura vergit. Ex quo factum est, vt Galenus summa cum ratione generale nobis præceptū tradiderit de sanguinis missione c. l. 1. 9. plenitudines à retentis mensib; natas, ex cruribus fore omninò vacuandas, siue venā incidere, siue sacrificare  
opor-



oporteat. Et si non ignoro Aëtium & nonnullos recentiores, hanc Galeni sententiam non recipere, de quibus alias publicè diffusè dictum est. Itaq; si puerpera vel aliqua inflammatione, vel aliquo acuto morbo laboret, & Galenus & ratio nos docent, venas in cruribus perpetuò fore incidendas, si modò sanguinem omninò mittere oporteat. Quod quidem eodem Galeno auctore 9. method. c. 5. ita deliberandum est. Namq; debet medicus fluentis menstrui sanguinis impetum auertere, & si sic solus videatur fore satis, tota res naturæ est permittenda. Sin verò ille parè fluat, tunc tantùm sanguinis ex vena detrahendum est, quantum ex coniunctis ambabus vacuationibus natura & arte persiciatur, &c. quod occasio postulat. Sic Hipp. in vna & altera puerpera 1. Epid. 1. 3. agr. 4. 5. nullius meminit præsidij præter supposita, quæ licet interpretari quacunq; menses possunt promouere. Sic Auic. 21. Tertij tr. 2. c. 36. puerpera laborante febre laudat sectionem saphenæ, nec non aquam hordei, quam inquit, non retinere menstrua, & similiter granata dulcia, præterea nihil agit.



Sic optimi quique medici tractant puerperas, ut mensibus probe fluentibus, sola congrua victus ratione contenti sint. Illis verò parcè erumpentibus, hunc defectum omni ingenio conantur supplere. Sed hac de re satis. Ceterum ut neque id prætermittatur, sicuti fluentibus mensibus, ego quidem non probo sectionem venæ superioris: ita neque apertionem hæmorrhoidarum possum probare. Et si non ignoro, ac fortè in consultationibus medicis audistis, multos doctiss: huiusmodi vacuationem quàm maximè probare. utque inquit Lud. Mercatus, ob partium viciniam defectum purgationis uteri mirè adimplet. Quamobrem verò ego huic nequeam consentire, id mihi persuadet Galenus, qui tradens leges reuulsionis & deriuationis, inquit: reuulsionem per contrarias partes, deriuationem per vicinas fore perficiendas, nonnullaque huiusmodi disciplinæ exempla tradens, hæc habet s. Meth. 3. quæ per aluum fluunt, ea vel per aluum vel per urinam transmittes. Quod si fluxiones uteri ad intestina deriuantur, utique tantum videtur abesse, ut aperta hæmorrhoides possint adiuuare, ut contra quam



uam maximè possint impedire. Cum igitur  
 in puerperio, quod semel atq; iterum di-  
 scimus, Medicus id cum primis debeat co-  
 nari, ut menstrua purgationes rectè proce-  
 dant, iurè & prouocatio hæmorrhoidarum  
 & quæcunq; possunt illis impedimentum ad-  
 dere, mihi videtur improbanda & reijci-  
 enda. Postremò autem hoc loco id quoq;  
 libet quærere, vtrum liceat puerperis pur-  
 gantia medicamenta exhibere, cum sit res  
 maximi momenti, neq; omnes idē sentiant,  
 quandoquidē vt ceteri prætermittantur, duo  
 viri paulo, ante nominati Mercatus & Val-  
 leriola huiusmodi quoq; purgationem in pu-  
 erperis, tanquam maximè vtilem ac neces-  
 sariam probant. Nam Mercatus C. supra  
 citato ita statuit. Si purgatio per vterū non  
 sufficiens videatur, minimè verendū esse  
 purganti medicamento vitiosos humores  
 copiosius expurgare, vt natura deonerata  
 cæteros quoq; humores facilius concoquat &  
 expellat, &c. Valleriola autem testatur eo-  
 dem loco illi suæ puerperæ transecta 7. die  
 se dedisse medicamentum ex Agarico, Mā-  
 ba, syr. & mel. Ros. ex decoctō pectorali,  
 (malè



(malè faciunt qui syr. & mel. ros. permiscēt non sine superstitione) Quam quidē medendi rationē plurimi probant, ipsoq; usu frequēter confirmant. Ego vero ijs consentiens, quæ supra tradita sunt, puto huiusmodi opinionē à doctrina Hip. & Gal. & ratione esse alienā, omnemq; purgationē præterea eā, quæ ex utero prodit, non solum nihil proficere, sed sæpè perniciosam esse. Ex multis autē quæ istud facile possint demonstrare, unico volo esse contentus, quod nimirū purgantia medicamenta possint mēstruas purgationes impedire. Cuius quidem imperitæ purgationis tot & tanta pericula proposita sunt, ut actū agere nolim. Atq; sic nostræ tractationi finē facio. Etsi enim ad integrā tractationem de aff. mul. plurima supersunt: tamen ad nostrum institutū, quod unicū fuit de conceptu & partu hominis sermonē habere, ijs volumus esse contenti, quæ ferè ex tēpore à nobis scripta, aliàs cum plus otij nacti fuerimus, magis accuratè & ornatè possunt finiri.

Laus Deo opt. max.

FINIS. 22. Decemb. 93.






*LIPSIÆ,*  
EX TYPOGRAPHEO  
ABRAHAM LAMBERGI.


---

ANNO M. DC.









# INDEX QVÆSTIONVM SEV CONTROVERSIARVM

NOTABILIORVM.

An morbi mulierum peculiarem requi-  
rant tractationem & curationem  
pag. 1. & 2.

An commentarij de morbis mulierū sint  
Hippocratis 2.

An foeminae præter Naturæ propositū,  
ac veluti monstra sint 10. 392.

An mas tantū semen, foemina sanguinē  
menstruum ad generationem con-  
ferat 13. 172. 194. 201.

An foemina sit frigidior mare 20. 391

An sola mulier inter omnia animalia mē-  
strua habeat 18.

An singulis mensibus fluant menses 26

An intemperies calida vteri efficere pos-  
sit mensium suppressionem 36.

An & vbi sanguis sit mittendus in sup-  
pressionem mensium 57. etiam post  
puerperium 409

An in mensiū suppressione hæmorrhoi-  
des aperiendæ 75. cauterijs vtendū  
76.

Dd

Vbi



I N D E X

Vbi fieri debeat reuulsio in superfluo  
mensium fluxu 105

An in superfluis mensibus reuellendum  
diureticis 117.

An diuretica menses prouocent 118. 160

An aceto vel posca vtendum sit in super-  
fluis mensibus 122.

An mulieres laborent Gonorrhæa 132

An viri albis mensibus laborent 133

Vbi & quomodo menses albi generen-  
tur 134.

An in albis mensibus conueniat aliquā-  
do venæ sectio 149. 155.

An profluuium muliebre sit morbus fri-  
gidus. 159.

An in profluuiio muliebri liceat vti diure-  
ticis 160.

Quidnam vterq; sexus ad generationem  
hominis conferat 172. hoc est, semē  
maris sit ne efficiens, menstruum  
materia generationis. 173.

An foemina quoq; semen haheat, & semē  
foecundum 194. 201.

Vnde similitudo prolis, à semine analiun-  
de 202.

An mulieres etiam sine semine possint  
generare 205

An



Q V A E S T I O N .

An penis longior aut breuior sit causa sterilitatis virorum 213.

An ex Nympha iudicandum sit de virginitate aut corruptione 224.

An vterus moueatur sursum 227.

An mulieri possit deesse vterus 231.

Cur foeminis citius quàm maribus detur venia ad nuptias 233. 391

An venæ sectio sterilibus mulieribus cōueniat 254.

Quæ hora, quæ anni pars, quod tempus ad conceptionem sit aptissimū 265

Cur sapientes ferè stupidos, plebei ingeniosos generent. 267.

Mentha calida ne an frigida sit, venerem ne impediatur an promoueat 271.

An Mola fieri possit sine viri semine 281

An mola generetur à calore an frigore nimio 283.

Cur molæ difficulter aut nunquam curentur. 285.

An & cur solæ mulieres molas gestent. 287.

An & quæ in Mola secanda vena 292.

In hydrope vteri sit, ne aqua in cauo an tunnicis: vbi multa de vesiculis aqua plenis 309

Dd 2

De



INDEX QVAEST.

De tempore gestationis in vtero 322.

An sanguinis missio abortum faciat 323.  
350.

An Erysipelas & inflammatio vteri le-  
thalis 335

An paruitas vteri possit esse causa abor-  
tus 339.

An pręgnantibus secunda vena, aut  
dandum Pharmacum 350. & vtra-  
harum euacuationum sit periculo-  
sior 354.

Cur foemina in vtero tardius quā mas-  
generetur, contrā extra citius perfici-  
ciatur, 390.

An computatio crīricorum dierum pu-  
erperæ febre correptæ, fieri debeat a  
die partus aut morbi 396.

An secundinæ putrescant absq; periculo  
in vtero post partum. 408.

An puerperis ad secundinæ & mensium  
educationem secunda vena, & quæ  
409.

An puerperis danda purgantia. 415.

INDEX



# INDEX RERVM, ME- THODI ET CAPITVM.

## PROOEMIUM.

Operis causæ, necessitas pag. 1. dif-  
ficultas, pag. 4. iucunditas & v-  
tilitas. 5.

Propositi partitio. 6. 14.

Autores alijs, qui de morbis mulie-  
rum scripserunt. 7.

Distinctio sexus 8. & causæ gene-  
rationis 13.

Cur de menstruis primò agendum  
14.

## TRACTATIONIS PARS PRI- ma de morbis conceptus 15.

### CAP. I.

De menstruis secundùm naturam, quid  
ea sint Aristoteli 15. Galeno 16.  
Soliùs mulieris 17. non aliorum a-  
nimalium 18. quando incipiant &  
desinant 24. quot diebus fluant, 25

### CAP. II.

De menstruis præter naturam, & primū  
suppressione 13.

Dd 3

1. Essen-



# I N D E X

1. Essentia ibidem.

2. Causæ 32. quatuor 33.

Prima, vitium vteri & vasorum. Vteri est compositio mala 34. Intemperies simplex 35. cum materia 37. Soluta vnio 38. vitium vasorum 38.

Secunda vitium sanguinis ibid.

Tertia totius corporis vitium 39.

Quarta vires 43.

3. Signa diff. & caus. Totius & virium 44. vteri compos. 45. Intemper. 46. Solutæ vnitat. 47. vasorum ibidem. sanguinis 46.

4. Curatio. Indicationes seu scopi duo 49. Prognosticon 51. Præsidia primi scopi (post general. purgat 55. 77. Sanguinis miss. vbi 57. quando & quanta 70. 73. ) 54. Alterius scopi 80.

## C A P. III.

De deprauato mensium fluxu 88. & primū immoderato 89.

1. Essentia ibid.

2. Cau-



RERVM, &c.

2. Causæ tres 92. Facultas 93. Sanguis  
malè affectus ibid. vitium vasorum  
95. Summa: Externæ 96. Internæ  
97.

3. Signa pathognomonica 98. differ. &  
causs ibid. facul. ibid. Sanguinis  
99. vteri & vasorum 100.

Curatio. Indicationes generales 101.  
Speciales duæ 102. Progno-  
sticon 103. Præsidia primi scopi: pri-  
mū Reuulsio 105. Venæ sectio 115  
alterum Deriuatio 117. Tertium a-  
nimi deliquium inducens 118.  
Quartum refrigerantia & astrin-  
gentia 119. Alter scopus obstructio  
venarum interna 120. externa 123  
Ablatio causarum: copiae sanguinis  
127. calidit. tenuit & aced. sang.  
128.

C A P. IV.

De vteri profluuiio seu Mensibus albis  
130.

1. Essentia ibid. Differentiæ 131.

2. Causatum propria 134. Locus affe-  
ctus 135. tum remota 140.

Dd 4

3. Signa



# I N D E X

3. Signa pathognomonica 144. diff. & caus. ibid. Gonorrhææ & fluxus muliebr. 146.
4. Curatio. Indicationes duæ 147. Prognosticon ibid. Præsidia 148. Purgatio bilis 149. Pituitæ 151. Melanch. 154. Seri, vbi de vxore Boethi 155. Diuretica 160.

## C A P. V.

De conceptu secundum naturam, qualis 170. causæ 171. efficient. 172. Sententia Aristotelis 173. Galeni 174. Probatio sententiæ Aristot. 175. Gal. 177. Solutio rationum Aristotelis 191. contra semen mulieris 195. pro eo 197. &c.

## C A P. VI.

De sterilitate 209. Ratio ordinis 210  
1. Essentia 211.  
2. Causæ ibid. in viris 213. penis longior ibid. breuior &c. 214. vitium testium ibid. Seminis 215. Corporis vit. 216. Externæ, vt immoderatus concubitus 217. Ebrietas 219.



R E R V M, &c.

219. Sectio venæ post aures 220.  
in mulieribus 221. vitium vteri 222.  
clausura 223. intemperies 225. Cō-  
positio mala 227. soluta vnio 232.  
seminis ibid. sanguis. ibid. Com-  
munes vtriusq; externi, ætas minor  
aut maior ibid. habitus corporis pin-  
guior 235. coitus frequentior 236.  
Ebrietas 237. Dissensus 238. odiū  
239. aër ibid. maleficia 240.

3. Siqua foecund. & infoecund. viri  
241. mulieris 242. causæ. in viris  
246. In mulieribus 247. intemperi-  
es ibid. compos. 249 solut. vnit. 250.  
seminis vitiosi 251.

4. Curatio. Indicat. generalis 251. Spe-  
cialis intemperiei frig. & humid. 252.  
prognost. 253. Præsidia generalia,  
purg. & venæ sect. 254. medica-  
menta 255. foecundantia 256. in-  
terna 257. Externa 259. occult.  
qual. 262. præcepta coitus: tempus  
263. modus & ordo 266. Impedi-  
entia venerem virtute propria 270.

Dd 5

C A P.



I N D E X

C A P. VII.

De Monstris 272. Conceptus prauus quadruplex 273. quid 274. causæ ibid. triplic. 275.

C A P. VIII.

De Mola 276.

1. Essentia ibid. Differentiæ 279.
2. Causæ 280. duæ præcipuæ 284. proprietates 285.
3. Signa propria & certa duo 289. cætera communia 290.
4. Curatio. Indicationes tres 291. Prognosticon ibid. Præsidia indic. primæ 292. secundæ 294. tertiæ 296.

C A P. IX.

De Inflatione vteri.

1. Essentia. 298.
2. Causæ generales & generatio flatuū 299. Speciales in vtero duplices ib.
3. Signa 301. different 302.
4. Curatio. Indicationes tres 303. Præsidia primæ 304. secundæ 305.

C A P.



RERVM, &c.

CAP. X.

De hydrope vteri 207.

1. Essentia, Locus affectus 308.
2. Causæ 312.
3. Signa 313. differentia hydropis vteri  
& veri 314. naturalis foetus & a-  
quæ 315.
4. Curatio 317. indicationes tres 318.  
Prognosticon ibid. præsidia primæ  
319. secundæ 320. tertiæ 321.

CAP. XI.

TRACTATIONIS PARS

altera: De morbis partus, & primum  
De abortu. 322.

1. Essentia 323.
2. Causæ 325. Externæ sex res non na-  
turales vt aër 326. vbi foetor & vi-  
ctus 327. motus & quies 328. So-  
mnus & vigil. 329. Excreta & re-  
tent. ibid. affectus 331. Internæ  
rùm ratione mulieris 332. crassities  
& extenuatio ibid. plenitud. & ca-  
cochym. 334. morbi totius & vteri  
ibid.



# INDEX

ibid. tūm rarione foetus 342. Aliæ  
causæ 343.

3. Signa futuri 345 causarum 347. fœ-  
tus mortui vel imbecilli ibid.

4. Curatio indicat. ante conceptum seu  
præseruat. 348. Præsid. caus. ex-  
tern. ibid. Internar. ex parte mul.  
356. mucosor. acetab. 358. post  
conceptum. 362.

## C A P. XII.

De difficili partu 366.

1. Essentia 367.

2. Causæ tres 368. ex parte mulieris ib.  
foetus 369. externarum causarum  
373.

3. Signa difficult. prognost. 374. facilit.  
375.

4. Curatio. Indicatio generalis 376. an-  
te partum ibid. sex res non natura-  
les 377. Medicamenta 378. in  
partu 379. speciales scopi ratione  
mulieris 381. foetus 382. Exter.  
384.

## C A P. XIII.

De



RERVM, &c.

De puerperio 384. Post partum secundū naturam tractatio 385.

1. Essentia præter naturam 387. symptom. 388. secundinæ & mens. retent. ibid. & 404.
2. Causæ 405.
3. Curatio secundinæ. Indicat. præf. primæ 406. secundæ 408. Retent. mens. 413.

FINIS.



ERRA.



# ERRATA.

Pagina 4. linea antepenult. legendū in-  
 tio: iam p. 6. l. 14. scribit, sibi propter p. 7.  
 1. 8. libros p. 8. l. 1. Gynæcior. p. 9. l. 8. si l. 10  
 re. Sed l. 12. tud. cl. 1. (Nam ——— potest) p.  
 10. l. 8. quales l. 12. vterus p. 12. l. 21. con-  
 iunctionem l. 24. unde p. 15. l. 22. sanguinis  
 23 lata p. 16. p. 26. l. 19. ie. p. 30. l. 5. eruptio  
 ne l. 24. meliorem l. 11. saltem aliquando  
 vera p. 32. l. 13. symptomata & suppress. p. 33  
 l. 13. altero 5. Aphorif p. 36. l. 8. intempe-  
 ries l. 23. calidam p. 41. l. 14. Exemp. grat.  
 p. 41. l. 3. vsu part. p. 40. l. 12. insolitam p. 54  
 l. 10. simplici intemperie frigida. Et p. 57.  
 l. 5. mistam p. 59. l. 3. purgatur p. 69. l. 5. pro-  
 uocandum p. 70. l. 11. nec etiā l. 19. sectio  
 nem p. 71. l. 22. cap. 4 p. 72. l. 14. sim. p. 74. l.  
 7. candidiorib. p. 76. l. 7. menstruorū p. 79  
 l. 13. Elect. Hieræ p. 82. l. 16. Aquariane p.  
 90. l. 6. Menstrua l. 7. Si p. 93. l. 8. propria p.  
 79. p. 103. pag. 108. l. 12. Althomarus. pag.  
 109. l. 3. thorace. pagina 111. l. 21.  
 inter p. 116. l. 17. sanguis p. 117. l. 22. diu-  
 retica p. 118. l. 4. muliebri. Auicenna. p. 120  
 p. 127. l. 10. auferantur p. 130. l. 6. habent p.  
 132. l. 15. Gonorrhæa p. 135. l. 19. profla-  
 uio p. 144. l. 19. redundant: ante p. 146. l. 1  
 illic p. 146. l. 23. foetidum p. 161 l. 19. sedē,  
 pariter quæ p. 165. l. 1. quæ l. 18 maximæ p.  
 187. l. 21. euidentissima ratione p. 188 l. 22  
 responder l. 23. appellata, multas venas ve-  
 lut



radices p. 189. l. 22. non potuisse p. 190  
4. videtur posse se p. 191. l. 21. partes p.  
11. plus Meteor. 50. p. 197. l. 1. est sen  
tia p. 199. l. 22. quæ p. 200. l. 4. sen  
tiam venit l. 11. illas l. 19. excernendi p.  
5. l. 6. mulierem p. 211. l. 13. à med. Hip.  
tum p. 217. l. 21. violenter p. 219. l. 14. A-  
enæus p. 221. l. 15. crudum p. 227. l. 17.  
errare p. 231. l. 24. Rouffetus p. 233. l.  
genitales fieri. p. 240. p. 243. l. 8. fœ-  
onditate p. 244. l. 15. quia p. 249. l. 21. pro-  
dentia p. 255. l. 12. Mentha p. 258. l. 18.  
quario p. 261. l. 1. q. f. f. Emplastrum. l. 23  
æ (pro iunioribus) sunt p. 266. l. 5. Med.  
ilia l. 21. finem atq; (voo verbo) pluri-  
s p. 267. l. 9. quam obrẽ p. 271. l. 4. idq;  
275. l. 2. Strato p. 277. l. 11. quæ l. 13. qui  
15. bus (394) molâ l. 23. Anic. verò Aë-  
m p. 285. l. 15. aliquam rationem p. 293  
1. certiss. p. 299. l. 24. imbecillem p.  
5. l. 2. pro Hiera diacolocynth. p. 306. l.  
destillata p. 310. l. 13. vesiculæ p. 320.  
4. rubiæ tinctorum p. 323. l. 22. nonnul-  
p. 338. l. 2. qui p. 339. l. 14. (prætermis-  
faueo) p. 351. l. 13. reposita: equi-  
m p. 366. l. 7. prædita l. 23. de vlu part. 15  
7. p. 369. l. 4. paruitate p. 379. l. 9. pro-  
re potionem p. 382. l. 5. semoueatur p.  
5. l. 11. exemplis p. 391. l. 20. mares p.  
2. l. 2. vereatur l. 23. habet p. 393 l. 1.  
æ p. 404. l. 20. euacuationem p. 405. l. 12  
detrae



detrahenda. Cause quamobrem p. 408  
16. celerrimi p. 415. l. 22. transacta p. 41  
l. 7. præter eam l. 23. fieri. Cætera, si quæ  
forent ferè vt hæc lenia, lector attentè  
facilè corrigat.

*FINIS.*





